






XLIII.C.9

Unica de cui cǎrțile la p. 25-38 ~~conținut~~
una tablă de la p. 25-38 (Anticursă
concluzii)
14 aprilie 1938 P. de la p. 25-38.

12. 12. I. 32





IO. BAPT. FERRARI

SENENSIS

E SOCIETATE IESV



DE



FLORVM CVLTVRA

LIBRI IV



ROMÆ



Excudebat Stephanus Paulinus MDCXXXIII.
Superiorum permisso.

AMICO FLORVM LECTORI.



*V*dica tandem Flora inuenta est, quæ
mores non inquinet, sed flores ani-
mo pulchrius, quàm solo, infeminet:
Florum, inquam, Cultura è priuatis
hortorum latebris in publica discipli-

na lucem existit, vt floridas curas in arumosa mor-
talitate feliciter serat ad ingenuæ messem vberem
voluptatis. Quamobrem illa in ipso huius operis
florei vestibulo non solum hortensis præmonstrat ar-
ma, inuitatque facilem ad laborem; verumetiam
fructum laboris amplissimum pollicetur, quatuor
videlicet anni partes amœnitate perpetua vernan-
tes, & perenni vicissitudine modò iuuenem modò se-
nem, hoc est bisfrontem annum omnium temporum
floribus coronatum. Neque verò in hortensis volu-
minis primo tantum aditu, sed in penetralibus quoque
adytis lepidè picta spectacula exhibere placuit; vt,
ad hilarandam legentis patientiam decenter interfi-
tas amicas florum fabellas comminiscente me, atten-
tionis mira conciliatrix, & Roscio melior gestum age-
ret pictura. Et sanè tam graphico artificio lusero
nobilissimi pictores; vt non pictæ paginae proponi,
sed res ipsæ geri videantur. Amabilis huius fal-
laciæ voluptatem concinnauit in primis Guido Re-
nius Bononiensis, qui artis suæ, quàm cuiusquam
eloquentiæ, coloribus illustrior, contracta in se vnum



universa pictura gloria, quod semel Apelles Veneris miraculum elaboravit, hoc suis in tabulis maiestatis plena semper exprimit venustate; ac solerti penicillo, dum colores inducit, mores animumque pingit; quique scit manum de tabula tollere, sed feliciter amulam victtricemque natura. Ut ipse mihi iure gratuler summm operi meo decus ab eo accessisse artifice, quem non modò illustrium fertilis virorum parens Bononia, verumetiam assueta miraculis Roma vnicè miratur & pradicat. At verò Petrum Berrettinum Cortonensem, è cuius aequè benefica ac docta manu Flora mea pleraque accepit suae lineamenta pulchritudinis, quonam pari gratoque praconio remunerabor? Ille in ipso iuventutis curriculo senilem absolutissima artis metam adeptus expingendum argumentum prudenter digerit: extremas inter lineas corporum symmetriam raro aliqui successu artis emendatè includit: validè nitideque colorat: corpora tum graphicè denudat, tum eleganter inuestit: suorum argutias & veneres operum gravitatis nobilitat cothurno: & (quod laudis fastigium est) augustum antiquitatis vultum recenti emulatione sic praesentat, ut par solertiae merces, nunquam antiquandi nominis aternitas debeatur. Sed magnum ingenium vna pingendi scientia explere non potuit. Quare alteram divinae Sapientiae rerum omnium opificis imitatricem facultatem perfectè didicit architecturam. Illa tandem summa deco-

decorum sit, à sapientissimo aestimatore, Francisco Cardinali Barberino in aulicas opportunitates ob artis vtriusque præstantiam fuisse delectum. Simili dignus & felix honore Andreas Saccus Romanus, Antonij Cardinalis Barberini splendida in aula bonum propitiumque lumen suauiter coloratis operibus suis nactus, illustre Principum patrocínio artificium lepida & concinna graphide scriptioni mea adiunxit. Præter argutè descriptas lineis fabulas aliæ hortensæ rei perutiles formæ lineantur, quas vna satis expingere non potuisset oratio. Neque mirum sit, in floreo volumine florum effigies admodum paucas deformari. Etenim, cum volumina prope infinita impressis visenda floribus, quorum vnicam vel historiam vel medicos vsus persequuntur, in omnium oculos manusque passim incurrant, ego, qui florei cultus nouum omnino, diuersumque opus exequerer, nostratibus tantum hortis peregrinas & parum de facie notas florum plantas exprimere satis habui. Verum ut operis florei cognitio conspectior sit, præter accurata graphidis lineamenta, quibus oculi potissimum erudiuntur, ea placuit quadripartitio, qua præcipuarum ordo partium ipsi animo delineatur. Primus igitur liber, quem exigat florum cultio apparatus, edocet: florum notitiam certis notis præbet secundus: eorundem satum, & educationem tertius tradit: vsus postremus aperit & admiranda, qua secretiore artificio perficiuntur. Patet iam expeditus
• adi-

aditus ad Flores Cultura mea legendos. Siquid forte horridum spinosumque pupugerit; memineris indulgens lector, saepe cum floribus aculeos geminari.

M V T I V S V I T E L L E S C V S
S O C I E T A T I S I E S V
P R A E P O S I T V S G E N E R A L I S .

CVM Floram, siue Florum culturam P. Io. Baptistæ Ferrarij Societatis nostræ tres eiusdem Societatis, quibus id commissum fuit, recognouerint, & in lucem edi posse probauerint: facultatem concedimus, vt typis mandetur; si ita Reuerendiss. D. Vicefgerenti, & Reuerendiss. P. Magistro Sacri Palatij videbitur: In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas, & sigillo nostro munitas dedimus. Romæ 6. Septembris 1632.

Mutius Vitellefcus.

Imprimatur, si placet Reuerendiss. P. M. Sac. Pal. Apost.
A. Tornellus Vicefg.

*Æmulam hanc æternitatis Floram,
& eruditissimam non tam florum, quàm morum, & ingenij culturam
à Reuerendiss. P. Nicolao Riccardio Sacri, & Apostolici Palatij Magi-
stro iussus auiditate summa perlegi: eamq. publicæ natam ingeniorum
utilitati non modò cenfeo, sed innocentem Paradisi voluptatem Lecto-
ribus, & immortale Auctoris ingenio coronamentum allaturam assero,
spondeoque. Ex Collegio Romano octauo Idus Septembres 1632.
Hicronymus Petruccius è Societate Iesu.*

Imprimatur.
F. Nicolans Riccardius S.P.A.M. Ordinis Prædicatorum.



INDEX CAPITVM.

LIBRI PRIMI

De

Apparatu hortensi.

Cap. I. Florifera cultura tradenda frugi consilium. pag. 3	III. Hortensis architectura. 16
II. Noua cultura nouum magisterium. 12	IV. Excubitor, & Cultor. 44
	V. Arma hortensis. 57
	VI. Terra floralis. 73

LIBRI SECVNDI.

De

Florum Notis.

I. Narcissorum nota. 99	VIII. Asphodeli, Paonia, Lily conuallium, & Iuca Indica nota. 184
II. Croci, Colchici, Corona imperialis, ac Tuliparum nota. 141	IX. Byzantina Lychnidis, & Americani Trachelij nota. 187
III. Fritillariae, Iridum, Liliolum, Orchis, atque Ornithogalinota. 149	X. Caryophyllorum nota. 189
IV. Hyacinthorum nota. 158	XI. Granadilla siue Maracoti nota. 190
V. Cyclamini, & floris Indici & violaceo nigrantis nota. 167	XII. Gelsiminorum nota. 193
VI. Anemones nota. 173	XIII. Rosarum nota. 201
VII. Ranunculi nota. 181	XIV. Florentium arbutularum nota. 204

LIBRI TERTII.

De

Florum Satu, & Educatione.

I. Lex floris ferendi. 211	III. Contra maiusculos hostes hortense bellum. 257
II. Lex floris seruandi. 243	IV.

Index Capitum

- | | |
|--|--|
| <p>IV. <i>Contra minutos hostes machinae.</i> 278</p> <p>V. <i>Lex floris propagandi.</i> 293</p> <p>VI. <i>Narcissorum cultura.</i> 302</p> <p>VII. <i>Crocus, Colchici, Corona imperialis, ac Tuliparum cultura.</i> 312</p> <p>VIII. <i>Fritillaria, Iridum, Liliorum, Orbis, atque Ornithogali cultura.</i> 317</p> <p>IX. <i>Hyacinthorum cultura.</i> 319</p> <p>X. <i>Cyclamini, & floris Indici è violaceo nigricantis cultura.</i> 324</p> <p>XI. <i>Anemones cultura.</i> 327</p> <p>XII. <i>Ranunculi cultura.</i> 339</p> <p>XIII. <i>Asphodeli, Paonia, Lily conuallium, & Iuca Indica cultura.</i> 342</p> | <p>XIV. <i>Trachelij Americani, Lychnidis Byzantinae, aliarumque consimilium herbarum cultura.</i> 344</p> <p>XV. <i>Caryophyllorum cultura.</i> 346</p> <p>XVI. <i>Granadilla cultura.</i> 351</p> <p>XVII. <i>Gelsiminorum cultura.</i> 352</p> <p>XVIII. <i>Rosarum cultura.</i> 362</p> <p>XIX. <i>Floridarum stirpium arborescentium cultura.</i> 369</p> <p>XX. <i>Aquaticorum florum cultura.</i> 372</p> <p>XXI. <i>Indica stirpes in hortis Barberinis.</i> 375</p> |
|--|--|

LIBRI QVARTI.


De

Florum Vsu, & Admirandis.

- | | |
|--|--|
| <p>I. <i>Florum structura multiplex.</i> 395</p> <p>II. <i>Florum siccitas viuax, & verisimile mendacium.</i> 433</p> <p>III. <i>Arcana florum cultura.</i> 441</p> <p>IV. <i>Arbitraria florum temperantia.</i> 445</p> | <p>V. <i>Inducti floribus colores.</i> 458</p> <p>VI. <i>Arte maius Natura miraculum.</i> 468</p> <p>VII. <i>Emendati, additique floribus odores.</i> 503</p> <p>VIII. <i>Mutata florum forma.</i> 506</p> |
|--|--|

A P.

APPARATVS HORTENSIS LIBER PRIMVS.



Florisera cultura tradenda frugi consilium.

CAPVT I.



GE surge anime ex humili, atque adeo ex humo. Desine tandem aliquando prono in hortensem terram vultu vel præter naturam brutum animal, vel ante diem silicernium videri. Parce magnæ matris viscera cultu rustico proscindere, armis agrestibus vulnerare; ne de parentis optimè de te meritæ vulneribus florulentæ purpuræ cruentam voluptatem crudeliter exprimere dicaris. Cælum suspice, ad quod natus, ad quod erecta statura tuendum tenendumque factus es. Immortalia sidera caducis flosculis præfer, aut eadem esse cæli flores existimato nostratibus amaranthis diuturniores. Sed frustra,

Florum cul-
tura nouum
opus.

Homine in-
genio digna.

A veteribus
vīſurpata,

contra torrentem nitimur : frustra ingenio reluctamur . Enimuero Antæus sum , licet gigas non sim : quod ex imo terræ contactu , cultuque ad cælum vegetior , atque altior assurgo : per flores enim ad gemella florum sidera congruenter molliterque transitur . Quare à floribus afflata mihi benefica mens est , vt vniuersæ hominum nationi floridam ad cælum viam aperiā , siue vt floriferi horti suauissimè laboriosam culturam , quæ recēter nata plurimos quidem cultores industrios , nullum tamen adhuc minutioris curæ nacta scriptorem est , primus edoceam : ne mihi vni serere , mihi vni metere arguar . Sic præterea mecum ipse floridi cultor Lycei philosophabar , ex ingenuis mortalitatis oblectamentis honestius esse nullum , quàm quod ex florū cura culturaque percipitur . Vix enim procreatam , & velut infantem humanitatem hortus voluptatis inter florea incunabula excepit : vt erga flores amorem à vetustissimis incunabulis traheremus . Ipsum quoque humanæ felicitatis diuinum domicilium peregrino Paradisi nomine hortum redolet . Quin etiam , cælestis amœnitatis adumbratæ ac rudes imagines , terrena viridaria tum veteri , tum recenti ætate principes viros ad speciosam sui cultionem inhalatæ suauitatis illecebra inuitarunt : Non est cur auribus ingeram recentia exempla , quæ oculis quotidie vīſurpamus . Veterum aliqua non ab aspectu modò , sed à memoria etiam remotissima cominemorantur .

morando videamus. Verùm ne Romæ, laudum omnium fertilissima in vrbe, externa decora demirerur, omitto plausibili inuento hortensia rura ciuitate donantem, interque flores suauiter philosophari docentem Epicurum: prætereo Reges Adonidem, & Alcinoium regalium inter curarum spinas hortorum florido studio beatos, nec tam aculeato in sollicitas punctiones auro, quàm explicato in aridens blandimentum flore coronandos: taceo Reginam Semiramidem in pensilis viridarij præcelsò miraculo, quàm in regiæ sellæ humiliore fastigio magis suspiciendam: parco narrare Persarum Regum ædibus hortos, quos illi Paradisos vocabant, fuisse coniunctos, vt Regibus ipsis florum cura semper hæreret: non dico pretiosissimæ texturæ auctorem Attalum à Regni administratione ad hortuli transisse culturam, quòd floream purpuram decentiùs, quàm Attalicam vestem elaboraret: non repeto centies auditam Cyri vocem apud Lacedæmonium legatum Lyfandrum inter infinita regiæ gazæ spectacula sese confitorem esse vnice gloriancis: relinquo denique aureum Hesperidum pomarium, ne videar aurum illinere mendacio. Vna, miraculorum omnium theatrum, Roma olim adolescens

Plin. Nat. hist. l. 19. c. 4.

Esther c. 7. Plutarch. in Ar. tæxerfe. Sol. Poll. lib. 9. c. 3.

Justin. lib. 36.

Plin. ibid.

papauera educanda sese dēmitteret. Quāquam,

illa messe tyranniçè demessa, innocenti horto indignum, hoc est sanguinarium filio nuntium remisit. Quid regno deflorescente nobilitas Consularis? nonne in hortensi area, quàm in forensi arena diutius effloruit? Certè, si quid Respublica detrimenti pateretur, auxilios Ducēs, Imperatoresque petebat è villa, quam duodecim etiam tabulæ hortum, appellarunt, quòd ibi, qui capere arma possent, orientur. Vt mirandum nemini sit illam diu Rempubli-
cam stetisse florentissimam, quæ cultissimis hortis, quæ fortissimis cultoribus abundarit: quorum aliquis Oratorum flos, ut amœnitatem omnem, etiam nomine complecteretur, ab horto dictus est Hortensius. Sed vnus instar omnium prædicetur colonus, alterum belli fulmen, Scipio Africanus, qui summam triumphali gloriæ manum à se tum addi existimabat, cum domitricem Africæ dexteram in subigendo Linterni hortulo exercebat. Quid, si veterēs Sallustij, Luculli, Mecœnatis, ac Cæsarum hortos memoria repetamus? num dubitabimus amœnissimæ indolis patritios Quirites super florum studio cum vernante natura specioso certamine coluisse? Quare Domitiano Cæsari præter aulicum, & poëticum morem vera sic cecinit gratulatio.

Martial. l. 6.
epigr. 80.

*Nauiæ derisist Pharios Memphiticus hortos,
Vrbis ut intrauit limina prima tuæ.*

Quod igitur semel voce, Lesbium oraculum, Theophrastus

phrastus, hoc sæpius re ipsa docuit gentium Regina
 Roma dignam esse homine libero agriculturam.
 Verùm adeo non modò summos, sed infimos quo-
 que homines amor tangebat hortorum: vt pauper- *Plin. ibid.*
 cula vrbana plebecula Babylonæ amœnitatis pensile
 sumptuosumque miraculum æmulata de fenestris
 olim (quod nostræ etiam ætatis vulgus vsurpat) hor-
 tensia rura suspenderet. Urbem orbis epitomen,
 vt nobilis ait Græcus author, plura decora comple-
 ctentem, quàm quæ possent vnico nomine conclu-
 di, triplici quondam insignitam fuisse accepimus:
 peruulgato scilicet Romæ, robur græcè sonantis:
 arcano, vt quidam putant, Amaryllidis, vel ab amo-
 re latina origine, vel ab incilibus, quibus Argei cam-
 pi Romana palus siccata est, græca significatione,
 deductæ: sacro demum atque in sacrificijs vsurpato
 Anthusæ, hoc est Floræ, siue Florentiæ, vnde sacra
 Floralia nominantur. Vt videlicet vrbs & rerum
 gestarum gloria, & florum studio florentissima ip-
 so etiam nomine floreret: vtque floribus operam
 dare Romanum esse gloriemur. Digredere iam
 tempestiuè à Romana vrbahitate ad Africanam
 barbariem liberrima narratio: ibi pande Regij Ge-
 neri penetrales hortos: ostende nobilitate, sapien-
 tia, integritate spectabilem Antistitem Paulinum
 tum præclarè liberum, cum vendibili seruitute
 alienæ libertatis redemptor humum fodit, vt olen-
 tium herbarum florumque munuscula metat, quo-

*Apud Calium
 Rhodig. lib.
 18. c. 25.*

*Aug. Politan.
 ep. 2. lib. 1.*

*Caenius l. 6.
 Miscell. c. 1.*

*Romæ sacrū
 nomen Floræ,
 siue Floren-
 tiæ.*

*Florum cul-
 tor Paulinus.*

Dioletianus
ex Imperato-
re olitor .

Baron. Annal.
10.2.

Christus re-
diuitus hor-
tulanæ specie.

rum suauissimo nexu & barbarum Genserici ty-
ranni animum sibi deuinciat , & se suosque captiuos
ciues simul absoluat . Quòd si Diocletianum , tra-
beatum illud monstrum , ac sceptrigeram furiam ,
abdicato demum , quod nimium diu impotenter ,
ac tyrannicè tenuisset , imperio , culta innocenter
olera sic nobilitarunt : vt tam ipsi gloriosum futu-
rum fuerit , si columnarum inscripta monumenta ,
ex Imperatore olitorem prædicasent , quàm fuit ei-
dem probrosum , quòd Christiani nominis euerfo-
rem appellarint : quanto plus gloriæ cum lectissima
florum messe metere credenda est in hortorum vr-
bano rure colendo splendide rusticata nobilitas ? Sed
quid ego mortales hortensi culturæ deditos admi-
ror ? Deus ipse triumphata morte rediuius , atque
immortalis non in triumphali Regis paludamento ,
sed in subrustica horrosum cultoris effigie amantif-
simæ se Magdalenæ videndum præbuit . Et sanè ad
sempiternæ voluptatis colendos hortos reducem spe-
cies decuit coloni . Nec equidem miror subagreltis
hominis imagine sese induisse rediuium mortis
triumphatorem , cælique Imperatorem Deum , qui
sic agrestes florum delicias adamauit , vt ardua Cæli-
tum felicitas facili mortalium labore præcerpenda ,
in florem campi , liliumque conuallium humili ap-
pellatione transferit . Quòd si Deo decorum fuit
nostrum se florem facere , & appellare : quidni nos
pulcherrimas eius imagines , flores videlicet ambi-
tiosè

riose colamus? Iam non est mihi querendum, cur idem suauissimus planeque floridus Legillator agri lilia citra vllum ipsorum laborem Salomonis regio cultu ornatiora considerari iusserit. Eorundem enim & vnicus & prouidus cultor voluit agnosci Deus. Vt flores colere maius humano decus esse intelligamus. Fas igitur mihi sit absque leuitatis nota docere, quod grauissimis viris, atque adeo ipsi Deo pulchrum fuit vsurpare. Huc accedit non leue florum culturæ non exercendæ solùm, verùm etiam tradendæ incitamentum, seuerioris nempe sapientiæ erga geniale hoc ingenuumque studium plausus & præconia. Sed numquam illa gloriosius plaussit, quàm, cum eruditissimi ore Lipsij locuta, in ambiguo reliquit, an flores hortus elegantiores funderet, quàm Lipsius loqueretur. Duo hic præstari à me posse penitus diffido, ac pernego. Alterum est, vt omnia colendorum præcepta hortorum persequar. Quis enim vnquam primus intentati operis magister vniuersa peruidit, ac posteris tradendum doctoribus reliquit nihil? Non fuerit igitur minimæ opportunitatis, & laudis pleraque, ac præcipua præmonstrasse. Alterum, vt omnibus placeam. Nam quis, nisi delirus, dissimilium inter se ingeniorum, atque etiam dissidentium sententiarum infinitis mortalibus vnum argumenti, atque adeo scriptionis genus sapidum esse posse arbitretur? Satis igitur habeo, si paucis, ijsque sapientibus

Tubet flores considerari.

Florum culturam etiam docere decorum.

Hortorum cura sapientibus laudata,

De Constant. l. 1. c. 1. 2. 3.

Duo Scriptori difficilia.

bus non displiceam . Non hîc opus mihi est more
poëtarum è Parnassi viridario eruditam auram im-
plorare , vt percupida mens amabiles sensus à fertili
aspiratione concipiat : idem enim Zephyrus , qui
odorato halitu floream terræ , ingeniosam inspirat
animo fœcunditatem . Neque Aganippes lymphati-
cam lympham sitio , vt aridum ad nobiles partus in-
genium irrigetur : eadem enim hortensis vnda , quæ
teneros terræ filios lactat , inter floreatos fratres pudici-
cam hanc meam Floram educit , & educat . Va-
leant Musæ , mera nomina , non vera numina cano-
ræ superstitionis . Musarum instar omnium vna mihi
est , vna placet & ingenua & ingeniosa colendi floris
Ars , quæ decentiùs à me , quàm deflorata pudicitie
laude quondam famosa muliercula , Flora nomina-
tur . Hæc igitur , dum cælo non inuida , sed æmula
duodecim siderum illustri diademate coronatum ,
annum subinde nascentium florum perpetuo vere
mirabiliùs coronat , floream mihi sertum poëtica
lauro pulchriùs intexit ipsius decora , ipsius leges ad
hominum iucundissimam exercitationem promul-
ganti . Eiusdem ego admonitu floridum argumen-
tum suauitate carminis alioqui condiendum carmi-
ni proxima , atque inter flores decenter efflorescente
oratione pertracto : quòd recentium florum nomina
pleraque peregrina sine obscura verborum ambage
versu dicere non est . Hæc me M. Catonis , M. Var-
ronis , Columellæ , Palladij , Constantini Pogonati
sapien-

Florum cul-
tura cur Flo-
ra .

Florum cul-
tura cur pro-
sa , non car-
mine .

sapientissimi Imperatoris, aliorumq. complurium
 grauissimorum authorum de re tum rustica, tum
 hortensi solutè scribentium nobilissimis exemplis
 ad hoc idem scribendi genus impellit. Et Constanti-
 num quidem satis luculenter docuisse monet, è ma-
 iestate Imperatoria esse non hominibus modò, ve-
 rùm etiam floribus leges & iura præscribere. Vt
 hortos colere Cyri exemplo regium, hortensem ar-
 tem præcipere Constantini documento imperato-
 rium, vtriusque authoritate aureum sceptrum, &
 floriferum bipalium tractare perinde splendidum
 esse fateamur: Valeat iam tandem Apollo, calor
 capicum fanaticus in fabuloso collis Heliconij sole
 apricantium. Tu mihi splendide ficto Apolline il-
 lustrior, FRANCISCE CARDINALIS BAR-
 BERINE, quà sapientiæ, quà gloriæ purpurea luce
 suauiter incendis animum, vt flores loquar, VR-
 BANIS APIBUS tuis, vt spero, gratissimos. Et
 quanquam excelsæ indolis natiuis, cultissimiq. hor-
 ti domesticis floribus abundas: non tamen dedigna-
 beris tibi nascentes Floræ meæ agrestes flosculos li-
 berali Vrbaniitate donare. Neque sanè dedecet re-
 giam istam morum facilitatem à summorum Re-
 gum colloquio, & grauissimarum legationum ne-
 gotio reducem inter horridulos hortos meos breue
 per otium rusticari. Iam verò adueneror, atque in-
 uoco præpotentem Diuinitatis auram, quæ sicut in-
 ter cælestis felicitatis æterna virèta florentissima,

Frâncisci Car-
 din. Barberini
 patrocinium
 imploratum.

Aspiratio di-
 uina floribus
 inuocata.

Cæli-

Cœlitum gaudia semper euentilat, vt perennent:
sic hortensibus curis hisce meis aspiret, vt felici
exitu hilarentur.

Noua cultura nouum magisterium.

C A P V T I I.

NOuam, & perutilem florum culturam in-
cultè scribenti mihi, ad impetrandam
operis nouitate veniam, vtilitate beneuo-
lentiam conciliandam, pretium operæ foret osten-
dere, à compluribus, ijsque eruditissimis rei flo-
reæ scriptoribus, florum tantummodo aut histo-
riam, aut certè vim medicam fuisse traditam;
quarum illa mortalium voluptati prodesset, hæc
vitæ: accuratissimum verò cultum, quo de hu-
mana tum voluptate, tum vita optimè promeriti
flores viuerent, ac perennarent, vt diutius prodes-
sent, adhuc intactum indictumque latuisse. Quare
hoc equidem loco recentis ad operis certissimam
fidem, omnium, qui de floribus ad hanc vsque æta-
tem conscripsere, catalogum cum ipsarum scri-
ptionum argumentis producerem; nisi numero-
sam recensitionem istam authores aliqui Transalpi-
ni elementario ad expeditam cognitionem ordine
numerantes occupassent, hoc est partes meas im-
plessent. Ex his est, qui ducentos circiter numeret
her-

Herbariæ rei
scriptores ab
alijs numera-
ti.

herbariæ, adeoque rei floræ scriptores, quorum nemo vnus de vniuersa absolutaque, vt nunc viget, florum cultione præcepit. Fuere quidem perpauci ex ijs, quos legerim (legi autem complures) qui remota quædam aut mutila præcepta hac super re cum attigerint, integram mihi ac peramplam tradendi cultus hortensis materiam reliquerunt. Ego igitur nouis in præceptis præscribendis vtilius occupatus longissimos indices ab alijs describere superuacaneum puto. Neque tamen eos ingrato silentio dissimulabo, qui nuper ingeniosa floridaque scriptione ipsis decus floribus addiderunt. Sic enim, vt par est, in latinis hisce meis hortis non vna modò breuissimorum flosculorum forma, sed florentissimorum quoque ingeniorum fama vernabit. Prior in hortensibus meis noualibus floridissimum nomen efferat, qui suas pridem paginas florum scriptione gloriæ fecundissima conseuit, Fabius nobilitatis excelsitate Columna, eruditionis amœnitate flos, seu potiùs familiæ suæ miraculum; quia Columnam florere facit, seu-riorem videlicet philosophiæ, mathematicæ, legumque disciplinam blandissimo florum studio coronat. Floreæ sapientiæ præcones argutissimi sunt pridem euulgati, breuique vulgandi còdices; in quibus, quàm in hortis, pulchrius flores nitent, ac suauius olent: quia illos oculatissima, & planè Lyncea seuit eruditio, ac veritatem opacantes er-

Præter hos
Fabius Co-
lumna.

ran-

rantium opinionum malos frutices extirpauit ! Testis est ē libris iam editis cum prior , qui non minùs re , quàm nomine ΦΥΤΟΒΑΣΑΝΟΣ Theophrasti , aliorumque veterum herbariorum descriptionibus respondentes plantas græcæ latinæque eruditionis momentis prudenter examinat : tum posterior ΕΚΦΑΣΙΣ , qua præter superiores aliæ complures minùs cognitæ , rarioreſque stirpes noſtrate ſub cælo naſcentes , à priſcis olim herbarum peritis medicis deſcriptæ recognoſcuntur , & declarantur . Testis , herbariæ rei Anazarbeum oraculum , Dioſcorides & profuturis , & manſuris Columnæ notis explicatus , nondum tamen in publicum iudicium typorum opera productus . Testes denique ſunt , quæ iam eduntur in lucem ad Mexicanarum plantarum , animalium , & metallicarum fodinarum hiftoriam notæ , appendiceſque operi perègrino , ac perutili pares . Et eum quidem no- uæ Hiſpaniæ theſaurum , ſiue opportunam medicinæ hiftoriam Franciſcus Hernandus nouo in Orbe primarius medicus congeſſit : Nardus Antonius Recchus , Hiſpani Regis iridem medicus digreſſit : Ioannes Terentius , pridem inter medicos ad corporum , nunc autem inter Ieſu ſociòs ad animorum perueſtigandam ſalutem apud Sinas Lynceus doctiſſimis notis locupletauit : vniuerſi verò Lyncei , atque ipſe præcipuè Lynceorum princeps Fe- dericus Cæſius è diuturnis tenebris erutam & eru-
ditis

Franciſ. Hernandus .

Nardus Antonius Recchus

Ioann. Terentius .

ditis additamentis, & liberalibus impensis, vt præclarè legatur, in bono lumine euulgarunt humanitatis suæ. Scriptor alter à Fabio & ipse ad sapientiæ latebram peruidendam Lynceus, Ioannes peracutum olentis ingenium de Nardo & Epithymo disputationis Faber, Romanæ præstantiæ medicus, atq. herbarius Pontificius innocenter odoratis plantis eruditum conficit aculeum contra Iosephum Scaligerum. Descriptorum serie florum proximum floret nomen Tobia Aldini, qui, dum Odoardi Cârdenalis Farnesij medicus Chymicus, & Farnesiani horti præfectus rariorum eiusdem horti plantarum descriptionem profert in lucem, ad colenda & coronanda regiæ pulchritudinis Farnesiana Lilia iure peregrinatas esse rariores plantas exteras docet. Iam verò scriptione, non eruditione postremus floribus nostris inferendus est floridus sanè scriptor Federicus Cæsius, qui genus, & proauos, atque hæreditarium principatum vix sua decora exiltimans & omni bonarum disciplinarum genere sic animum illustravit, vt erudita perspicacitate maximè Lynceus Lynceorum omnium dux, ac propè dixerim, oculus sit: & multiformi scientia in perbreues Phytosophicas tabulas coacta Mexicanam eandem historiam sic fecundavit, vt pluribus illa ingenij floribus, quàm Indiæ stirpibus virere videatur. Vsq̃ adeo cultrice sapientia exarata fragiles paginae perennaturæ gloriæ seminarium sunt. Superest iam.

Ioannes Faber.

Tobias Aldinus.

Federic. Cæsius.

vt nos quoq. vtiliter vernaturas paginas vsque adhuc intractatis & recentibus excolendi floris præceptionibus laudabiliter exaremus, quas tum diuturna mihi experientia, tum consulti experientissimi cultores suppeditarunt.

Hortensis Architectura.

CAPVT III.

Hortorum
positio.

Plin. lib. 18.
cap. 6.

P Rincipiò, cui gestit genialis indoles in florum culturam, floriferi horti aream eligat salubri cælo subditam, summotamque procul à paludibus, ne coloratos inter flores à pestilenti regionis halitu ipse cultor mortis colore decoloretur: fluuio non aduersam, ne aquosa & perfrigida, atque adeo insalubri aura inspiretur: si locus suppetat, domesticam, vt assidui veris felicitate aureum seculum domi habeat, subiectumque videat è fenestris exspectum floribus paradisum: quoad eius fieri poterit, peramplam, ne florea natio varia & multiplex angustè habitet: auersam à septentrione, vnde gelida perniciēs mollissimis terræ fœtibus hyeme inhalatur: conuersam ad meridiem, cuius tepidi humidique spiritus clementer aspirantes florum animæ sunt. Ita situs amœnitate ipsi hortulus Italiæ non concedet, quæ, sterili Aquilonis frigore Alpinis claustris excluso, ad australis cæli fertilem
re-

reporem porrecta vnum tota pomarium Varroni videbatur. Sin autem siccanæ regio humore nullo, aut parcissimo adiuuatur: hortos ita partieris, ut hiberno ad meridiem, æstiuo ad septentrionem, flore spatia conferenda conuertas. Illius enim loci frigidam austrinus halitus, præferuidam siccitatem minùs ostenta soli aquilonaris positio temperabit. Possumus quoque varios pro regionum varietate, villarum situs ab idoneis authoribus præfinitos sic ad hortos referre, ut ij spectent in frigidis locis meridiem, septentriones in æstuosis, in temperatis exortum æquinoctialem. Eandem aream sic præterea prouidus cultor exæquet: ut non æquissima, nec perlibrata, sed exigue prona leniterque decliuis humorem imbrium superfluum aliò euergat. Apricam verò vel inueniat, vel efficiat: ne imminens, aut obiecta opacitas grauiùs, quàm Magni Macedonis umbra, officiat non doliari cuipiam. Diogeni, at delicato florum populo salubriter apricanti. Ut hortenses partus floridam & nitidam vitâ viuant, amantiissimi parentis sui vitali solis calore citra umbræ inuidiam foueantur. Ut suis horti sideribus discolori luce florentibus cælum stelliferum æmulentur, æmulanda cæli decora libero prospectu intueantur. Ut colorati pupuli ex altricis nubis pluuiò lactatu viuudum colorem ebibant, ærium lac umbrosa mora ne prohibeto. Ut marinis conchis auidiùs matutino rori oscitantia florea conchy-

*De Re rustic.
lib. 1. c. 2.*

*Pallad. De re
rust. l. 1. tit. 34.*

Plin. ibid.

Planities.

Apricitas.

lia roscidis margaritis æstum refrigeraturis perluceant, avarus obex instillatas opes ne intercipito. Sed rorantibus cæli guttulis, & antelucanæ serenitatis imbre æstuantium, atque arentium in aprico sitis hortorum satis extinguere non potest. Quare fontani liquoris natiua, siue accersita perennitas, aut non ita profundi, laboriosique haustus putealis fons, aut certè cælestis aquæ cisterninum conceptaculum siue intra, siue propter hortensem aream sit: ut bibaculis plantis vel manu illatus, vel suæ spontis humor, cum opus fuerit, ministretur. Ad hæc pro loci situ ea areæ figura deligenda, cuius in designatione vel nulla, vel minima spatij iactura fiat. Sin autem patentiore in agro tua sit optio: pro arbitrio angulatam aut rotundam, oblongam aut quadratam destinabis. Illud verò seruandum est, ut area sepimento clausa, vel claudenda, si longior quàm latior placet (siue ea rectis angulis, siue ouato ambitu definiatur) ab ortu longitudinem porrigat in occasum. Nam sepimenti, quàm latum est, breuiora latera orienti, occidentique soli aduersa matutinis ac vespertinis horis, cum longissimæ umbræ sunt, areæ minus extremæ utrinque inumbrabunt: mediæque plus solaribus radijs patebit, hoc est area tota erit apricior. Reliquum est, ut appositè delecta floribus castra (nisi quo alio munimento inaccessa sint) tutissimo aduersus furaces excursionses vallo communiantur. Id autem seu modicè sublimi, qui

qui furem non solem arceat, circumdato muro, siue spineo sepimento statuetur. Non enim rosæ solum, sed cæteri etiam flores præsidarias inter spinas turò habitant. Sepes viua structili præfertur, utpote parabilis minore sumptu, æuo diuturniore durabilis. Ea sic instituitur. Hortulus, quem veluti florum urbem sepimenti mœnibus munire destinaveris, condendæ urbis veteri more sulco, eoque duplici sic cingendus est, ut alter spatîo tripedaneo distet ab altero: uterque verò bipedanea, vel sesquipedali tum altitudine subsidat, tum latitudine dehiscat. Id verò fieri debet, simul atque ab æquinoctio autumnali largis imbribus terra maduerit. Semina deinde paliuri, rubi, eiusque spinæ, quam sentem canis appellant, quàm maturissima erui farinæ ex aqua maceratæ immiscentur, eaque intrita sparteis, aut nauticis veteribus funibus, aut quibuslibet alijs restibus inseritur. Siccati deinde funes reponuntur in tabulato. Quadraginta mox diebus à bruma prælapsis, siue post Idus Februarij, cum redit hirundo, cum fauonius aspirat, siqua in sulcis reses per hyemem aqua stagnauit, exhauritur: resolutum verò solum, quod autumno egestum fuerat, ad mediam vsque sulcorum altitudinem regeritur. Ad extremum prædicti funes impressis facti seminibus per utrumque sulcum porrecti leui terra obruuntur. Ita circa trigessimum diem prorepunt sentes, quæ adhuc teneros interposita vtri-

*Calvus. De re rust lib. 11. c. 3.
Pallad. l. 1. tit.*

34

que sulco virgea sepe sic adiuuare oportet, ut in spatium, quod interiacet, inclinati virgarum adminicula supercandant: donec incremento firmiore corroborati densissimo, atque inextricabili nexu impenetrabile, atque adeo inexuperabile munimentum intexant. Non absimile satisque validum sepimentum ita Diophanes architectatur. Sub æquinoctium vernum cubitali altitudine scrobem effodit: in illo & palos depangit, & funiculum extendit: pridie autem eruum molitum cum paliuri, rubi, & oxyacanthæ, siue acutæ spinæ semine commiscens macerat, atque ad mellis crassitudinem cogit: extentum deinde funiculum eo semine confricat, oblitinque: locum cremore irrorat, irroratumque ad breue tempus patere finit: egestam denique humum superiniicit: & post dies duodetriginta pedalis incrementi germina existunt. Eadem in scrobem pede non altiore transponit: & intra bimensis tempus cubitalem superant magnitudinem. Adeo verò in aculeatum, implicatumque vallum breui adolescunt, ut hispida ipsa species predonum vulneret, ac deijciat audaciam. Non dispari Democritus artificio agrestes delicias munit ac sepit. Etenim à veris initio quindecim diebus sepium sationi præfinitis, nauticum funem marinis operis detritum, iamque putridum prædictorum feminio veprium eruo permulto confricat: exinde in scrobem defodit, & quotidie irrigat. Ita proceram

*Apud Constant.
Ces. Pegonar. de
Agriculis. lib. 5.
cap. 42.*

ram atque imperuiam sepem citò educit. Nonnulli restem infricato rubi semine oppletam adobruunt: crassas arundines contusas obliqua, nec admodum alta plantatione defigunt; mistumque terræ latamen ingerunt. Alij lectis è rubo maturis moris funiculum illinunt: deinde terra, fimoque obrutum rigant, donec germina emittat. Sunt præterea; qui viam sepem in hunc modum excitent. Virgas rubi crassiores in segmenta discindunt: ea scrobibus palmari altitudine excauatis diligenter operiunt: quotidie, donec egerminent, fossione ac rigatione, si tempus inuitet, resouent. Ita sepes robusta, perennisque confurgit. Nouum aliud sepimentum regij cultoris ingeniosa monstrauit experientia. Plura hic diuersi generis semina ceræ, vel tenaci cuiuspiam materiæ in longum tenuiter productæ permiscuit: eadem optimè stercoreato subactoque solo commisit: atque ex ea congerie sepes admirabilis pullulauit. Nostri tamen agricolæ simpliciore cultura consepitos agros satis commodè tuentur. Vnico enim contenti trium circiter palmorum sulco vastissimarum spinarum plantas è spinetis campestribus translatas, ac leuiter attonsas à Nouembri mense ad Februarium infodiunt: ternorum interuallis cubitorum discretas arbusculas maximè vlmeas æquè attondendas interserunt, vt vepres quamuis asperos maritos fideli coniugio adminiculent: sambucum, quoad fieri possit, non

B

esse



esse interponendam censent: quia frigida, siccaque vi affitas plantas emaciat, & in caudicem enormiter extumescens furacibus insidijs facilè scansilis est. Quòd si locum tutiorem sepire mitiùs velis: dedolatos cancellos è castanea, seu qualibet alia ex arbore, quæ sub iniuria pluuiarum perdurandi per- uicacia laudatissima sit, præfiges: vt innoxios illi oculos admittant, procaces hominum manus, atq. adeo pecudum ora pedesque distineant. Ita præparatum ac præmunitum areæ patentis æquor graphidis peritus, ingenuæ amœnitatis architectus curiosè dimetiatur: dimensi æquoris formam sectilem in partes pro dimensionis rata portione respondentes lineari pictura contrahat in papyro: multiformem areolarum imitationem deformer: pulcherrimam deligat exprimendam. Caueat autem, ne phrygionem imitatus areolas frangat in foliacei operis angustas & minutulas incisuras, sationi planè ineptas. Feliciùs æmulabitur phrygium opus artificiosa florum confitio, quæ ipsummet areolarum solum ordinata colorum varietate distinguet. Areolas nec adeo laxet, quin ad ipsarum latitudinis dimidiam partem runcantium, legentiumue manus peruenire possit: nec adeo angustet, vt paucissimorum seminum vnaquæque sit capax. Quamquam qui natura magistra paucis ijsque lectissimis floribus contentus fuerit, numerosiore semitarum labyrintho areolas poterit aliquatenus coarctare.

Semi-

Linearis pi-
ctura.

Areolæ.

Semitas duum minimùm palmorum latas faciat ,
vt sine adnascantium plantarum attritu innocens
oberret incessus. Laxiora quoque itinera præscri-
bat , quæ se media in hortorum vmbilico interse-
cant , quæque sepimento proxima hortos ambiunt .
In ijs enim non modò est ambulandum , sed flora-
les etiam testæ ordinatim statuendæ sunt . Quis
iam enumeret hortorum inexplicabiles & planè la-
byrinthæas ambages , quæ felicissimo artificio non
biforme Minotauri monstrum , sed bis amabilem
oculorum , nariumque voluptatem intercludunt ?
Expeditiùs veterum labyrinthorum , quàm recen-
tium hortorum artificiosè inextricabilibus errori-
bus explicandis exitum inueniam . Paucis rem ex-
pediam infinita varietate impeditam . Quot in pa-
uimentis atque in lacunaribus , totidem in hortis
mæandros ludimus & labyrinthos . Vt dædaleam
antiquitatem ætas nostra longè superet quà ingenio ,
quà numero dædalorum . Quin etiam beatiore
Archimede Geometræ docile solum innumerabi-
libus formis inscribimus non humano sanguine ,
sed florea purpura colorandis . Illud autem studio-
sè curamus , vt areolarum non vniuersa modò com-
positio & colligatio , sed vnaquæque etiam figura ,
& veluti facies concinna & venusta sit . Nullæ ta-
men formosiores areolæ informantur , quàm quæ
rotundantur in rosas , aut radiantur in stellas . Vt
sine fabulæ fuco & fallacijs Elysium nostrum vel

sine floribus floreat, & sua sidera norit, quæ splen-
didam florum sobolem manifestius, quàm remo-
tissima cæli lumina, progignunt. Sed floræ sa-
tionum omnium maximè viles, & satis venustæ cen-
sentur octo angulorum areæ minusculis quadratis
Formæ variæ. areolis interstinctæ. Non fuerit (opinor) ab re
multiplices iam hortorum formas adumbrare: vt
hortensem architecturam clariùs, quàm ipsa ver-
ba, linearis adumbratio eloquatur. Illud hîc ani-
maduerti volo subiectas exempli causa diuersas hor-
torum imagines ad certæ magnitudinis areas ac-
commodandas esse: vt apertè indicant sectilibus
lineis additæ singularum imaginum dimensiones.
Quare pro spatij amplitudine varia areolarum con-
formatio varianda est. Quæ autem lineantur infra
regulæ modulorum siue partium, minutoribus
segmentis communes siue Romanos palmos, am-
plioribus eorundem palmorum decades indicant.

Si cui



Vetus ars, quæ necdum penitus antiquata est, olentium herbularum consili sepimento amœna hæc florum statua circumuallabat: vbi non ipsi modò inter se flores ciuili bello, sed herbacea etiam propugnacula cum floribus, quos defenderent, de pulchritudinis præstantia blandissimè certare viderentur. Verùm istiusmodi sepes duplici nomine, incommoda & frequenter attondenda erat, quòd facilè siluesceret: & subinde renouanda, quòd citò senesceret. Quare vtilius nouitio inuento singulos puluinos satius florum delicijs insternendos ambiunt fulcra coctilium laterum tenuiorum, qui parem in crassitudinem cote læuigati aptissimè inter se committuntur. Si vel fidelibus oculis credas; non contiguos lateres, sed perpetuas tabulas ad vnguem dedolatas existimes. Vsq̃ue adeo saxa ipsa florum persentiunt amabilitatem: vt ad illos iucundissimè complectendos arctissimæ coagmentationis societate conspirent. Pauca quædam hîc habeo præmonere. Primum, vt albi lateres in lateraria officina seligantur; hi enim, quippe eximia coctura densati, contra frigora pugnaciores: rubri reijciantur, vt qui minus igne durati ad primos algores in fragmenta dissiliunt. Alterum, vt in recto plani, in sinuoso opere curui adhibeantur. Tertium, vt in arcis obuallandis, qua parte longi sunt, defigantur, non autem qua lati: ne parum altè depacti aut incedentium, aut fodièntium offensionem

Ad arcolas
tutelæ.



sione loco moueantur. Postremum, vt supra semitarum superficiem tres tantum uncias, siue totidem transversos digitos extent. Debent præterea funiculi, pro varia areolarum conformatione plures paucioresque, validè intenti vtrinque depactos ad paxillos alligari; vt parem laterculis omnibus extantiam præstent; vt eisdem ad lineam dirigant; vtque Ariadnæo filo felicius hortensium labyrinthorum ambages ingressis, non hospitibus Theseis, sed ipsis architectis Dædalis facilem laboris exitum commonstrent. Quin etiam flexuoso in opere sic artificis manus est regenda funiculo; vt eius alterum caput opportuno figatur in centro, destinatum in curuaturam circumducatur alterum. Non est operis instituti minutiorem docere rationem areolarum varias in figuras efformandarum: neque enim structori monstrat architectus, quæ facile potest ille sua ex arte, vulgatoque ex usu cognoscere. Cæterum, si clementior cura suaserit, ne in beneficos areolarum stipatores laterculos ingrata imminutio, ac mutilatio desæuiat, Marcum Antonium Specchium Romanum auditum horretorum amœnitati, tum coctilium laterum integritati hac perutili solertia consulentem. Aream vel quadratam, vel intra rectos angulos oblongam in paginæ commensum respondente linearum ambitu contrahes: in quadrangula spatia quæqua versum æqualia, quæ laterculorum latitudinem pro rata

por-

M. Antonius
Specchius.

portione adumbrent, lineis cancellatim reticulatis distribues: areolasque ita definies, ut integra segmenta, nempe solidi lateres includantur. Prædiscere tamen hic debes, ab istiusmodi structura curuos ambitus excludi, qui nisi comminutis laterculis circumduci non possunt. Si quem autem pigeat pronioris, incommodique incubitus in humili subsidentium areolarum cultura; is poterit lateritio munimento calce interlito ad quaternos, quinosue palmos prædicta florum cubilia excitare. Post affabrè munitas laterculis areolas, interiectæ *Semitæ*, semitæ consternentur æquè, ac tutelares laterculi, eandem in partem leniter deuexæ. Si placet anti-quitate magistra proficere: artem areæ frumentariæ coæquandæ, ac solidandæ ad hortensium semitarum constrata sic referes. Cretam, siue argillosam ac tenacem terram minutè confodies: amurca recenti non salsa benè consperges, ac subiges: *Cato de re rust. c. 129. Varro de re rust. sic. lib. 1. c. 51. Colum. l. 2. c. 6. & l. 3. c. 20. Plin. l. 15. c. 8. & l. 18. c. 29. Pallad. lib. 7. tit. 1.* ubi terra penitus combiberit amurcam, iterum probè comminuetur, cylindro coæquabitur, & paucula verberabitur: denuo tandem amurca solum resperges, & arescere sines. Ita pauitæ, atque exæquatæ semitæ nec æstibus fatiscunt, nec imbribus lutescent, nec inutiles herbulas creabunt, nec noxijs formicis, & muribus scatebunt. Recentior tamen ars vtiliter substernit in semitas aut veteris ruderis cribarium pulvisculum, aut permistam glareolis arenam fossitiam, aut macram & rudem nullo-

nulloque viciatam feminio terram, qualis est altius effossa, aut conglobari solitum in pilulas liuidum retrimmentum calcis, & cineris, quibus aqua maceratis saponis lixiuium percolatur. Est, qui gracile solum in operto siccat, siccatum minutim comminuit, comminutum cum sabulo commiscet: deinde vel manu illato humore perfundit, vel in apertum effert, vt aquis cælestibus humescat: in semitas denique tam feliciter digerit; vt, qui modò mollissimus erat pulvis, mox densam in duriem lapidescat. Duplex autem consternendarum ambulationum via est: aut enim ingestum solum paucula condensatur, aut summas prope laterculorum oras cumulatam leuiter trulla complanatur opere retrogrado; necubi leuis exæquatio progressu inæqualiter subsidat. Ita fiet, vt solum adhuc suspensum tum suo pondere, tum pluuiali pressu, quantum satis fuerit, æqualiter descendat, ac solidetur. Est etiam nonnemo, qui coctilibus laterculis ad amussim læuigatis, & calce commissis aditum omnem bestiolis, herbisque præcludat. Verumtamen tam præclusa structura grauib. patet incommodis: adeo enim ab imbris ac gelicidijs lubrica erit, vt illic sine casu, aut prolapsione ingredi nemo possit. Adde, quòd humore diuturno viridem situm immundamque illuuiem ducit, & prope assiduam purgantis operam exigit. Quanquam quodcunque hortensis ambulacri solum, ne frequenter

quenter decidua puluinorum humo herbescat, debet subinde conuerri. Vnum hortis inutile habetur signinum pauimentum, fractis tunsisque testis, & calce addita coagmentatum. Id enim brumali frigore congeliatum minutatim diffilit. Compianatis iam semitis, si, quod areolis includitur, eius loci solum florum sationi habile sit, retineatur, ac tenuiter succretum in puluinulos cumuletur: sin minus; illo egesto, quod certis vtile indicijs mox describam, sufficiatur. Hæc hortorum arripet architectura: quæ tamen absolutissima non erit, nisi seminarium adiunctum habeat, vbi ge-^{Seminarium.}nerofo è semine spes hortensis gloriæ concipiatur, paruique hortorum Quirites educentur, donec, probata per probabilem florem indole, in floream Rempubicam admittantur, degeneres autem excludantur. Aprica loci positio, mollisque decliuitas eadem atque hortensis esto, tum vt genitilis caloris abundè, tum ne collectæ per imbrem vlginis nimium sit. Areolas simplici artificio, directoque ordine quadratas, aut oblongas, necnon modicè latas facito; vt conseri vtrinque, purgarique possint: easdem prædictis laterculorum tutelis circunsepito: semitas ad binos palmos, vt prius docui, laxato: eiusmodi seminarium ab hortis hortensi tantum sepro distinguito, pariterque circundato. Quòd si ager angustior vix hortis mediocriter explicandis, nedum seminario adiungendo satis est: pars aliqua hor-

Domicilium.

hortorum extrema in seminarium abeat, aut (si neque hoc per loci angustias licet) fictilibus catinis parabile seminarium figulus ministret. Ad ultimum horti (nisi domini ædibus continentes sunt) contiguum cultoris domicilium requirunt, quo tanquam aliqua specula diurni nocturnique insidiatores absterreantur.

Excubitor, & Cultor.

CAPVT IV.

Canishortensis.

Cic. pro Sext.

Rosc. Amer.

Plin. l. 10. c. 12

Plutarch. in problem.

VT sine militum vigilijs urbium claustra, ita sine canum excubijs hortorum septa insidijs patent. Caue, tuus excubitor genus & indolem ducat à somniculosis canibus, arcem Capitolinam silentio prodentibus: de quibus anseres vigilantiores lectica splendide instrata circumductæ anserinæ ex argento imaginis solemni pompa, primaque Censorum cura publicè locati ad ædem Iouis Tonantis perpetui cibatus gloria defenso Capitolio triumpharunt. Adeo verò unica pœna inexpiabile, vbi latrandum est, taciturnitatis flagitium sapientissimis Quiritibus videbatur; vt multiplici, & singulis annis repetito sambucci patibuli supplicio mutorum parentum filium, aliquem flebiliter ululantem paterni silentij perfidiæ cogerent oblatrare: atque infelicitè affixum
cir-

Plutarch. De
Fortuna Romanorum.

circunferrent, anserum triumphantium spectabile trophæum. Ne canina tibi quoque carnificina poluenda, atque efferendæ sint assuetæ floribus manus: fideli, & ad leuissimum quenque strepitum sollicito custodi crede floridos amores tuos: Intima fides in extimis indicijs eminebit. Placet igitur excubitor canis (vt minutas præteream notas) vfu vilaticus, aut pastoralis, ne Draconis Hesperidum fideles excubiæ desiderentur: educatione placidus in domesticos, implacabilis in externos, ne blanditijs corrumpatur: toroso corpore robustus, vt cominus vasto latratu canorus, vt eminus: arduo statu minax, vt vtrinque terreat insidiantes: oculis sanguinea luce suffusis fulgurans, vt dentium fulmina portendat audacibus: villo niger, vt luce clara terribilior furibus conspiciatur, vtque in tenebris nocti concolor penitus inuisum ad hostes accessum habeat. Huiusmodi canem interdiu captiuum vinculis contineto; vt noctu manumissus & libertus excubias agat alacrior. Eidem excubitori mobile ac translaticium tuguriolum crassis assibus è castanea contabulato: Eiusdem tugurium. in Austri teporem hieme, in Aquilonis frigus æstate obuertito. Eo tamen in loco semper statuito, vnde tota hortensis planities, atque adeo quisquis ingreditur excubitoris oculis subijciatur. Sed frustra hortis inuigilant canes, si culturæ indormiant homines. Colonus ergo fidem in prithis, ac benevolentiam erga dominum colat, sine quibus horti mali-

Coloni partes.
c. 5.

Colum. l. 11. c. 1 malignè florescunt. Ne sit ebriosus, aut ambulator; quia capite pedibusque vitiosa vertigine laborantibus diligentiae stabilitas vacillat: neque sit somniculosus, aut voluptarius; quia desidiosa molities laboriosae hortorum pulchritudinis venefica est. Sit autem siderali scientia leuiter imbutus; ut, quæ captanda culturae tempestiua, quæque cauenda sint suspecta tempora in bona siderum luce præuideat. Sit floridæ rei sciens: ut scitè felices herbas excolat, infelices curiosè persequatur. Sit agrestium operum patiens: ut sereno die in horten-
Virg. Georgic. lib. 1.
Colum. ibid.
Plin. l. 18. c. 24
Liban. in laud. Agricult.
Tesserae surculaceæ.
Arundinez.
Plumbeæ.
 si sole apricus serat, exherbet, emundet, suis munitijs floribus ipsis nitorem addat: per imbrem verò intra domesticum asylum umbraticus de floreis negotijs otiosè deliberet, arma rustica detergat, furculos indices præcidat, necnon varijs numerorum crenis notet, quos deinde ad florum discrimina vel humi depangat, vel floralibus testis affigat. Licebit, si lubeat, in hunc usum resecta arundinea internodia laxioribus alijs internodijs operire; ut, quæ includentur, schedulae notabilium florum nominibus inscriptæ ab humoris corruptela integræ conseruentur. Quanquam ego eidem huic rei plumbeas lamellas numeris insignitas, senos septenosue transuersos digitos longas, vnum latus, digiti quadrantem crassas vtiliùs adhibeo: quòd hæ, cum neque frangantur, neque putrescant, ut surculi, permolestè reficiendæ quotannis non sunt.

sunt : Sicco diutius cælo amica irrigatione impluat , ^{cap. 22.}
 quemadmodum infra enodatiùs explicabo . Hosce ^{Rigandi tem-}
 autem vicarios imbres irriget , dum sol vel occidit ^{pūs :}
 æstius , vel imminet hibernus ; ne affusus humor
 nunc feruore tabifico , nunc gelu mortifero cum
 siti vitam bibuli seminis extinguat . Prima luce
 areolas circumbeat : si quid res florea detrimenti
 passa sit , peruestiget : flores vel senio , vel imbre ,
 vel turbine , vel quo alio casu caducos furculaceis
 paxillis , tanquam pedamentis , erectos adminicu-
 let : iniussu domini ne legat : iussus hinc inde sic de- ^{Florū legen-}
 metat , vt versicolor seges intacta atque illæsa vi- ^{dorum ratio.}
 deatur : ijs verò decerpendis abstineat , qui placent
 siue nobilitate ad semen , siue nouitate ad gloriam .
 Matutina florum messis in primis tempestiua est , ^{Tempestiui-}
 cum sublucana illi blandientium siderum salina- ^{tas :}
 guttatim perfusi omnino nectarei sunt : cum recen-
 tem ad solem experrecti roscidis lacrymulis lepidè
 lippunt : cum semhiulco risu legi prægestiunt :
 cum egelido tepore suffiti odoratiorem animam
 expirant . Hanc minimè siluestrem ; imò vrba- ^{Componen-}
 nam , atque vrbaniati cæduam florum siluam te- ^{dorum peri-}
 nui lino , aut lento vimine nunc teretes colligat in- ^{tia .}
 fasciculos , nunc textiles circinet in corollas , nunc
 etiam vinculo absolutam aceruatim digerat in ca-
 lathifscis , efficiatque suauī miraculo , vt penfiles
 horti manibus & capitibus facilè præferantur . Hic ^{Sacræ aræ flo-}
 & colonum , & dominum monitos volo , vt quæ- ^{ribus ornan-}
 præ-

præcociſ, quâ ſerotini floriſ crebris munuſculiſ ſa-
 cras ædeſ condecorent, gratiam aliquam munifi-
 centiſſimo Deo relaturiſ; qui, vt omnium ſaluber-
 rimis deliciſ obuiuſ eſſet, è concluſo intactæ Pa-
 rentiſ hortulo exiſtentiſ floſ campi apparuit; cum
 in agro Bethlemio amantiſſimè præproperuſ me-
 dia hieme vernauit: quique florea veriſ tempe-
 ſtate in ſerali monte cruentuſ deſloruit; quia li-
 lium fuit, ſed vulnificuſ inter ſpinaſ. Noxiarum
 quoque floribuſ animantiuſ perſequendaruſ op-
 timuſ cultor arteſ percaleat, quam ego alio loco
 bipartitò fuſeque tradam. Nocentiſſimaſ autem
 beſtiolaſ, limacem, & erucam hortiſ potiſſimum
 caueat. Ergo ſi pluuialiſ anni ſecunditaſ infelix
 cum floribuſ vtranque florum peſtem effuderit;
 intendentibuſ ſe tenebris ad furtiuuſ pabuluſ
 egreſſaſ nocturnuſ vltor prælata faceſ veſtiget,
 deprehenſaſ manuſ colligat, pede proterat. Si quaſ
 opaca noctiſ impunitaſ protexerit, ſuiſ ipſæ veſti-
 giſ reduce luce ſe prodent. Et limax quidem
 glutinoſi corporiſ tractuſ inſuſſè ſaliuantiſ pigram
 fugam ad latebram uſque ſequaci lentore inſcri-
 bit. Eruca verò depaſti floriſ reſiduum in ſum-
 mo ſolo relinquit, infra quod ad vniuſ alteriuſue
 digiti craſſitudinem ſepultaſ viuunt. Ibi terram
 digito, vel ſurculo leuiter curioſeque ſcalpe, ne
 multa ſimul egeſtaſ humuſ concolorem vermẽ
 inuoluat, & occulat. Quæriſ quid ſit, cur vilif-
 ſimæ

simæ bestiolarum nobiles florum epulas tam avidè
 confectentur ? Veram causam seria fabula do-
 cto aperit inuolucro . Vos interim audite pigri
 cultores , audite impigri fures vestris æqua meri-
 tis adumbrata ludicro sermone supplicia . Est in Limacis, & e-
 ruræ fabula. agro Hetrusco planities amœnissima , vbi quon-
 dam stetit ac vixit Semifontana Respublica .
 Hic florentissimos hortos Flora , suam scilicet Floræ horti.
 Regiam , natura simul atque arte ad elegantissi-
 mam architecturam conspirantibus , excitauit .
 Et possim ego toto naturæ , artisque molimine
 elaboratas delicias rudis , & inamœnus , atque ,
 vt semel dicam , vrbanus agricola exæquare
 dicendo ? Imò verò possum , paucis quàm plu-
 ribus eloquentior ita si dixerò : nusquam elegan-
 tiùs , nusquam decentiùs , quàm Floræ in hortis ,
 velut in voluptario theatro lepida florum natio
 pudica ludit Floralia . Liberale ostium omni-
 bus patet : sed , qua lege pateat , hisce incisum
 notis admonet .

Hic ver assiduum meliùs , quàm carmina , flores

Inscribunt : oculis tu lege , non manibus .

Floridissima hæc Hetrusca Tempe BARBE-
 RINIS APIBUS feliciùs , quàm Thessalica vul-
 garibus , natalia geminas vtrinque confines vr-
 bes Florentiam , & Senas propagatæ amœnita-

D

tis

Fabius Sergardius .

Ex longo famulatu incuria .

tis communicatione sic beant ; vt illa tum re ,
tum nomine floreat : hæ sicut agrorum , sic ingeniorum vere perpetuo nobilitentur . Sed , ne in patriæ iustissima commendatione nimius videar , vnum è plurimis honoris causa nomino tum genere , tum hac vtraque laude nobilissimum ciuem meum , Fabium Sergardium ; quippe qui cultissimæ indolis nitorem in hortis cultu sumptuque nitidissimis repræsentat . Suis Flora delictijs tuendis colendisque præfecerat Limacem quendam , hominem primò quidem vigilacem & laboriosum ; deinde verò (vt incuria diuturno gliscit ex famulatu) conniuentem ac supinum . Igitur cultrice ignauia horti vernabant in vrticæ ; decoram sanè somnuculofo capiti coronam . Nec tamen seges illa sine igne acerrimè vrens excitauit ad cultum ; sed incitauit ad scelus . Frater erat Limaci Bruchus , homo inter fures nocturnos felicissimus ; quippe qui raperet , & lateret : noctu furacissimus Mercurius , interdiu frugalissimus Marcus Curius . Floribus in primis delicatus iste scarabæus delectabatur , quorum exuctam suauitatem in sordidum quæstum conglobabat : seu potius (vt ille cum fratre gloriabatur) ex diuenditis infructuosis flosculis ingenioso miraculo aureos fructus colligebat . Hortos autem non temerè , sed eruditè compilabat . Nam quos in cæteris eminentes , dominantisque nobi-

nobilissimos flores de die vulturinis oculis præcerperat , eisdem sublustris de nocte , Perian-
drum spicas , Tarquinium papauera decutien-
tes imitatus , demerebat : quin etiam , ne in su-
perbam pulchritudinis tyrannidem regermina-
rent , radicitus extrahebat. Sed nusquam vigilan-
tior , quàm Floræ in hortis expilandis indefessus
runcator furacem operam suam collocauit : cre-
do vt lentissimo fratri exherbandi viridarij labo-
rem releuaret . Rem primò Limax fraterna sci-
licet indulgentia dissimulare : deinde etiam nec
videre , nec scire posse ; vt qui pro se , atque adeo
pro infomni fratre dormiret . Adde , quòd in-
florum densissima silua latè sparsa deprehendi
posse furta non putabat . Sensit tamen (quis enim
sagacissimam fœminam falleret ?) sensit , & in-
gemuit Flora in suorum verna iuuentute horto-
rum præfestinatum furtiuo scelere caluitium .
Itaque sæpè , at frustra fratrum par nocentissi-
mum innocentibus verbis castigatos ita denique
minitabunda præmonuit : Caue Limax , caue
Bruche , ne Flora noua Circe mutet ora : ne
vos puniat flos . Risere nequissimi suis ipsis alio-
qui flosculis suauioris Dominæ minas : quin imò
perfrictæ frontis Limax exprobrati sibi , fratrique
facinoris neutrum esse conscium pernegauit . Tum
Flora furore flammea ; oculis , voce , gestu ful-
minea ; Agite , inquit , scelestissimi , qui mina-

Limax in be-
stiolâ sui no-
minis.

Bruchus in e-
rucam,

cem ridetis, vindicem pertimescite: ac simul peregrino flore, quem fortè manu gestabat, utrumque percussit. O prodigiosam, grauissimæque noxæ parem in hortorum vastatores poenam! Contacta noxiorum corpora in turpes bestiolas repente decrescunt: utque maneat in recenti forma veteris culpæ indices notæ, *Limaci* manus pedesque recedunt, quibus, dum licuit, per inertiam uti noluit: oculi occuluntur, quos infonnum occluserat, cum fuerat excubandum: ad prætentandum cæcum iter & bacilli, & oculorum vicaria quadrigemina cornicula protenduntur, & ipsa ignauissima; quippe quæ leuissimum ad incursum resiliunt: horum summa, pars nigello puncto, velut oculorum simulacro ac rudimento illuditur: totum tergus infuscatur; ut rustici hominis id fuisse intelligas: eadem remanet pigritia in lentissimo reptatu, totumque corpus tanquam ipso in otio laborans frigidum, lentorem, hoc est ignaviæ succum exudar, ac viam sordidè signat, ne quis turpe vestigium persequatur: ipsa durissimi capitis penetralis peruicacia durefcit in officulum, seu lapillum cum ad multa, tum præcipuè ad alieni obstinationem ingenij emolliendam medicatum. Vnum in tanta membrorum mutatione *Limacis* nomen appositè retinet, qui limosam, inertemque indolem non mutauit. Similis ultio *Bruchum* vertit
in eru-

in erucam . Atque vt in illam degenerasse furem sentias ; alacres ad furtum digiti in multiplices pedes , prærepti flores in verficolores maculas transeunt . Adeo verò deprauatæ consuetudinis tenax est hominum genus , vt etiam num mutato corpore multati fratres ad corrumpendos hortos pristina auiditate ferantur . Et quanquam per nocturnas umbras suis quærunt insidijs impunitatem : ea tamen irrogata est pertinaci vitio ineuitabilis pœna , vt suo ipsum se prodat indicio . Limax ergo saluario ductu , eruca verò semela præda supernè relicta latibula commonstrant . Efficaci vindicis Floræ indignatione nocentissimos homines ridiculas in bestiolas deformatos non sine risu demirata sunt Floram demore consectantes Nymphæ quatuor , quæ singulas quadripartiti anni partes peculiari non magis fructu , quàm flore discriminant , floreoque annum discrimine in vnâ veris æterni faciem colorant . Ipsæ hortensium odorum vagulæ prædatrices , decentium florum garrulæ adulatrices Auræ prodigioso spectaculo defixæ suspenderunt volatum , & sibilum . Vnus tamen Zephyri fraterculus , inter ventulos pusillus pusio , libratis repentè pinnulis , intentoque tragicum in prodigium digito ridibundus monitor pauca hæc insulurrauit . Si fabula tam seuerè animaduertit in hortenses reos : quam illi seriam

vindictam non pertimescant? Hæc habui, quibus & fures monerem, vt floribus abstineant; ne turpius, quàm cruce, fustibus versicolores fiant: & colonos hortarer, vt pari diligentia & fide hortos colant; ne limacis instar nudi, eiekti, mendiculi parcissimè victitent succo suo.





Arma Hortensia .

CAPVT V.

NEquè miles , neque colonus inermis esto :
 sua cuique arma sunt : illi bellica , huic
 pacifica : illa cruorem , hæc florem eli-
 ciunt . Hæc igitur , quamuis agrestia , magnificen-
 da , & sedulò comparanda sunt . Breue scilicet bi- ^{Bipalium .}
 palium vnum , viciis nouem longum , latum sex ;
 probè acuminatum : vt areolarum angustis limi-
 tibus interiectum solum , cum res exiger , citra la-
 teritij munimenti iniuriam expedite fodiatur .
 Item palæ duæ , quarum altera obtusior (siue ea ^{Palæ .}
 quadrata , siue cuneata figura sit) vsitata extrahen-
 di , reponendique partes expleat : quadrangula alte-
 ra , & in aciem desinens præcutam herbulas con-
 fertim copioseque in ambulationibus prouenientes
 latè succidat . Gallicum è perpetuo ferro minimè <sup>Rastrum Gal-
 licum .</sup>
 dentatum rastrum , siue hortensis radula vna , semi-
 tarum percommode eradendis herbis hoc artificio
 fabrefacta . Lamina è ferro , ex quo falces con-
 flantur , palmum lata , quatuor digitos alta , superne
 nonnihil crassa , decrescente paulatim crassamento
 in aciem extenuata leuiter incuruatur . Ligneum
 longitudine circiter bicubitali manubrium inditur
 in anulum ex lamella ferrea in semet flexili , decussa-
 tim diuaticata , rastrique tergo affixa rotundatum ,
 è medio

è medio summi raſtri prominentem, modiceque reſupinum. Hoc inſtrumento ita ſemitas cultor exherbat. Correpto vtraque manu manubrio, ſtans aciem herbido ſolo preſſim applicitam trahit ad ſe, auerſoque inceſſu recedens malas herbas ſuccidit, ac ſternit, & veluti fugiendo vincit. Noſtrate autem pala raſtrum hoc magis ex uſu eſſe ipſe uſus oſtendit. Illa enim non adeo leuiter ad caſionem impelli poteſt, quin ſolo ſapè ſuſſoſſo planitiem lædat: hoc innocenti tractu ſummam terræ cutem ita decerpi; vt, malis tantùm herbulis, prominulisque ſaxulis corraſis, æquata ſemitarum glabreta, æquiora & glabriora reddat. Illa præterea ſupino poſitu, motuque lentiore ſe nauat operam: hoc prono, penitusque in opus incumbente corpore, quicquid inutiliter & nocenter eminet, corradit ſimul & conuerſie. Vbi verò ſatis congeſcit herbarum & ſordium: ſparſim relictis congeſtitijs cumulis, alia opera aſportandis, ſuam adurget æquabilem raſuram. Idcirco planiſſimum eſſe oportet ita purgandum ſolum: alioqui enim minùs vtiliter adhiberetur id raſtrum, quod malè natas herbulas locis eminentibus ſuccideret, ſubſidentibus tantùm delamberet.

Trullæ



Trullæ præterea fabrorum parentur maiusculæ duæ: Trullæ fabro-
rum.
 altera exacutior, qua ambulacrorum herbulæ car-
 pruram vulsuramque ipsa tenuitate fugientes abra-
 duntur: hebetior altera, qua terra minus altè con-
 uertitur, quaque leuiter ducta, reductaque compla-
 natur. Alia itidem trulla minuscula tum ad fo-
 diendum in arcto, tum ad minimas radículas refo-
 diendas. Inter hortensia quoque vrensilia numera-
 tur ouato lanceæ ferro persimile ferreum instru-
 mentum vnum, duodecim aut paulò plures palmi
 Romani vncias longum: vbi medium maximè pa-
 tet, duas vncias cum semuncia latum: acumi-
 ne in semicirculum retuso, eodemque ad expe-
 ditam fossionem, quàm reliqua sit pars, tenuio-
 re: ligneo manubrio priorem in partem, vt in
 trulla fabrili, exporrecto: ad radices præsertim
 aridas subruta humo innocenter eruendas peruti-
 tili Belgarum inuento in primis accommodatum;
 vt meritò à deplantandi vsu Gallicum nomen in-
 uenerit. Cultellus vnus perbreui, crassaque lami-
 na, mucrone retuso atque deuexo, quo malas
 herbas aduultiores aut arcis, aut semitis pertinaciter
 hærentes radicitus eruamus. Paxillus præferra-
 tus vnus, qui paria per interualla adactus scrobi-
 culos faciat floriferis bulbis minimo labore col-
 locandis. Vas irriguum vnum sic ex ære cyprio for-
 mandum. Venter capax in depresso rem figuram
 conglobetur: ansa versatilis annulato ex vtraque
 me-

Belgium de-
plantandi in-
strumentum.

Cultellus.

Paxillus præ-
ferratus.

Vas irriguum

media parte labro inferatur : rostrum duplex partim atque multiforum vtrinque promineat ; quorum altero laxius , altero angustius perforato , prout usus exiget , humor floribus irrorabitur : oris autem patentissimi media tantum pateat pars , vnde vas possit impleri : extrema vtrique superinductæ laminæ obice obturetur, ne in irrigationem declinatum cum innoxio stillicidio immodicam pluuiam superfundat . Hæc etiam in hortensem supellectilem opus sunt , nauia , siue aluceus ligneus vnus in scaphæ modum carinatus , intrinsecus cæmentisque in ædificio , terræ sordibusque in horto transferendis accommodatus . Scopæ plures , quas ad euerrendum sine scalptura , expoliendumque solum Reatinus præsertim , ager idoneas mittit ex Indici milij geniculatis culmis , in paniculas molliter hispidas capillatis . Peniculi vel setacei , vel filiginei plures , munditias facturi summis laterculorum puluinos circumstantium oris , quas aut recens pastinatio puluere , aut nimbosus imber luto resperferit . Ligneæ purgamentorum capsula manubriata vna . Vehes trusculis . Capsula purgamentorum . Vehes trusculis . Regula lignea . Arundines . Regula lignea vna , cuius æquabili tractu arcularum tumor coæquetur . Graciles arundines pluri-

rimæ , quæ tum ad caducorum adminicula ;
 tum ad notabilium indicia florum , vt factò opus
 erit , concidantur . Tubi fictiles aliquot , latitu- Tubi fictiles .
 dine palmares , paulò productiores longitudine ,
 vt eas singuli plantas circumscripant , quæ de ter-
 ra in terram translatae , tantisper , dum coale-
 scant , subdiales debent quidem esse , non ta-
 men apricæ ; ne insolatione exarescant . Testæ Vasa floralia .
 item florales aliquanto plures , quàm loci cap-
 tus ornatusque postulat ; vt , si fortè gelu prui-
 nisque , seu quò alio casu earum aliqua dissiliat , sta-
 tim possit vicaria suffici . Sed , ne casibus , offen-
 sionibus , frigoribusque illæ fragiles sint , è laudatif-
 sima creta figulari , quæ videlicet exalbescat , si-
 ne ad flauum colorem inclinet , seu potius ex fla-
 uo virescat , fingantur , valideque excoquantur .
 E rufa , siue leuiter incocta argilla fictilia vasa ,
 in hortos ne admittantur : quòd ista nimis humen-
 tem cum semper humum conseruent , concredi-
 tas radices plerunque vel corrumpunt , vel ema-
 ciant . Crassitudo requiritur minimùm polli-
 caris : ne florum fibras penetrans sol , aut frigus
 exurat . Forma placet globosa , modicè humilis ,
 ore patula , breui collo leuiter substricta , ventre
 turgida , pede lata . Humilitas enim nec longio-
 re per hiemem umbra officiet assitis floribus ,
 nec prospectum impediet : capacitas verò largio-
 re gleba semen ipsum complexa ab æstu , bru-
 ma-

maque defendet; ac præstabit, vt idem latè diffusis fibratis capillamentis in agnatam sobolem, in
Scabile. florulentam familiam felicissimè luxuriat. Item scabile paruum vnum, satori, runcatori que inter opus fessuro percommodum, quaqua versus palmarè, sed in summo vncia minùs latum; totum contabulatum etiam in imo, vt quancunque premet semitarum partem, æquato pressu condenset, & coæquet; ex vno tamen latere semiapertum, vt capsulæ instar peniculum, trullam minusculam, siue quid aliud minutum vtenfile recondat. *Cistulæ.* Cistulæ inæquales tres: prior minima instar pateræ plana, in præcocium penuria florum donaticas primitias oblatura: mediocris altera paulò laxior atque altior in vberiore prouentu idonea: *Orbes viminei.* tertia denique reliquis capacior in vberissimo vsurpanda. Orbes viminei complures, vnà cum struclilibus florum donis subinde mittendi, ac subinde reparandi; vt subitarios in vsus habeantur *Cribra.* in promptu. Cribra tria, quorum duo ex ære cyprio filatim extenuato sic reticulata sint, vt primum plagis mediocriter raris grandiusculam & exceptitiam bulbis; alterum minutis maculis prætenuem & secundariam radiculis terram incernat; tertium verò per eiusdem æris laminam densissimis arctissimisque foraminibus distinctam tenuissimum & cribrarium puluisculum transmittat, feminibus leuissimè obruendis.
 Item

Item laterna vna contra nocturnas quâ hominum, quâ bestiolarum insidias facem prælatu-
 ra. Muscipula vna, vel plures pro murium hor-
 tos infestantium copia. Theca ferramentorum
 vna, forficulis & cultello instructa; illis, vt flo-
 rentes cauliculi bellè attondeantur; isto, vt crena-
 rum notæ in indicibus taleis, vel arundinibus in-
 cidantur. Falcula vna, qua hortensium fruticum
 inutiles ramusculi amputentur. Serrula vna, qua
 ramuli duriusculi defecentur. Cos olearis ferra-
 mentis exacuendis vna: Lamellæ plumbeæ plu-
 rimæ, numerorum characteribus discriminatæ,
 confitis insigni flore vasis potissimùm præfigen-
 dæ: aut certè pro plumbeis arundineæ vel sur-
 culaceæ tesseræ complusculæ, quales paulò an-
 te descripsi. Præter hæc lini glomus, fu-
 niculus multiplex, ac diuersi generis vimi-
 na in varios, frequentesque vsus necessaria
 sunt. Reliquum iam est, vt innocenter exi-
 mendis transducendisque cum hærente humo,
 dum adhuc efflorescunt, plantarijs habile instru-
 mentum præparemus. Lamina ferrea subtenuis
 ad lentam infragilemque duritiam temperata in
 tubum adapertilem rotundetur, cuius diameter
 in latitudinem pateat uncias circiter sex, de-
 cem & octo in longitudinem. Sed quâ tubus ada-
 pertilis est, altera laminæ ora tres itidem è ferro
 fibulas, pari discretas interuallo, summam me-
 diam

Laterna.

Muscipula.

Theca ferra-
mentorum.

Falcula.

Serrula.

Cos olearis.

Tesseræ.

Lineum fi-
lum.
Funiculi.
Vimina.

Tubus ferreus
ad plâtas trās-
ferendas.

diam imam exporrigat : quarum singulas binis alterius oræ fibulis sic medias inferat , ut ferro radio stylouæ traiectis nexisque simul vniuersis tubus in orbem concludatur . Habeat idem præterea geminas vtrinque ansulas , ad inoffensam tractationem læui rotunditate tortiles , supraque summam oram eminentes , aut latiore in semet volumine conuolutas . Ansulæ , fibulæque tubo ipsi clauulis affigantur . Denique os summum , ne deprimentes acie vulneret manus , in recuruum labellum hebetetur : & oris imi acies ad penetrandam commodiùs humum perbenè excitetur .



Huiusce verò instrumenti vsus hic esto . Deplan-
tandæ plantæ folia floremque , si is existat , in re-
ctum manipulum citra iniuriam , citra pressu-
ram molliter coacta medio tubo inserto : tubum
ipsum , prehensis vtraque manu anfulis , æquo nisi
infra extrahendæ plantæ fibras , quantum assequi
coniectura poteris , in terebræ modum defigi-
to : defixum extollito : in fossulam deponendæ
plantæ destinatam & capacem , seu trulla tunc
faciendam , seu potius hoc eodem ferreo tubo
priùs excavatam ipsum tubum demittito : radium
eximito : solutum dehiscensque tubum educi-
to ; qui plantam suis cum floribus , cumque com-
pressa humo illæsam atque integram relinquet .
Tum , siquid distet , hospitale solum bellè appli-
cato : vt pressius adhærescat , modicè irrigato .
Aliud eodem vsu gemellum , conformatione
dispar deductum è Gallia instrumentum , de-
plantandis transferendisque viuis cespitibus ac-
commodatum sic fiet . Ferrea lamina longitu-
dinis circiter palmaris eatenus imbricatim incur-
uabitur , quoad quinque aut sex digitorum hia-
tu pateat . Acies tum infra , tum ex obliquo be-
ne exacuetur . Manubrium figetur à tergo iti-
dem ferreum , ab imbricato instrumento statim
retrorso sinu falcatum , recto denique radio in-
ligneum capulum inserto tractabile . Hunc au-
tem extractorium imbricem sic vsurpabis .

Imbrex fer-
reus extra-
riorius .

E 3

Ege-

E gemino cespitis latere totum imprimes : aut dextera manu falcato manubrio , sinistra verò ligneo capulo arrepto terebrans eousque versabis , donec probè circumsectum exemptumque cespitem intra imbricatum alueum reponas ; & , quò destinaveris , transducas . Adeo ferreo seculo ferraria floret ars : vt ipso cum pigro solo , cui radicitus affixi sunt , flores doceat huc illuc facili miraculo peregrinari .



1803

Hocce mutum instrumentum hortis rite colendis parare; hocce in proxima cellula, tanquam in armamentario, suis digestum locis custodire oportet. Id genus arma statim ab opere, quicquid pulueris fordisue contraxerint, detergito: ne rubigo, ne situs sine dente corrodant: utque præclaro labore defuncta nitidæ cessationis præmio splendant. Ferramenta usu nonnihil hebetata ad cotem exaquito: rubiginosa ad hortensem arenam & palæstram oleo inungito. Minutiora instrumenta assamenti paxillis rastelli modo eminulis suspendito: ut oculis manibusque obuia ex inertisuspensio ad motum opusque faciliè reuiuiscant.

Promptus-
rium.

Instrumento-
rum cura.

Terra Floralis.

C A P V T V I.

Monet me iam tempestiuè canorum illud oraculum, Non omnis fert omnia tellus, ut doceam, quamnam terram totius anni verna feracitas florum prole pulcherrima parentem faciat. Emmanuel Suertius Batauis in præfatione perbreui, quam Florilegio suo, siue nudis florum imaginibus præscribit, iustæ magnitudinis fossam excuari iubet: in ea fossa fimum bubulum, vel tunfos quernos cortices, quibus usi futores fuerint, cum solo bono nigroque misceri;

Emmanuel's
Suertij terra
fæcunda.

ri ; idque sæpius intra annum bipalio conuerti,
 ac fossione iterari : subnascentes præterea herbas
 identidem eximi . Ita præparari affirmat habile
 circumacto anno florea sationi solum . Verùm
 ego (nisi id genus terram Bataua oræ temperies
 quærat) vniuersis incommodam & periculosam
 hortis existimauerim : tum quòd sola versatio atque
 iteratio non potest vnico anno lætament adeo re-
 soluere , vt in terram degeneret nullis reliquijs
 stercoreosam , nec præpinguem , hoc est bulbosis
 excipiendis radicibus temperatam : tum quòd è
 quernis præsertim corticibus leuior atque imbe-
 cillior , quàm quæ à bulbis exigitur , humus facti-
 tia præparatur . Sunt , qui singulas terras singulis
 seminum generibus maritent : atque hoc pingui
 solo , illud macro ; hoc denso , illud raro ; hoc sic-
 co , illud humido committant . Sunt , qui Hy-
 acinthos cinere , Tulipas sabulo terræ permistis ob-
 ruant , fragilesque Anemonarum radículas putri-
 bus arborum frondibus truncisque in facticiam
 & mollissimam humum resolutis ita in florem
 erupturas turbulent : vt , quod olim tumultatis an-
 tiquitas voce precabatur , ipsi re melius præstent ;
 illud nimirum , Sit tibi terra leuis . Equidem mul-
 tiplicem istum , curiosumque terræ delectum si-
 cut non improbo , sic eiusdem adhibendi author
 sum nemini : cum paratiorem , vtilioremque
 glebam indagator optimus , recentior vsus inue-
 nerit .

Non vbiq̃
 vult.

Suum cuique
 placet solum .

Minimè ne-
 cessarium .

nerit . Terrenum igitur satiuo flori utile nec pingue sit , nec macrum , sed ex utroque æquata mediocritate temperatum : quia nimio succo & pinguitudine fermentata radix , ut in agnatas radículas subterranea ingloriaque fecunditate sobolescit , sic sterilefcit ad flores , laudatissimum alioqui scapum , & publica luce dignissimum , quâ numerofo , quâ grandi flore coronatum enixura . Genitales enim obrutæ radicis partes pinguiſſimi ſoli tepidiore complexu illectæ , alimentoque largiore turgelcentes vim fermè omnem in primum adnaſcentium tuberculorum puerperium effundunt , ad vltimum ſpecioſi floris fœtum effœtæ . Cæterum ſiccaneus etiam & macer ſabulo , ut qui nutritio humore deſtituitur , neque alere matricem plantam , aut fœcundare ; neque teneram floream prolem educere , aut lactare poteſt . Quamobrem vna ſuperest floriferis apta ſeminibus excipiendis mediocris humus , quæ parciore ſucco præmaturè luxuriantem fœturam coërcet , donec ſeſe totam efferat in denſiſſimi floris tempeſtiuam fœcunditatem . At cur tam fertilis eſt , cur floribus planè aurea terræ mediocritas ? quia , videlicet laxitatem , ac ſpiſſitudinem ; ſiccitatem , atque humorem ; leuitatem , grauitatemque , aduerſantes inuicem qualitates media temperatione ita continet fœderatas : ut ſuperiores terræ partes inferioribus modicè respondeant . Id autem ad aëris , rerum omnium generationem , calo-

Quamam terra
floribus ap
tiſſima .

Theophrast. de
cauſ. plant. l. 3
cap. 6.

*ibid.**Eiusdem indicia.**Colum. l. 2. c. 2.**Plin. l. 17. c. 5.**Pallad. l. 1. tit. 5.**l. 3. de Orat.**l. 17. cap. 5.*

calore, atque humore quàm maximè iuuantis habitudinem propius videtur accedere. Eiusmodi ergo solum à Theophrasto summopere commendatum satis solutum erit, vt & radicibus facilem præbeat meatum, & imbribus, ac radijs altè penetretur: leue, ne fatus opprimat: humectum, vt enutriat. Quoniam verò vt hominum, sic terrarum arcana indoles in apertis eminet indicijs: ideo florum fertile solum, ne quid inepto delectu peccemus, sensilibus se prodit argumentis. Est igitur aspectu pullum: tactu molle ac leue, si aridum sit: sin aqua conspersum subigatur, modicè glutinosum: gustatu quoque subdulce, si ex ea parte agri, quæ maximè displicet, glebam in fictili vase dulci aqua madefactam, ac more sæculenti vini diligenter colatam iudicio saporis explores: olfactu denique suaue. Et suauiis quidem odor, cum principum qualitarum ad optimam corporis constitutionem conspirantium veluti amicus quidam & socialis halitus sit, felicissimam in solo temperiem indicabit. Quare iuxta sagaci, atque eloquenti M. Tullio gratiora videbantur vnguenta, quæ terram, quàm quæ crocum saperent. Oraculum gemit altera sapientiæ cortina, alter Plinius, qui de terra odorem optimè iudicare affirmat: quærenti verò quam in terra odor iste sit, cui comparari suauietas nulla possit, talem ferè esse subijcit, cæsa vetere silua in noualibus. Vt mirandum nemi-

mini sit, floreat terræ filios non paucos odoratos esse: matrem enim olent. At verò languida dulcitudo graciliorem pinguitudinem sapit. Etenim, cum pinguis calore humorem decoquente exuberent, subdulce solum subpingue ac temperatum esse necesse est. Ad hæc tractabilem molliem humoris mediocritas, caloris temperatura, leue pondus, pinguedinis modus modicum aquæ aspersum lentorem in terris efficit. Denique cum ieiunum solum frigore palleat, saginatum calore nigrescat; pullus color percocta nigredine dilutior caloris cum terrestri siccitate parcum humorem penitus permiscentis addensantisque temperiem significat, simulque medium quendam inter crassum tenuemque soli habitum demonstrat. Quod si malumus optimam floreoque satiorem operi terram vnice miræ multiplicisque significationis vocabulo describere, tenerrimam cum Catone appellabimus. Hac enim vna appellatione, quicquid in illa exigi optarique potest, Plinio interprete, continetur. Hæc vna temperata ferax, mollis ad cultum, nec madida, nec sitiens demonstratur. Sic præterea soli mediocritatem ex veteri disciplina explorabis. Scrobem effodito: egestam humum regerito, & recondito. Si superauerit, pinguis erit: ut quæ aërio caloris, humorisque tanquam fermento turgescit. Si subiederit, macra: quod frigoris ac siccitatis terre-

De re rustica. c. 151.

Lib. 17. c. 5.

Colum. l. 8. c. 2. Pallad. l. 1. tit. 5.

terreno pondere deprimitur . Si æquata conue-
nerit , mediocris : extremis qualitatibus vt tempe-
ratione , sic loco in medium coëuntibus . Expres-
sum quoque parentis exemplum filij sunt . Si plan-
tæ decolores exilesque aboriantur , macram : si vi-
ridissimæ solitoque foliosiores luxurient , præpin-
guem : si modicè carnosæ sessilesque assurgant ,
attemperatam habilemque floribus humum signi-
ficant . Sic denique varium terræ ingenium aqua
exploratè dignoscet . Liquore illimi bene lota
humus si multum solvatur in limum : limosa pin-
guedo valde hortis accommodatam declarabit .
Si plus aquosi madoris , quàm limi habeat : super-
fluus humor corruptioni opportunam , atque adeo
infœcundam arguet . Si ceræ instar glutinosa tra-
ctantem pertinaciter remoretur : argillosa tenaci-
tas ab altrice seminum vi attrahi contumax fun-
dendis floribus auaram , ipsa quoque pressior ad-
hæsiō semina strangulans nocentissimam indica-
bit . Rimosam verò in primis fugies : ne radices
adobrutas sol admissus exurat . Quòd si citra su-
perstitionem certo auspicio siue tripudio augura-
lem coniecturam facere placet : illa temperatæ
vbertatis , facilisque culturæ habenda est humus ,
quam recens effossam volucres quærunt , rostroque
scalpuriunt : pinguis enim tellus vermiculorum
pabulo inuitat . Id ego terræ genus ex olitorijs hor-
tis accersendum aduehendumque esse aio : quòd
licet

*Constant. Po-
genus. l. 22. c.
3.*

*Olitoria op-
tima.*

licet annua stercoratio saginauerit; diuturna tamen
 tum insolatio, tum irrigatio macerarunt, nutrita,
 quoque olera nonnihil emunxerunt. In hoc autem
 olitoria^{rum} terrarum vnico genere permulta est inueni-
 re discrimina, & veluti qualitarum gradus: vt pro
 feminum radicumque varietate variam ex hac fo-
 dina terram petere, qui velit, possit. Hinc enim
 alia pinguior, alia macrior, alia solutior, alia spif-
 sior, alia ficior, humectior alia, alia leuior,
 alia grauior in florum vsus effoditur. Liceat hic
 mihi per delicatas atque emunctas lectorum na-
 res de fimo terram lætificante paucis agere. Res
 enim alioqui olida inter odoratos hortos, vt spero,
 grauius non olebit. Non est animus (quod ta-
 men Theophrastus, M. Cato, M. Varro, Colum-
 mella, Constantinus Cæsar Pogonatus, alijque
 grauiissimi fecere scriptores) in fimetis varia ge-
 nera gradusque præstantiæ contemplando per diu
 immorari: sed, quæ fœcundis è sordibus magis
 proderunt, cursim lustrare dicendo. Igitur de
 optimo stercoreis genere nihil habeo definitum,
 ac certum, quod afferam: quia neque priscis scri-
 ptoribus, neque recentibus colonis de eiusdem
 primatu inter se conuenit. Nam quod hominum
 est ab antiquissimis cultoribus, Theophrasto teste,
 vtpote acerrimum, præferebatur. Cassius autem
 apud Varronem, Quintilij apud Constantinum
 Cæsarem Pogonatum, nec non Columella colum-
 bino

*Fimus horcē-
 sis.*

*De hist. plant.
 lib. 3. c. 8.
 De re rust. l. 1.
 c. 38.
 De agricult. l.
 3. c. 19.
 De re rust. l. 3.
 c. 15.*

De re rust. c.
36.

l. 2. c. 15. & l.
41. c. 3.

bino tribuunt principatum : quia præferuidum est , humumque fermentat . Quare columbinum fimum in pratum , vel in hortum , vel in segetem spargi oportere rusticæ rei vrbani oraculum pronuntiavit Cato . At verò idem M. Varro ex animi sui sententia præstare assuevit merularum , ac turdorum fimum ex auarijs non solum ad vber agrorum , verum etiam ad boum , suumque saginam . Lauius enimvero , quam agris , ac belluis , consuluit colonis genialis iste doctor , cum turdos , ac merulas in hortensis culturæ consortium congregauit . Et plures (opinor) & pinguiore hac ætate colonos haberemus , si turdis , ac merulis horti pinguescerent . Primus quoque asino honos à Columella in hortis lætificandis perhibetur : quoniam id animal lentissimè mandit , idèoque faciliùs concoquit , ac bene confectum , minimumque herbarum creantem fimum reddit . Non pauci sunt , qui equinum magnificant : tum quòd bono conficiatur pabulo , tum quòd vulgò atque vtiliter vt leuissimus vsurpetur . Alij bubulo fauent : quia mitiore terram calore fœcundans posita semina non exurit . Bubalinum alij celebrant : quia nigram ac leuem terram , nempe sationi commodam facit . Nullum denique sterquilinum est , quod suum non habeat patronum ac vindicem . Vsq̃ue adeo sapientissimi viri non de lana caprina , sed vilioris de re digladiantur . Me quidem
in

in tam lutulenta palæstra pugnare non delectat.
 Vnum aio, spectandum esse in stercoratione cuiusque soli habitum: eum cuique terræ finum, præstabilem habendum esse, qui quanquam valde fecundet, hoc est apta permissione calefaciat, & resoluat, succosiorum quoque, laxioremque reddat, ut altricem facilius aquam exorbeat: ita pro multiplici terrarum varietate varia lætaminis genera, posse optima iudicari. Quin etiam cum antiquis, nouisque cultoribus censeo, si quocumque fimo deficiantur horti, congestas frondes, ac stipulas, atque ipsa, quæ macerari possint, vel terræ vel aquæ purgamenta fimi vicem aliquatenus exhibitura. Cæterum ad hortorum vbertatem ex veteri instituto duplex fiet, aut certè vnum bifariam diuisum sterquilinum; ut sit, vbi recens finus macerandus reponatur, & vnde verus iam putris in hortos exportetur. Idem ab hortenfi consepso modicè aberit; ut sit floribus fertili pinguedine iuuandis proximum, à floreis odoribus graui lædendis halitu satis remotum. Extructum paui- tumque solum habebit, ne transmittat humorem, quo fimi vires continentur, & interiecta stramen- tis aut paleis spinarum, vel graminum semina her- bidos hortos cæteroqui redditura intereunt. Ad hæc vel opaco & secluso situ, vel superpositis vir- geis cratibus à vento, & sole vindicabitur; ne suc- cum, quem terra quærit, ille exiccet, hic exugat.

Sterquiliniū duplex.

Cato de re ru-

stic. c. 29.

Varro de re

rust. l. 1. c. 13.

c. 38.

Colum. l. 1. c. 5.

l. 2. c. 5. l. 11.

c. 2.

Pallad. l. 1. tit.

33.

2

3

T

17

23

F

Itaque

Itaque, si possis, ut eò aqua influat eo nomine facies. Noua præterea per æstiuos menses luna non secus, ac si repastines, fimum rastro aut bipalio permiscebis, & comminues, ut is æqualiter computrescat. Recentissimo abstinebis: quia bona semina perurit, & malas herbas progenerat. Anno requietum, iamque flaccidum, si cum plerisque idoneis authoribus sentias, robustioribus plantis adhibebis: quia vires adhuc solidas habet, ut hortensem adiuuet fecunditatem. At verò, si

Agricult. l. 2. cap. 19. Pogonatum Cæsarem audias, fimum anniculum cauebis, quem ille non inutilem modò, sed multis etiam nominibus noxium, atque eo præcipuè censet, quòd innumerabiles bestiolas & serpentes creat. Verùm, & si vetustioreminùs prodesse veteres existimarunt, idem tamen Pogonatus, atque adeo diuturna experientia edocuit, trimum, aut etiam quadrimum tenerioribus præferim floribus tutiùs admoueri: longinquò enim tempore, quicquid fœtidum erat, expirauit; si quid durum, flaccuit. Quocunque tempore latamine latificandi fuerint horti, curabis ut aspirante fauonio, lunaque silente siue decrescente, ac sicca fiat: hac enim obseruatione humus minimè herbescens fertiliùs efflorescet. Illud quoque moneo sedulò cauendum, ne, nondum attenuato absumptoque fimo, terra floribus obserenda, stercoreosa sit: quia recentis fimi tabificus æstus at-

tactus-

Perfecti fimi
ætas.

Spargendi tẽ
pestiuitas.

Terra sterco-
rosa floribus
cauenda.

tactusque depositos bulbos adureret, aut putrefaceret. Scio esse nonneminem, qui duos intra palmos caballinum fimum substernat, cuius opportuno halitu bulbosæ radices superiniecto in solo positæ ad præcocem florum partum incalescant. Adeo ab insuaui suffimento verna suauitas properatur. Verùm ego in hoc nostratis mundi tepore superuacaneam censeo stercorariam suffitionem istam: eam salubriùs vsurpent frigidiores, ac præsertim aquilonares horti, ne materna intra terræ viscera florum matricēs penetrabili frigore perurantur. Quin etiam (quo minimè præsidio indiget Romana quæ temperies, quæ fœcunditas) gelidæ regionis cultrix industria per summum solum sparso calidæ efficacitatis fimo noxia gelicidia vel omnino defendit, vel quadante-nus mitigat, vel facilè regelat. Huc alterum adde non contemnendum emolumentum, quòd, intra terræ rimulas cum pluuijs aquis percolata fertilis fimi pinguedine, annuo partu fatigata hortensia culta non mediocriter refouentur. Quanquam id fomenti mense Martio, cùm longiores dies recalescunt, prouidi cultores amouent; ne vitiet inferuescens obrutas radices. Vt autem assiduo diuturnoque partu exhausta tellus ad floridam fertilitatem iuuenescat; sexto minimùm quoque anno, veteri emeritaque vnus, alteriusue palmi humo egesta, atque, vt iterata stercorazione pinguescat, ad olerum seminarium reuecta, iunior & succosior ex olitorio agro;

Substratus ac
superfusus fi-
mus alicubi
superuacane.

Quod annò
mutanda ter-
ra.

vt paulò priùs dixi, congesticia substituatur: parentis enim terræ iam effœtæ anilitas emaciatam parit, ac degenerat floream posteritatem. Sed quoniam laxiores horti plus exigunt operæ ac laboris; vnius anni difficile ac permolestum negotium sic est in plures tribuendum, vt hortorum aliqua singulis annis pars recenti humo renouelletur. Prædicta olerum atrix humus non bulbis modò, atque anemonarum radicibus, sed caryophyllis etiam, rosisque lectissimis, necnon arbusculis, fruticibusque floriferis, minutis denique feminibus commoda est: dum tamen hisce postremis, vt in loco mox dicam, tenuissima incernatur. Monet igitur calidissimus magister, vsus, vna oleribus priùs confita tellure omnia florum genera, tanquam oleraceæ vbertatis decus & præmium, felicissimè progenerari. Nam fama est, siue fabula; gemellæ enim sunt, ac simili sæpe vultu fallunt: fama, inquam, sic fabulatur, paucos ante annos, cum, ferro abrogato, florem seculum suo Flora de nomine condere, opiparoque conuiuio condire vellet, ad florales hortos priscae fabulæ numerosam sobolem, Deos omnes per blandissimum apparitorem Zephyrum accitos conuenisse. Eminent in hortensi meditullio spatiosa porticus & peruia, Apolline Dædalum agente ac facilè superante magnificentius, quàm Troiani muri, labor itidem Apollineus, excitata. Etenim aureis columnis ordine duplici surgent-

Telluris pe-
roratis fabu-
la.

Porticus cõ-
uiuialis.

furgentibus & validè fulcitur, & nitidè coronatur. Corinthiæ venustatis argentea capitella flexibili acantho, vt hortensem decet architecturam, foliosa sunt. Argenteæ pariter bases, principum hortorum gemmea descriptione, fidelique mendacio tessellatæ pretiosè vernant. Longum esset imitamenta singula breuiter enumerare. Vt è compluribus pauca, quæ succurrunt, à remotissimis regionibus ducta narratione recenseam: illic visitur barbarica opulencia conditi Byzantij Horti Byzantij Othomanorum. viridarij ornatissimum simulacrum, non Othomanica modò barbarie ad florum cultionem, sed ipsa etiam ferme indomabili gemmea duritie ad eorundem imitationem mansuescente. Illic gemmarum omnium discolori fulgore florentes Hispanorum Regum inter odoratas auras à regijs curis respirantium Toletanæ deliciæ simulantur, Toletani Regum Hispanorum. quas non minùs aurifer vero fictus Tagus, quippe qui solido constat ex auro, congruenter irriguus interfluit: gemmeis enim hortis decora est aurea irrigatio. Illic Brabantinorum Ducum magnificentissimis ædibus adiuncta Elysia Bruxellæ Bruxellenses Brabantinorum Ducum. conscripta, magnam vrbis pulcherrimæ partem continenti muro complexa minutissimæ commissuræ splendida breuitas ita exæquat, ac simulat; vt ficta veris, & parua magnis composita non inuideant. Gallorum illic Regum Parisienses hor- Parisienses Gallorum Regum. ti cæteris quidem floribus pretiosè gemmascunt,

Viennenses
Cæsarum.

Eystadienses.

Salisburgenses.

Mantuan
Gonzagæ
Ducum.

sed regalibus Lilijs illustrius aurescunt . Proximus his crystallini Sequana liquoris licet ex gemma, rigeat, ad obsequium tamen artificii fraude emolitus Regios flores allambere & colere videtur . Nec minùs felici fallacia Viennense amplissimæ amœnitatis viridarium, Austriacorum Cæsarum, gloriæ coronarijs & floribus & laureis fœcundissimum in gemmei contrahitur imitamenti miraculum . Ad hæc Eystadiensis veris læta species inter Germaniæ floret niues . Neque hîc desiderantur Salisburgenses vniuersa hortensi amœnitate inclytæ deliciæ, in Germaniæ quidem solo amplitudine mirabiles, sed in gemmeo simulacro ingeniosa contractione mirabiliores: vt iam non, vetus malorum, sed recens bonorum Ilias suspiciatur . Hîc etiam totius anni verna formositas non modò multiplicis & fontis & lacus, verùm, etiam allabentis Iuuauij fluminis liquido limpidoq. speculo decentiùs, quàm fontano liquore fabulosa Narcissi forma, geminatur . Hîc immistæ siluulis feræ, sine feritate veris simillimæ, innocentibus mutuoque venatu & vnis capiuntur oculis, & oculos capiunt . Hîc effossus in theatrum saxeus mons veteris magnificentiæ montes edomantis spectaculum integrat sumptuosum . Hîc denique opulenti splendida maiestas ædificij, ne perstringat aciem contemplantium, per circumfusa vireta gratior interlucet . Tu quoque Mantuana Gonzaga-

zagarum, Parmensis Farnesiorum Ducum scena,
 hortensis, viridissimis corusca siluulis, liquidissi- Parmenses
Farnesiorum.
 mis vda fonticulis, nitidissimis expicta flosculis,
 quæ Mincij, quæ Parmæ fluuiali ambitu munita,
 in discoloribus gemmulis compendiaro artificio
 refulges: quòd hortensium omnium vasto com-
 plexu deliciarum pretiosa voluptas nisi gemmeum
 in exemplar aptè contrahi non potuit. Illic etiam
 ex aridis horridisque Apennini aspretis floriferas
 vndas euoluens Arnus, & gemmeus & veri ge-
 mellus, priùs Hetrusco Duci cumulata felicitate
 Magno, quàm Regi aquarum Oceano prodigè
 tributarius Florentia Tempe in hortensem amœ- Florentinæ
Mediceorum
 nitatem adeo fœcundat; vt amœnissimæ vrbis ip-
 sum quoque fluuio quondam aspersum nomen fe-
 licissimè iam florere faciat. In vno Neapolitanas
 delicias cumulante Casertani Principis Hymetto Casertani
Principis
Aquanuæ.
 fideliter effingendo vix habuit ars ab vniuersis
 gemmis tam variam & versicolorem lucem; vt
 vernos colores naturæ lectissimorum florum gem-
 mantem speciem explicantis æquaret. Caterùm
 nihil ibi ornatius, quàm Romana floralia, quæ Romani.
 quamuis gemmato imitamento adumbrata claris-
 sima sunt, quamuis in arctum coacta magnitudi-
 nem habent maximæ hominum admirationi pa-
 rem: siue ad portam Næuiam & Neronianos ar-
 cus aquam Claudiam in Palatium olim deriuant-
 es Cornelia te mirabundum hospitem detineant, Card. Corp.
nelij.

- hoc plaufu profequenda; Venetum florem etiam
Matthæiorū. Romanas ad aquas percunare. Siue Matthæia de-
 lectent; vbi Cælius mons amœnitate pæne dixe-
 rim cæleſti vèrnat; vbi regia cuſtos, gentilis Aquila,
 fabuloſo Iouis contempto famulatu, in florea
Peretrorum. ſpecula nidulatur. Siue Perettina te ſuſtollant ad
 Viminalem non tam arduo ſitu, quàm hortenſi gloria Montem pulcherrimè Altum: vbi familiaris
 Leo à Dominis & domicilio mite ingenium trahit,
 dum non in ſpelæis exulat, ſed pro floribus excu-
 bat. Siue Pia inuitent tum Pacis templo decenter
 appoſita, quòd pacifera rident viriditate: tum
 cruentis olim ſpectaculis nobili Amphiteatro in-
 genioſè oppoſita, quòd gemmea florum purpura
Farneſiorum. innocentiffimè cruentantur. Siue Farneſiana con-
 ſideres ad ſtatu Tyberis liquidiffimum aurum ap-
 poſitè ſita: quia cælo concolor Farneſiorum flos
Mediceorum aureo debet humore nutriri. Siue in veteri Hor-
 torum colle Medicea oculos alliciant; quòd in
 ipſis priſtina omnis eius loci illecebra reſlore-
Ludouifiſiorū. ſcat. Siue proxima tum Ludouiſia, tum Bur-
Burghèſiorū. gheſia contemplere: illa domesticorum teſtifi-
 catione inſignium purpura auroque florentiſſima:
 hæc ampliſſimi muri ambitu delicias amplexa,
 vniuerſas, pretioſiſque Heſperidum hortis mul-
 tò attentius cuſtodita, quòd vigili Draconi per-
 ſpicacem Aquilam addiderunt. Siue in Quirina-
Aldobrandi- li ſaltiſtig conſpicua ſuſpicias tum Aldobrandi-
norum, na,

na, quibus eò benigniùs, quò propius affulgent si-
 dera: tum Bentiuola, vbi geminarum bis auspi- Bentiuoloni.
 catum insigne Aquilarum amœnitatis regiæ mi-
 raculum singulare præmonstrat: tum Barberina, Barberinorū.
 vbi tanquam Romana in Hybla sub Apum ima-
 gine suauitas Urbana mellificat. Verùm vt in
 eodem Quirinali, & Vaticano colle, ornatu maie-
 statis plenissimo grauissimæ prouinciæ curis su-
 bleuandis Pontificij eminent horti; ita imitatrici- Pontificum:
 bus augustiùs enitent in gemmis. Quidni enim
 coagmentatæ gemmæ, tanquam famulæ stellæ, à
 Romano sole cum luce maiestatem trahant? Il-
 lic præterea splendida specie, vt alibi re ipsa,
 cum formosissima Vrbe certant proximæ ac sub-
 urbanæ deliciæ, quæ in Faliscis Balneariam, & Horti Bal-
 Ciminiam Caprarolæ villam purpurea Condi- neariæ.
 torum gloria illustrent: quæque in Latio Tuscu- Horti Capra-
 lum ac Tibur exornant, quarum illæ ambitu non rolæ.
 amplissimo plurimorum Principum voluptati pa- Tusculani
 res in patritiæ nobilitatis coloniam transierunt: Principum,
 hæ verò amœnissimo, quâ situ, quâ opere sic emi- plurimorum.
 nent, vt Romanæ maiestatis olim Tibure rusti- Tiburtes
 cantis veteres moles non sua ipsæ magis multi- Estensiū.
 plici ruina, quàm vna Estensi magnificentia
 obruantur. Ipse Anio pulcherrimæ structuræ ad-
 mirabilitate suspensus, sui que ad Romana miracula
 cursus frequenter oblitus totum præcipitantis vn-
 dæ

Cisternæ
Caëtani Du-
cis.

Dapes floreæ

Deorum al-
lucinatio.

dæ diluuium ad hortensæ diuerticulum innocenter
declinat, tantusque tamque vetustus fluuius in sub-
sultim ludibundos fonticulos & siphunculos obse-
quentissimè repuerascit. Nouissima floret etiam in
gemmis Francisci Caëtani Sermonetæ Ducis volu-
ptas nuper condita & consita propter oppidum,
quod amico floribus Cisternæ nomine hortos pul-
cherrimos exigebat. Hæc circumstantium columna-
rum aurea forma: hic argenteus, & gemmeus orna-
tus. Testudo sapphirina, cæloque concolor, seu po-
tius gemmeum cælum vitilium herbulæ ambu-
tiosos ramulos diffundentium textili è sectilibus
gemmis topiario ita conuestitur atque opacatur,
vt clariùs fulgeat. In pavemento denique smaragdi-
no, herbida luce florido, discoloribus lapillis mul-
tiformes in areolas nitidè variato calcantur quidem
opes opusque nobilissimum, at non philosophico
Cratetis contemptu: manus enim pedibus inui-
dent contactus diuturni felicitatem. Hanc ego
amænissimi horti mediam porticum pulcherrimam;
si verbis audere tantum liceat, quantum
rei dignitas vocabulis maior postulat; appellare
non timeam florei maris insulam fortunatam.
Postquam hic cælestes conuiuæ super instrata pur-
pura discubuere, inusitata epularum miracula in
auream mensam inferuntur: singuli enim missus
florei sunt, in florum genera discriminati. Quare
mirari primò Deorum chorus, & alius alium cir-
cun-

cunſpectare, quid ageret: deinde ieiunum in riſum ora diducere, quòd in illa florea lautitia oculis tantùm naribusque ſibi epulandum eſſe exiſtimaret. Tum Flora corridentibus, ſeſeque lepidò aſtu deluſos opinantibus argutè ſubridens, Experiamur, inquit, an etiam palato ſapiant flores mei: roſamque aurea de lance ſummis digitis præcerptam, pulchrioriſque in roſetum oris inſertam, ſcituſculo preſſu morſicatim præflorans addit: Papæ! dum roſa hæc flos nectaris eſt, & flos ambroſiæ; præſtat apem eſſe, præſtat ſugere, quàm olfacere. Quas verò dapes ſibi magis decoras Flora, quàm flores vobis apponeret? Tunc enimvero ſenſere Cælitæ omnes in terris quoque ambroſiam eſſe. Cælitibus ipſis expetendam, cuius cæleſtis ſuaui-
tas epulari bonoque dolo terrenam formam ſubitura non potuit ſuauioris formoſitatis epulas, niſi flores, præſentare. Quis iam dicendo explicet ad agnitas peregrinas epulas Epularium auiditatem? Quis à guſtu eminentem in omnium vultu, atque adeo in feſtiuiſſimis acclamationibus voluptatem? Illa omnium erat vox Deorum vna: Si tam ſuaui-
ter florerent horti; Deos omnes, acclinata maiestate, ſemper in ſoſculis colendis ruſticaturos. Hic ad hilaritatem erugato regio ſupercilio Iuppiter, Cur, inquit, edulium deliciarum alma parens Tellus pulcherrimos floreos fœtus artiſcioſis hiſce deteriores, utpote aut fatuo ſapore non appetendos,
aut

aut venenato succo fugiendos paris? Responso aliquantisper expectato, nec accepto, Tellurem Iuppiter inter confertam conuiuorum multitudinem oculis diu quæsiuit, nec inuentam ut abesse cognouit, Et abest, ait, in florei seculi natalicij magna mater florum? Tum Flora, demiror equidem, inquit, non interesse disertè vocatam. Quamquam, fortasse nec dum potuit: sua enim mole prægrauis lentè festinat. Sed iam ego lentissimam grauitatem istam Archimede facilius efficaci machina incitabo. Ministrabant regali facie puellæ centum, Auræ leues agilesque, atque inter seduli ministerij laboriosos excursus recursusque odoratæ animæ tenera reciprocatione sine flabello flabelliferæ genialem conuiuij calorem ventilabant. Ex his natu minimam, ore argutulam, vultu roseam, crine auream, lacteoli corporis candidum iubar lineæ nebula castè vmbrantem, pubescentibus per glabellos humeros versicoloribus pinnis volatilem, extimis tenellis plumulis tremula palpitatione lasciuientibus ipso in otio inquietam Flora sic alloquitur: Age mea festiuitas, mera pernicitas, mea motacilla, Aurilla, Tellurem Deam tardigradam, vbiubi gentium erit, inuestigatam incitatamque tecum huc quàm ocysimè siste. Vix dum imperarat Flora, cum imperata ferè iam fecerat Aurilla. Vagulo enim volatu immensâ terrarum spatia, emensa iam erat: nec tamen in terris Tellurem inuenie-

Tellus absens
accititur.

ueniebat. Quacunque roscidulas alas concutiebat, sudum ver impluebat: quacunque halantem halitum anhelabat, extemporalem amœnitatem inhalabat. Desperauerat posse præterea inueniri per amœnissimos omnes quæsitam hortos: cum, ubi minimè rebatur, tandem reperit. In abdito ignobilique hortulo, varijs oleribus liratim positis ordinatim viridicato Matronam prospicit cruda viridique anilitate meliùs, quàm purpurisso, annosum os fucantem interpolantemque; obessimam eam quidem, at sedentario labore operosam: phrygio enim opere vera olera mentiente matronalis populi oras lactucis, & brassicis; cæpis, & allijs, ceterisque oleraceis imaginibus insigniuerat; ac tum fortè manum ultimam imponebat. Tunc Aurilla stabili murmurillo eloquenter eblandita facile Telluri persuasit, ut nimium diu expectata præter morem molemq; properaret. Iucundissimæ nuntix aspirantibus hilarata blanditijs loci eius olera omnia vultu viridioreriserunt. Ipsa Tellus insolito afflata imperu recens elaborato magnificè se peplo exornat; leuique curru, quem curulis rapit leo, quàm citissimè prouecta, peplum vibrante alludentis Aurillæ aspiratione, in sicco velificat. Interea, dum Tellus acciretur, eruditum Iouis nodum vicario Flora responso expediuerat: atque inter multa, quæ nunc referre non vacat, responderat, ideo formosissimos terræ filios, florum ple-

Olitorio in hortulo inuenitur.

Cur florum pleriq; insulsi, venenati, inodori.

rosque

rosque aut insulos, aut venenatos, aut malè olidos, aut saltem inolentes fatua specie colorari: ut ne nimium colori credat coloratis præstigijs facilis capi mortalitas: utque non in herba solum vanissimæ spei; sed in flore quoque brevissimæ formositatis anguem latere condiscat. Quanquam erravi, nec opus habeo (inquit illa) cibariam hortensium florum suavitatem argutè dissimulare: quando flores omnes nectarei sunt, merumque mel, quod Apes ministræ sedulæ hominibus colligunt, & præstant. Quærenti præterea Baccho, quis amœnissimæ indolis coquus suauissima illa cupedia in flores vernare fecisset, cum Charitum artificio florida ea bellaria concinnata esse subiecisset Flora; pinguis ventris, & pinguioris Mineræ Deus præter expectationem acutè, Enimuero sic decuit, inquit: è manibus enim Gratiarum quid potuit aliud præter flores existere? Verum ubi se tandem in conuiuarum conspectum dedit optatissima Tellus, olitorij sylvæ textilem pompam trahens, omnium risu excepta iucundo spectaculo conuiuij lætitiâ cumulauit. Flora iussam discumbere conuiuali vrbanitate sic dicitur allocuta. Quamuis fera, tamen ades tempestiua, Omniparens mater. In tempore enim post florea mea fercula secundas ipsa mensas in ista oleraceo textu fertili veste attulisti. Aculeato ioco solito grauior Tellus pauca hæc, & seria. Illusa vilium olerum

figu-

Telluris habitus ride-
tur.

Einſdem pro
ſe oratio.

figuris, ignobilique viriditate mihi atra & infelix vestis hæc misericordiam opemque implorat, Flora, non risum & ioca. Damnatæ parentis in vulgarium partum herbularum quidni paratus agresti opere amictus concolor herbescat? Inani iam nomine ad ludibrium mater dicor omniparens; quando cinis & sabulo, nempe sterilis pulvis ad floræ fecunditatis gloriam eliguntur. Quid hoc artis est repugnare naturæ, terraque genitali relicta satius humani generis delicias è cinere arenaque demettere? Si placet floream ætatem diuturnam, stabilemque fundare: non levis pulvisculus, sed solida, tellus fundamentum esto. Si quid merui olerum, opportuno fructu, florum vbertas honoraria remuneret. Si patritiam inter Deos matronam oleraceo virore vulgaris palla dedecorat; vestro Cælices suffragio, tuo Flora beneficio floridæ purpuræ nobile syrma condecoret. Audita Deorum omnium assensu atque approbatione Tellus suam feliciter causam peroravit. Nam florali conuiuio soluto cælestis Senatus consultum per vernum præconem Zephyrum in hæc verba recitatum est. Quod felix Floræ, bonum floribus, faustumque florum cultoribus sit: cum, quod nimium diu non minus in animorum indole, quàm in annorum nomine regnavit, ferrum longè lateque iam propagato florum cultui seruiat; in floralibus Deorum omnium comitijs, Flora rogationem ferente, cætero-

De flore saculo, deque hortensi terra Cælitum edictum.

terorum Senatu Deorum censente, ferreæ floream
decoro, aptoque transitu nomenclationem subro-
gari placuit : & appellatione ferruginea deter-
ta, à communi mortalium studio erga flores flo-
reum seculum appellari. Illud præterea florifero-
rum hortorum coloni omnes inuiolatè seruant, quod,
magna matre Tellure ad eundem Senatum
referente, sancitum est: ut, superuacanea cineris
fabulique cum terra permistione antiquata, pura,
putri, atque in ipsam terram transformato, fre-
quentique olerum fœtu nimia pinguedine depasta,
subpinguis prognerandis floribus vsurpetur, atque
olitoria fœcunditatis beneficio florida gratia refe-
ratur. Hoc tam iucundum tamque iustum edi-
ctum genialibus comitijs peractis, ne cui florum
studio ignoreretur, Iouis Floræ gratificantis ius-
su à volucris cursore Zephyro singulis hortorum
postibus præfixum est.



FLORVM

NOTAE

LIBER SECVNDVS.



Narcissorum nota.

CAPVT I.



VID hortorum cultori turpius
aut etiam nocentius, quam
flores, nempe familiam suam,
de facie non agnoscere? Nam
quî suis quenque locis aptè di-
sponere, atque educare possit;
nisi lineamenta formasque di-

*Cur flores co-
loris prano-
scendi.*

stinguat? Et quanquam multiformes florum na-
tales indiscreta specie, & concordia figura simillimi
nequeunt internosci: complures tamen sunt aut
claro, aut certè obscuro discrimine notabiles, quo-
rum, vti licuerit, notas persequemur. Neque ve-
rò hîc vniuersos, sed eos duntaxat flores suis colo-
ribus exprimemus, quos nostri exhibent horti; vt
necessitati pariter, & breuitati consulamus. Illud

*Complures
indiscreti.*

G 2

autem

Bulbacei ple-
riq. aut hya-
cinthi, aut
narcissi.

R. Dodon. *Step.*
Hist. p. mpt. 2.
l. 24. 18.

Narcissi no-
men vnde.
Plin. l. 21. cap.
19.

Narcissus ge-
nere, & colo-
re varius.

Narcissus to-
tus candidus
flore simplici
polyanthes.

Narcissus co-
lore sulphu-
reo, flore
simplici po-
lyanthes.

autem præmonitos cultores volo, è bulbaceis flo-
ribus, qui plurimi antiquitati prorsus ignoti, at-
que anonymi coluntur in hortis, narcissos, aut
hyacinthos ab erudita plerisque posteritate cen-
feri: & grandiores quidem ad narcissinum or-
dinem, minores ad hyacinthinum reuocari. Nar-
cissus à narce dictus, quòd aliena grauet capita,
suum prius prægrauauit; cum fabulosus umbræ suæ
amator puer è fontani speculi sincero nitore malè
sibi notus, atque è frigidis aquis tabificam flam-
mam trahens, ex homine in caducum florem dila-
psus est. Etiam nunc mutatæ formæ studiosus ore
vernatur multiformi. Aut enim simplici foliorum
textura tenuior, aut multiplici habitior est. Nunc
argenteo, nunc aureo pallore veteres curas præ-
fert. Medius flos, quem ab imitamento calicem,
cum recentioribus in posterum appellabo, inter
lactea folia aut suauiter concolor lactescit, aut splen-
didè decolor aurefcit, aut circa summam oram
croco illitam lepidè rubescit. Sed quis coloris,
magnitudinis, formæque inexputabiles varietates
enumeret, natura cultuque ad assiduam nouita-
tem conspirante? Nostris autem hortis familiaris
potissimum est, qui colore totus argenteo suffun-
ditur; vt à medio candido calice in pateræ formam
depresso argenti patera Italico vocabulo nomi-
netur. Neque tamen huiuscemodi narcissus vno
argenti candore, sed sulphuris quoque pallore pin-
gitur.

gitur. Idem præterea in plura genera discrimina-
tur. Alius enim præmaturè, serò alius vernal:
alius minutos,modicos alius,alius peramplos in flo-
res è caule summo se diffundit: alius denique fo-
liorum simplici serie, alius multiplici componi-
tur. Hic ergo tum candido, tum pallido colore
narcissus à cæteris narcissis discrepat floreis fo-
lijs angustioribus, & calice breuiore. Virentia,
quoque folia sæpe angustius patent, longius porri-
guntur, læuiores & rigidiores sunt. Nec eadem om-
nibus tinctura. Candidum allij virore albida, & ve-
luti rorulenta; pallidum myrti exemplo viridissi-
ma conuestiunt. Bulbi membranas extimas co-
lor austerus infuscat; intimas tunicas dilutus deal-
bat: magis compacta forma ventrem deprimit;
cervice modicè producta. Quin etiam isto eius,
qui folioso floret argento, bulbus depressior est.
At verò maioris floris bulbosa parens vastiore
corpore, ventre oblongo, procero collo, spadi-
cis coloris dilutioribus tunicis notabilem in mo-
dum insignitur. E foliosis albertibus narcissis By-
zantius, siue Chalcedonius perplacet, & colitur. Hic
tum præcox, tum serotinus membranacea primùm
vagina includitur, quæ longum in alabastrum, ut
simplicis floris folliculus, non fastigiatur; sed ro-
rundiore gremio latius tumet. Ea demum dehi-
scente numerosus, & formosus partus excluditur.
Deni aut duodeni fratres ex vno caule penduli sæ-

Narcissus By-
zantius poly-
anthes, albo
flore luteoq-
calice multi-
plex.

pe numerantur. Alba folia densissimo congestu bene compactum tribuuntur in florem. Media foliola vario atque multiplici flauo calicis mæandro intercurfante vndatim, intercise, permisteque implicantur. Subsimilem alium narcissum, sine medijs albis foliolis densato, atque in rugas replicato flauo coloris orbe multiplici cristatum, nimiam in sobolem luxuriantis bulbi decorum abortum esse constanter affirmant obseruatione diuturna experientissimi cultores: quod & numerofo sætu efforta radix, & adnata posteritas nondum per ætatem satis robusta floribus explendis idonea non sit; cum deinde, vbi iustam in rotunditatem adoleuerit, prioribus pares, atque adeo æquè foliosos flores generet. Alij verò, & quidem callidi rerum æstimatores existimant, certis è bulbis minore vi præditis mutilos eiusmodi partus perpetua stabiliq. lege existere: nec defunt, qui eosdem, vtpote Epidauro missos, Epidaurios appellent; ac duplici potissimum procerioris caulis, maiorisque floris nota distinguant. Equidem (vt erudita diffidia ista componam) non negauerim, ex imbecillis radicibus hæc interdum speciosa monstra posse progigni; simulque inueniri crediderim radices alias ita natura constitutas, vt flauentibus tantum crispulis cristis albidos partus suos exornent. Vtriusque foliosi narcissi caulis herbaceus de more nudus, concavus, atque striatus digitali ferme crassitudi-

ne

*C. Clus. Rarior.
plant. Hist. l. 2.
cap. 13.*

Narcissus
Epidaurius.

ne , & pedali longitudine affurgit : virentibus folijs nonnihil carinatis , & paulò , quàm in simplici narcisso , laxioribus circunvallatur . Bulbus carne intus candicat , conuestientibus tunicis foris nigricat , & in rotunditatem conglobatur : præcox magnitudine nostratis narcissi bulbum æquat , serotinus etiam superat . Hic etiam illo , qui præmaturè floret , magis compactus & rotundior ad florem difficilis & morosus est , frequentemque in rotunda basi cariem trahit . Non solet in semen exire in florei fetus præstantiam exhausta vtriusque fecunditas . Eminent foliosus alius duplicis generis narcissus , corniculati nomine insignis . Minor sex alba folia minuscule in orbem expandit : in umbilico aureum calicem crispantis auri plenissimum porrigit : inde sex flava cornicula in stellam diducta surrigit . Quaternos quinosue flores profert , ac sustinet caulis , priore tenuior atque humilior . Ab radice folia exeunt prolixa , gracilia , mollia , & subalbida . Bulbus denique subest à vulgatis narcissinis vna corporis mensura paulò brevior discretus . Maioris bulbosa radix vulgaris narcissi bulbum adæquat , ceruice perparum extante : folia tenuitate , ac prolixitudine superioribus non dissimilia minùs pallent : scapus insigniter procerus in diuturnumque ferè palmorum longitudinem procurrit . Complures è membranaceo involucri flores quàm prospero , quàm abortiuo partu excluduntur , quo-

Narcissus
corniculatus
minor, & ma-
ior, polyan-
thes .

Narcissus to-
tus flauus po-
lyanthes.

Narcissus sil-
uestris stella-
tus.

rum folia flauentis lineæ ductu eminulo intermean-
te liberaliter colorantur. Vt igitur vides, vterque
narcissus cornibus armatus longè fugiendus non
est: non enim fœnum habet in cornu, vt vulnera
præcaueantur; sed odoratum aurum, vt oculi na-
resque suauissimè feriantur. Iam verò ne qua nar-
cisso desit opulencia, præter argentum etiam au-
rum totam floris bracteam opulentat: siquidem
inter simplicis compositionis narcissos & folijs, &
calice aureus in pretio est. Hic discoloris auri, va-
riæque aut conformationis, aut amplitudinis leuib.
momentis pulchrè dissidet à se ipso. Superioribus
albis narcissis caule, florumque pensili congerie
similis, folio, bulboque differt: illos enim foliosior,
hunc rarior plerunque silua distinguit: illi bul-
bum ipsum rotundant, hic in pyri effigiem turbi-
nat: circumtegentes tunicas illorum plerique fu-
scant, hic modicè rutilat. Simplicium denique
narcissorum ritu triangularibus folliculis nigrum,
& inæquale semen includit. E minuscule narcissi
aureolo, à reliquis vna breuitate seiuncto bulbulus
pendet rotundus, & nigellus; decolor nempe de-
cori floris appendicula. Verùm illi ditiores nar-
cissi sunt, qui frequentium foliorum flauentibus
bracteis aurescunt. Et in his genera variant. Alium
videbis à siluis oriundum è pallido bulbulo pusil-
lum æquante narcissinum bulbum, qui de iun-
ceis folijs nomen Hispanum traxit, inter angusta,
ob-

oblonga, tenuia, carinata, & pallidula folia ferè
 palmari, gracilique cauliculo innixum profilere;
 & creberrimis folijs in stellam distributis confer-
 tim coagmentatum, albo giluoque confusis in-
 paleæ speciem colorari. Subsimilis alius rosea spe- Narcissus sil-
uestris roseus
minor.
 cie, bulbo & flore paulò amplior, & coloratior à
 collaris rugati crispissimo imitamento Gallicum.
 Frasei nomen adeptus rarò floret, florea membra-
 na ægrè dehiscente, ac plerunque vitium faciente.
 Sed excellere se cæteris ipso vulgato iam nomine Narcissus sil-
uestris roseus
maior.
 significat septentrionalis, siue siluestris narcissus,
 cui Roseus maior nomen est. Is enim luteæ fo-
 liofa rosæ decora suppari gyro complexus media,
 floris folia calicis loco densissima complicat, &
 crispat; simili quoque auro colorat, folijs alijs quâ
 luteis, quâ pallidis, quâ herbaceis per ambitum
 congestis, & explicatis. Illud præterea familiare
 ipsi est, vt à foliorum densitate, & copia particula-
 tim efflorescat. Etenim extremis folijs marcenti-
 bus & præmorientibus, mediæ conuolutæ panicu-
 læ paulatim euoluuntur in flosculos. Quanquam
 illa florea congeries rarò difficulterque digeritur,
 ac dehiscit ad plenum. Roseus hic narcissus, siue
 narcissina rosa solitaria scapo insidet bene firmo,
 anguloso, duos circiter palmos alto; ac, tanquam
 ipsa sibi onerosa, nutat. Ex imo folia modicè con-
 surgunt, liberaliter patent, mucronem retundunt
 & rotundant, in viridi pallent. Bulbosa radix pro-
 pe

pe rotunda exteriores tuniculas diluto colore ferrugineo suffundit. Iunceo folio, amploque tum flore tum calice narcissi plerique saturo colore lutei sunt, & prope inodora pulchritudine tantum spectabiles, necnon eodem in genere multiformes.

Narcissus iuncifolius maior, amplo calice, & folijs conuolutis.

Alius enim foliorum oras nonnihil vtrinque conuoluit, calicisque semuncialis ferratum, & sinuosum labrum diducit. Ad hæc singulos, binos, atque adeo senos interdum flores, folijs totidem in orbem compactiles è folliculi sinu excludit. Scapum gracilem, concavum, rectum, pedaneum, atque ex nobilissimi cultoris obseruatione simplicem excitat. Si quando autem plures coniunctim caules emittat; multiplicem bulbo fertilem florum sobolem adnatam esse significat. Bina, aut etiam tria profert ab radice folia pedalis, aut certè maioris longitudinis, angusta, cuspidata, carinata, fusco virore herbida, & succi plena. Bulbum subtingit substricto ventre oblongum, collum non raro detorquentem, diluto exterioris tunicæ colore spadiceum. Alius explicata, & coniuncta, imò inuicem superuenientia folia perpetuo velut orbe continuat: saturatiore colore lucet: angustior calicem magis crispas: superiore infæcundior quaternos circiter extrudit flores: eodem viuacior seriùs deflorescit: languidam suauitatem olet: ima folia mensura breuiore profundit: bulbum subijcit formæ consimilem, sed aliquan-

Alius folijs continuatis.

quantò contractiorem. Alius demum angustioribus floreis folijs in stellam diradiatis teretem, æquabilemque calicem exporrigit. Nostrate sub cælo binis ternisue floribus avarè vernat: folia itidem carinata latius explicat, & parcius producit: bulbo gignitur persimili, sed longè minorè, minusque cervicem detorquente, necnon subnigris inuolucris tunicato. At verò narcissus iuncis folijs odoratus, ac totus liberaliter aureus, superioribus inodoris minor, à soli natalis nomine Hispanus, à medica vi (vt Remberto Dodonæo placeat) vomitorius & simplici, & multiplici foliorum serie flauet. Ille florum folijs mucronatis, aut orbicularis; coniunctis, aut deiunctis: ipsis quoque flosculis præcocibus, aut serotinis; grandiusculis, aut minusculis; binis ternisue, aut etiam denis pluribusue ex vnoquoque cauliculo emicantibus variis; ac partim vnicaulis, partim multicaulis est. Hic verò vt plurimum singulos, binosue; vt maximè quaternos, aut quinos vnico è caule flores promit, florem gelsimini, malique Medicæ halitum suauissima temperie olentes. Veriusque caules saturator viriditas, inoffensus læuor, ac teres rotunditas compæres facit. Veruntamen duplex eosdem nota discriminat. Illos enim proceritas ferè bipalmis extendit, hos pusillò breuior longitudo contrahit: illos continuum foramen vacuat, hos fungosa quædam natura modicè obstruit.

Alius calice tereti, & folijs angustioribus.

Narcissus iuncifolius minor odoratus simplex, & multiplex.

Stirp. Hist. Pempt. 2. l. 2. cap. 22.

A

A

A

struit. Folia pariter viridantia, oblonga, rotunda, carnosa, lævia, & planè iuncida. Bulbuli plerique globosi: minùs plerunque viles oblongi, dissipatis in longitudinem viribus: rotundi feraces, toto in floriferos nìsus collecto corpore. Idem omnibus color: extima enim pulligine nigricant. Hoc etiam inter vtrunque narcissum conuenit, vt longulos proferant è membranacea theca flosculos, quibus ille triangularia capitula subiicit, flore dilapso turgentia, & nigelli angulosique seminis fecunda: hic autem longulis tantùm pediculis insistentes, nulloque seminali folliculo capitatos parit, genitali conatu in floris plenitudinem effuso. Triplex est præterea Hispano superiori luteo non dissimilis, albo colore vernus narcissus. Prioris oblongus bulbulus iunca foliola fundit humi reptantia: minutum, inolentem, informem flosculum, Martio mense tempestiuum Romanis in hortis ægrè raroque aperit. Alter grandiusculus, Hispanique narcissi partibus cæteris gemellus, albore ac fœtore discrepat. Huic æqualis tertius candida folia sulphurei coloris calice distinguit. Vterque continenti foliorum serie florem orbem circinat. Est etiam, qui è longulo substrictioris vèntris bulbo caulem ante folia impellens, binis ternisue, candidis, & leuiter odoratis flosculis per autumnum, vernet Hispano par, viridissimus, planeque iuncæus minimi pretij narcissus. Silentio dissimulan-

dus

Albus minor.

Albus maior.

Albus sulphurei coloris calice.

Albus autumnalis.

dus non est satis elegans iuncea itidem folijs, albi-
 doque colore in sulphureum proclui, & reflexo
 flore narcissus alius; cuius è radice bulbosa, nuci
 Ponticæ, aut Hispani iuncea narcissi bulbulo exæ-
 quata, rotunda, candida, membranaceo inuolu-
 cro infuscata, numerosis tenuibus albisque fibris
 bene comata, exiliunt quaterna vel quina folia, vt
 in proximè superiore narcissi iuncea, prolixa, an-
 gusta, modicè carinata. Medius consimilis caulis
 Aprili mense fastigiatur in quaternos aut quinos
 flores oblongos, diluto sulphureo colore pallidos,
 sex folijs sursum reflexis supinos, deuexis ceruici-
 bus pronos, semuncialem aut longiusculum &
 inæqualiter sinuosum calicem porrigentes, leuif-
 sum odoratos. Corruptis floribus summi caules
 triangulari turgescunt in capita, exigui, orbicu-
 lati, nigri, lævisque seminis plenissima. Pseu-
 donarcissos Hispanos Clusius vocat silvestres Do-
 donæi narcissos, qui sena inter folia velut in alas
 explicata medium prælongi calicis tubum, re-
 pandas per oras fimbriatum crenatumque, in tu-
 bæ modum exertant; ex qua Italicum quoque no-
 men hauserunt. Vt meritò fabulari quis possit,
 Famam volando, buccinandoque fessam genia-
 libus tantisper in hortis conquieuisse, dum refice-
 ret vires: vtque hospitalibus flosculis appositam
 referret gratiam, è suis conditum insignibus no-
 uum florem, nempe alatum tubulatumque narcis-
 sum

Pallidus fo-
 lijs reflexis.

Pseudonar-
 cissus Hispanus.
 Rarior. plant.
 Hist. l. 3. c. 17.
 Strep. Hist. flor.
 Pemp. 2. lib. 2.
 c. 23.

Pseudonarcissus pleno
flore quadruplex.

sum floreo populo addidisse, amanti hortos Famae buccinatorem. Harum verò florentium tubarum, muta specie suavius argutarum, quam quæ stridulo strepunt sono, aliæ aurea bractea, flavescent; aliæ argentea candicant; circa aureum aliæ tubum circumfuso foliorum veluti cupro expallescent; hunc aliæ cupreum pallorem media flaunte linea inaurant, ac totum prægrandem tubum verno illinunt auro; alias mirè degenerantis seminis inenarrabilis varietas colorat; alijs præterea diffusior, alijs est mensura contractior; aliæ denique simplici gracilique tenuem, aliæ replicato confertoque tubo plenissimam publicant voluptatem. Et his quidem postremis forma præfertim quadruplex. Aut enim tubus in tubum inferitur; aut simplici tubo densissima folia innascuntur; aut grandior flos densè fartus vbertate plerunque rumpitur, folijs in rosei narcissi speciem confusis; aut demum similis tum simplici, tum duplici foliorum ambitu flosculus tubulum exerit foliosa fartura pariter densatum. Pseudonarcissus vniuersis pro cuiusque florum amplitudine proceri caules; folia surrecta, proluxa, lata, in canaliculum concaua, minimè mucronata, & languidè virentia; bulbi oblongi, quorum extremæ tunicae dilutior ferrugine imbutæ raris, & fuscis eiusdem saturi coloris lineis in longitudinem intercurrentibus distinguuntur. Sunt, qui sentiant à maio-

iore roseo narcisso plenissimum pseudonarcissum, siue (vt alij nominant) narcissum alterum, maximum septentrionalem, qui calicem implet, & folia duplicat, nullo discrimine separari. Veruntamen vt folio, & caule inter se congruunt; sic bulbo, & flore dissentiunt. Huius enim bulbis, vt vulgaris etiam pseudonarcissi, longior colum quadantenus obliquat; stros tubulatum calicem folioso saepe facto, nimioque madore fatiscen-
 tem nonnihil exporrigit. Minusculi flore simplici pseudonarcissi vt strosulorum coloribus, sic bulbosulorum figuris variant, ceruicula in quibusdam proceriore: semper tamen aliquod maiorum instar in pusillis eminet. Qui verò parua geminant folia, & caliculi tubulum addensant, aut saltem hunc plenissimè folijs infarciunt; minutulis funduntur è bulbis, grandiores bulbos pleni stros feraces, si non magnitudine, certè figura exæquantibus. Folium protenditur palmare, prætenue, pallidum. Caulis itidem exilit brevis, & concolor. Pulchrè mentitur & nomine, & re narcissum pseudonarcissus montanus, in Lusitanis & Cantabricis iugis frequens. Hunc iuncea folio & cauliculo flexilem, flauo alboue flore in sena plerunque angusta folia expasso pinnatum à medijs caliculi cono in calathi seu nolæ figuram oblongo, repando, & sæpe fimbriato campanulam Hispani; flauum caliculum, & flauam violam Martiam Austriacæ matro-

Pseudonarcissus pleno flore maior.

Pseudonarcissus simplici flore minor.

Pseudonarcissus pleno flore minor.

Pseudonarcissus iunci folius.

c. clus. Hist. plant. l. 3. cap. 17.

*Idem Eur. p.
ster. p. 60.
Narcissus ma-
ximus, siue
incompara-
bilis.
Perpetuò fla-
uus.*

*Ex flauo in-
sulphureum
languens.*

*Sulphureus
summo cali-
ce luteo.*

*Candidus ma-
ior, & minor.*

næ vocant. Subiectum flosculo caput nigro, rotundoque semine impletur. Bulbulus rotundus, intus candidus, foris nigellus iuncea folij narcissi-
num bulbum prope indisereta facie repræsentat. Narcissum maximum amplo calice, à magnitudine incomparabilem multiplicis esse generis inuenio. Est enim, qui tam pertinaciter flauet, vt eodem, quo vixit, ore & colore moriatur. Hic senis folijs continuatum in orbem latè explicatis, medium crispulum calicem ab imis angustijs paulatim ac modicè sese laxantem in vnciale longitudinem exierit. Subtenuem caulem ad binos palmos extollit. Folia surrigit siluestris more narcissi laxa, prolixa, retusa, incana. Bulbum subdit siluestris itidem narcissi bulbo consimilem, sed magis compactilem, colloque nonnihil obtorto notabilem. Alter huius gemellus cætera, vno veluti vultu degenerat: flauum enim colorem, quem nascens præfert, in sulphureum; siue albidum senescens mutat, & folijs angustioribus, rugosis, atque vtrinque leuiter conuolutis florem orbem minimè continuat. Tertius verò tristioris indolis frater eo colore dehiscens nascitur, quo superior moritur: & velut appetentem mortem pertimescens paulatim exalbescit, luteo per oras calicis. Illud etiam differt, quòd calice folijsque latioribus, atque his etiam nonnihil continuatis prior floret. Candidus præterea Romanis in hortis visitur folijs

lijs floris aliquatenus diuersis duplex, maior nempe discretis, minorque coniunctis: vterque cæteris magnitudine superat: illius caulis ferè bipalmis, & gracilis; huius autem paulò breuior: maioris folia, quàm vulgaris, tenuiora & angustiora; minoris quàm maioris, magis lata minusque longa: vtriusque bulbosæ radices candore formaque similes pyrum superbum æquant, ceruice modicè porrecta. Est etiam proximè superioris bulbum adæquans, folijs æquè candidis flauoque calice narcissus maximus, itidem maiorior & minor: sed calix est minori coloratior. Postremus in Casertani Principis Andreæ Matthæi Aquauia principis flores merito cultu excipientis nobilissimis hortis alicur narcissus sanè incomparabilis, confertissimis nempe sulphureo colore folijs singularis. Narcissus ferotinus montanus, aut eius planè gemellus (Musartum vulgus appellat) bulbosæ radices exteriore tunica subalbida, magnitudine media, ventre vtrinque substricto, corpore oblongo, ceruicem modica illius narcissi bulbum ex parte refert, qui cameli collum simplici producit in flore. Appetente iam vere folia trudit proluxa, angusta, mollia, prasina, siue narcissinis similia. E teretis, pedalis, glabri, fungosique caulis apice ternos saepe, quaternosue mense Martio suspendit flores, sena niuei candoris folia, vulgaris narcissi folijs laxiora, & flaccida stellæ modo decussantes, patulo sulphurei coloris caliculo crocea fimbria ornato distingu-

Candidus calice flauo maior & minor.

Sulphureus flore multiplici.

Narcissus montanus ferotinus, flore simplici candido, calice luteo.

H

guen-

Narcissus
Narbonensis.

Narcissus An-
glicus.

*c. clus. Rarior.
plant. Hist. l. 2.
c. 12.*
Narcissus lō-
ga ceruice.

Simplex can-
didus.

Simplex pal-
lidus.

Multiplex
candidus.

guentes, digna etiam pulchro corpore anima odo-
ratos. Duplicem hinc habeo feri floris, extremo
nempe Martio, vel ineunte Aprili vernantis subte-
xere narcissum, alterum Narbonensem, Angli-
cum alterum. Priorem præcipuè discriminant bul-
bus oblongus, modicus, fusci palloris membrana
tunicatus; angusta folia, & erecta; flos albus, fla-
uo calice ferè vnciali, nonnihil repando reflexoque
distinctus, incomparabili narcisso contractior, in-
vnoquoque palmari caule sæpe multiplex. Postero-
rem non absimilem dignoscetis tum ex bulbo gran-
diore, in ventrem distento, in ceruicem extenuato,
membranaque ferruginea circumsepto; tum ex folio
breui latoque; tum ex ampliore flore luteum cali-
cem æquabiliter tubulatum porrigente. Longa cer-
uice narcissos camelini colli nomen ab imitamento
appositè deductum notat. Merum puerperæ Flo-
ræ lac in hosce flores candoris eximij concreuit.
Ex his plebeius alius, & senis tantum folijs pauper-
culus, atque inglorius candidatus à nobilium horto-
rum aditu distinetur. Vnum diluto aridæ palæ
colore pallidum, & veluti sordidatum hortorum
exilio liberant coloni, utpote Byzantio translatum
& rarum. Adeo raritas etiam deformitati præ-
tium facit. Alius foliosa prætexta per flauo cal-
licis fimbriatas oras purpurascens conspicuus, &
nobilis in patritios hortos admittitur. Caules
ferè bipalmes plerunque singulos flores, binos
inter-

interdum sustinent . Profiliunt ab radice folia
prælonga, tenuia, mucronata, subpallida . Bulbacea
radix pallidæ cutis, modicique ventris in collum
absimitur, quod in foliosi quàm in simplicis flo-
ris bulbo productius est . Virginienſis narcissi bul-
bus cupressini hyacinthi bulbo modica magnitu-
dine atque oblonga forma simillimus, colore di-
ſtat . Is enim subrubet, hic albicat . Folia pusilli
pleno flore siluestris narcissi folijs prorsus con-
gruerent, nisi aliquantò longiora validius vire-
rent . Ex viridi pallens caulis in palmum assur-
git . Flos in semihulcæ Persicæ tulipæ grandiore
figuram dehiscens obsoleto candore inficitur, di-
lutoque sensim rubore conspergitur . Narcissus
Indicus lato folio narcissino, flore rubro liliaceo,
album scilicet lilium imitante, quem Iacobeum
adhuc vulgus appellat, extremi Maij, aut ineuntis
Iunij caloribus citatus, antequam folia exeant, ita
properat . Floreus thyrsus emicat enodis ac læ-
uis, crassitudine propemodum digitali, ac duo-
rum quandoque palmorum proceritate visendus .
Apex membranacea conclusos vaginæ primùm
turget in calyces : tum ea dirupta quatuor sæpe sol-
uitur in flores striatis sex folijs deorsum reflexos,
è crassioribus pediculis in decussem dispositis pen-
dulos, purpura in crocum languente coloratos,
sex subalbidis staminibus longiulculis in luteas ap-
pendiculas desinentibus, medioque stamine ru-

Narciss. Vir-
ginienſis flo-
re purpura-
ſcente .

Narcissus In-
dicus è rubro
croceus flore
liliaceo .

Narcissus In-
dicus liliace⁹
sæuro colore
purpurascens

bente cæteris longiore, capillatos. Vbi flos mem-
branæ moram rupit, aut certè vbi defloruit, bi-
na siue etiam terna existunt folia, narcissi mari-
ni siue hemerocallidis folijs latiora & viridiora,
minuto sæpe minio guttata, summa parte subru-
bentia, non admodum longa, in hiemem vsque
diuturna. Bulbacea radix & figura, & magnitudi-
ne hyacinthinæ compar exuberante rubore asper-
gitur, & citra floreum partum parens miniatula,
præflore. Alius Indorum narcissus rarior, & no-
bilio in hortis primùm Casertanis factus est Ita-
licus. Magnitudine formaque candido lilio par,
floreis folijs magis continuatis minusque resupi-
nis dispar, florum numero superior, albo rubroq.
blandè temperatis circiter septembres calendas ex-
pingitur, vt ipsius lacte & sanguine pulchritudi-
nis coaluisse videatur. Albidæ membranæ rupto
inuolucro conuiuentis primùm folia floris modi-
cè rubent, coloratioribus tantùm lineis in longitu-
dinem virgata: in calathi deinde imaginem didu-
cta adulto pudore suffunduntur. Adeo vel in flo-
ribus pudibunda pulchritudo publicam lucem eru-
bescit. Toto denique senili vultu rubicundiorè,
dum deflorescunt, floridiora sunt. Imus vmbili-
cus intus forisque flauet. Sex inæqualia stamina
ima parte candicantia, summa subrubentia lunatos
in crocos ex viridi flauentes desinunt. Septimum
& medium stamen prolixius, itidemque coloratum,
apice

apice nullo insignitur. Vicieni pluresque flores è pediculis satis crassiss, binos seu ternos digitos longis, ex atro virentibus, & siue deuexis, siue arrectis modò in orbem penduli, modò in siluam promi- nuli, necnon particulatim dehiscences summum caulem coronant. Caulis ipse rotundus, digitum crassus, ac prope bipalmis ex viridi obsolescit in- rubidum. Folia liliacei viroris, & narcissinæ ma- gnitudinis, arefacto iam flore, à latere caulis enata, in ipsum caulem incumbunt. Bulbus Neapolita- no in tepore scillam prope exæquat, Romano sub cælo minùs tumet; instar eriophori summo sub cortice membranaceo lanosus extra pallet; nec flo- rem fert, nisi ad iustam punici mali molem ado- leuerit. Et hic narcissus more cæterorum sementat, parco tamen prouentu. Non absimili forma mi- nùs formosum misit India narcissum alium, qui contractiore bulbo, caule tenuiore pedali & inæ- qualiter rotundo, florum quoque minore & nume- ro & magnitudine, facie dilutiore, à proximè supe- riore degenerat. Vterque tamen tam decenter, tam modestè rubet; vt ipse pudor vel in flo- rem transierit, vel in flore seipsum expinxerit. Quare, si suo sibi colore flos hic nomen inscri- bat, rectiùs, quàm narcissus, flos pudoris ap- pelletur. Vtinam tam verecundè rubuisset, cum se Narcissus aspexit: candidiore profectò fabu-

*Narcissus In-
dicus liliace-
diluto colore
purpurascens*

la floruisse. Iam verò, quando roseus vultus infano amore in posthumum florem expalluit, recens rubor suam erubescens insaniam pudor est.











Indicus latissimis folijs, & florum forma hiliacea, Narcissus Indicus flore hiliaceo sphæricus. sphæralique ambitu narcissus; quem alij sphæricum ornithogalum, moly maximum Indicum, alij vocant; Gallici soli aduena nunquam floruit: sed Romanæ tandem amœnitatis & maiestatis hospes effuso flore pro risu felicitatem sibi suam in Tranquilli Romauli felicibus hortis gratulatus est. Tranquillus Romaulus. Bulbus longè scillino maior ventrem propè rotundat: ferrugineum, & quamvis tenue; durissimum tamen corium superinducit: imam partem, ut in botryode odorato hyacintho, protuberantem pro corporis amplitudine latè circumat: fibras minimi vice digiti præcrassas, prælongas, immortalesque diffundit. Floris vagina ad calendas Septembris existit in lanceam culpidata, ternos lata digitos, quinos longa, exuberante cinnabari saturata. Post decem dies subnascante scapo in palmum exerta, turgente iam atque vrgente numeroso fœtu, in geminas partes oris anguinei modo latissimè hiascit, non ut linguis trifulcis horribilis, sed ut floribus plurimis amabilis micet. Apparet primò conuiuentium florum confertissima congeries, quæ ramoso paulatim incremento rotundam ita rarefcit in siluam. Scapus exurgit prope bipalmis, binos digitos latus, ex rotundo pressior, ex viridi rubens, quæ parte solem aspicit coloratior, summa capitatus. Funduntur è capite densioris more capillitij frequen-

quentes, prolixæ, suauique rubore visendæ lacinix: quibus internati radiata rotunditate porriguntur: cauliculi triangulares, palmo longiores, minusculum digitum lati, interfuso rubore virentes, in capita extumidi tuliparum triquetro folliculo, seu præferratæ trifidæ clauæ simillima. Plerique instar candidi camelino collo narcissi ceruicem deflectunt: recto rigidoque nonnulli statu circumstant. E singulorum verticibus eminent sursum, versum spectantes elegantissimi flores, rubro conuolutoque montium lilio æquales, nec absimiles, quippe phœniceo rubore colorati, & folijs quinis natiuos in cirros reflexis calamistrati, exteriori folio cum staminibus assurgente: quæ sanè conspicienda stamina sic extant. Sena lato colore punicea in totidem versatiles apices primùm flauos, & grandiusculos; deinde contractiores, subter suffusculos, supra exalbidos, & veluti farina conspersos degenerant. Septimum sine apice pistilli facie productius, crassius, longa vtrinque rimula intertecante striatum, summa parte recuruum pariter purpurat. Vt vno inclyta purpureo capillo veteris Nisi coma recenti flore superetur, qui crocis pluribus blandè rubentibus citra discrimen amittendæ regalis gloriæ feliciter capillatur. Omnes inter se flores ternis quaternisue digitis interuacantibus distant. Per partes dehiscunt: nec prior ante deflorescit, quàm vernent vniuersi. Senium illos
non

non contrahit, sed infuscat, ac demum decutit. Menstrua ipsis vita, & ver autumnale. Septem-ber eisdem parit oriens, perimit occidens: hæc enim multorum florentium capitum hydra non calore, sed frigore interficitur. Quamquam Ler-næ viuacior sumptis à funere viribus quotannis renascitur: neque clauas Herculeæ similes timet, quibus, tanquam cauliculis, insidet ac fulcitur. A florum interitu triangula capita grandescunt, pleraque inania, perpauca nonnullo abortiui se-minis rudimento fœta: siue quòd peregrina planta nostratis autumnii frigus reformidat: siue quòd eadem apud nos nondum robustæ fœcunditatis est. Caulis tandem, & inhærentes cauliculi pe-nitùs directi, atque in orbem diradiati sic exare-sunt; vt floris pulcherrimi cadauer sidus sit: ne-que enim hoc insolens est, vt hydra mutetur in sidus. Nec isti hortorum sideri mors parcit. Præmortui floris decorum cadauer ingruentia, primùm frigora iterata morte corrumpunt. Ne-que clauæ multiplicis armatura formosum tue-ri germen aduersus æui demolientis iniuriam po-test. Folia circiter Octobris exitum apparent, flo-re non proueniente: in eiusdem prouentu seriùs, extremo scilicet Nouembri mense existunt. Pau-ciora initio, sex tandem flori prolusere. Longi-tudo illis bipalmis, latitudo palmaris, dimidiati ferme digiti seu cultri crassitudo, retusa forma,
læta

lata viriditas & fusco per oras rubore circumlita,
 corpus humi erraticum lateque procumbens, vi-
 ra usque ad extremum Maium siue ad primos ca-
 lores producta.

Gemi-









EIVSDEM

BVLBVS

NARCISSI

ET FOLIA






Gemino latiore folio , & flore puniceo peregrinus Indix narcissus , à Batauo cultore Suertius , siue Colchicum maximum Indicum , paucis ab hinc annis Romanos hortos nobilitauit . Bulbosa , radix , pineæ nuci par , oblonga , squamosa , imi fibrati verticis orbe angusto coronata , fibris instar botryodis hyacinthi , quem Muscari vocitant , crassiss lateque prorepentibus subnixa , deorsum porrecto tubere callosa , Septembri mense caulem protrudit crassitudine digitali , in rotundo vtrinque planum , albidum , sanguineis anguineisque maculis guttatum , summa parte rubentem . Inde patescens vagina depromit florem balaustio similem , qui sex minimùm folijs puniceis modiceque crassis complectitur intimos flosculos confertissimos , nonnihil hiantes , rubicundulos , breuib subalbidisque pediculis innixos . E singulis flosculis terna subrubicunda , & luteolis pallidius apicibus capitulata stamina confertim eminent . Flosculis postea dilapsis subiecta capitula turgent in folliculos ardenti colore rubros , trifidos aut quadrifidos , oleam æquantes , racemi seu corymbi aspectu conglobatos ; quibus terna continentur aut quaterna nigella grana , minusculi phaseoli figura & magnitudine . Bina post excussum florem folia existunt , flaccescenti atque in semen exeunti scapo adnata & superinducta , ouata , in duos circiter palmos longa , in palmi dimidium lata ,

Narcissus Indicus gemino latiore folio , flore puniceo

scillæ folijs crassitudine æqualia, nigrantia, primò
 surrecta, humi demum iacentia. Hic autem flos
 siue regionis vitio; siue artis inertia ægrè raren-
 terque nostrate vernat in solo. Primum tamen
 formosus hic Urbis hospes ac tiro in Quirinalibus
 hortis purpurati Principis FRANCISCI BAR-
 BERINI suam explicuit purpuram tributariam;
 ut pulcherrimi loci amœnitas Domino concolor
 effulgeret. Neque enim in APVM Regia nobi-
 lissimorum florum sterilefcere decet annonam.







UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





*Croci, Colchici, Coronæ imperialis, ac Tuliparum
notæ.*

C A P V T I I.

C Rocus, & ipse florea impotenter aman- Crocum :
tium fabula, flore vario & multicolore,
tum simplici, tum folioso vernat, & au-
tumnat. Breui pediculo ante folium assurgit : tum
florem expellente folio aut latiore gramineo, aut
candidè striato, aut in capillamenti modum te-
nuiore ac iunceo viret. Bulbulo multiplicis ma-
gnitudinis rotundo, carnosio, & viuaci, intus albo,
extra spadice siue subnigro progignitur, fibrisque
candicantibus innititur. Præter vulgare Colchi- Colchicum.
cum in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, atque Panno-
niæ humentibus optimisque prætis obuium plura,
& florum foliorum bulborumque mirabili varia-
te præstantiora genera indagauit recentium colo-
norum amœna solertia. Hæc tamen ferè conue-
niunt vniuersis : bulbus turbinatus, parte altera
planior, media rima siue sulco, vnde flos exilit,
dehiscens; vbi flos defloruit, conuiuens, rubenti-
bus ex nigro tunicis obuolutus, intus candidus,
carnosus, lacteo succo manans, dum recens eru-
tus adhuc viget; sed vbi exaruit, rugosus, intus fo-
risque nigricans, aut certè rubidus : flores circi-
ter æquinoctium autumnus ante folia præproperi,
croci

Corona im-
perialis.

croci flosculis non absimiles, & longiusculi, breuibus tenerisque pediculis insidentes: à floribus turgentes folliculi triangulares, crassi, oblongi, semine fœti rotundo, vergentis è rufo ad subnigrum coloris: folia prolixa, laxa, erecta, læuia, pingua, & planè liliacea. Vnum cæteris præfertur Colchicis, quod rubello plenoque flore foliosum, & alternis quâ saturi, quâ diluti coloris quadratis maculis variegatum primoribus autumnii pluuijs emergit. Flos est ab oriente oriundus, quem vernacula, quàm latina vox augustiùs nominat: is enim latinè *Lilium Regium*, vulgò autem *Corona imperialis* appellatur. Cæparum instar vegrandis eius bulbus, binas & amplius libras interdum pendens, rudi & inæquali rotunditate conglobatur: candidas, promissas, molles, & parua offensione fragiles fibras non ab ima tantùm, sed varia etiam ex parte dispergit: medio patuloque, quâ scapus exit, foramine hiat: sine tunicis inuestis, succola densaque carne modò candicat, modò purpurat, plerunque pallet: allium, aut hircum, aut quid insuauius olet. Atque hoc maximè distat à simillima Susiani, siue Persici lilij bulbosa radice, quæ graueolentia nulla nares ferit, quæque forma est præterea longiore. Thyrsus robustus, crassus, intus fungosus, viridis, rotundus, procerus ad mediam ferè altitudinem modò confusus, modò ordinatis liliaceis folijs conuestitur: inde teres, nudus, & purpu-

R. Dodon. Stir.
Hist. Pempt. 2.
l. 3. c. 5.
C. Clus. Rarior.
plant. Hist. l. 3.
c. 1.

purpurascens foliosam summa parte siluescit in cristam. Inter cristati capitis folia plerunque bina tenuibus è pediculis vario numero, multiplicique interdum serie, raro scilicet naturæ luxuriantis lusu, lutei aut ex croceo rubentes liliorum similes flores, at minores in calathos ab imis angustijs ducti, nec labella resupinantes, minusque dehiscentes, quàm decori, tam fœtidi pensili coronamento nutant. Est etiam cum voluptate cernere in intimis foliorum singulorum floreis vnguibus margaritarum gemella candida tubercula, quæ cum sereno, tum maximè pluuiæ cælo liquidam & prædulcem aquam guttatim delacrymant salubri documento, scatere lacrymis etiam coronas. Ea postmodum eminula vnionum rudimenta, marcentibus floribus, introrsum abeunt in æquè candidas lacunas. Ad hæc sex albida stamina luteis crocis capitulata cum trifido medijs styli pistillo prominent. Excusso flore grandia capita sustollunt angulosi folliculi, seminibus graues subruvis, planis, cartilagineis, duplici serie in vnoquoque angulo digestis. Lepidissimum florem, Turcico vocabulo Dalmaticis pileis ob similitudinem communi Tulipam, recentiorum verò biformi nomine Lilionarcissum, quòd liliacea in primis & narcissina vnus decora complectatur, appellamus. Sunt, qui velint coronarium esse veterum Cosmosandalon, aut certè Satyrion. Nulla æquè in planta versicolor

natu-

Tulipa.
R. Dodon.
Stirp. Hist.
Pempt. 2. lib. 2.
c. 27.

C. Clus. Rarior.
Plant. Hist.
lib. 2. c. 9.

idem ibid. c. 7. naturæ licentia lasciuit: vt superioribus annis fuerit, qui supra ducenta coloribus discreta genera numerarit. Iam verò cum semper aliquid noui afferat fecundior Flora, quàm Africa; multò licebit plura

idem ibid. c. 9. per censere. Ne tamen quis istorum coloribus florum nimium credat; præmonente Clusio, alternis annis versicolor inconstantia liberaliter credulos eludit. Princeps & publica ea generum partitio est, quæ de triplici tempestiuitate ducitur: vt aliæ præcoces, mediæ aliæ, aliæ serotinæ tulipæ dicantur. Habent autem ferè vniuersæ hunc exortum, hoc incrementum, hunc exitum. Inter bina diluto virore pallida folia flos, infantium primæ conspectum lucis non sustinentium, more conniuens, nec dum colorata formositate viridis, & prorsus herbeus incipit existere. Tum paulatim impellitur succrescente scapo, qui medulla duriore robustus, rotundus, & virens ad pedalem atque etiam cubitalem altitudinem modò arduo statu rectus, modò in anguineam spiram tortilis exurgit. Quanquam præcox tulipa breuissimo caule à terra vix eminet. Hunc sparsim amplectuntur folia plerunque terna, nonnunquam etiam quaterna & quina, crassa, oblonga, carinata, interdum per oras modicè reflexa & crispula, modò pendula, modò surrecta. Summus interim flos colorem mutat, seseque in sena, aliquando etiam in septena & octona folia, rarò foliosior

rem

rem in congeriem explicat, siue calathi, siue cynthi, siue relupini pilei effigie. Ex meditullio sex, vel etiam totidem, quot ipse folijs constat, mirum in modum coloribus varia stamina profert, apicibus aut luteis, aut pallidis, aut nigricantibus insignita. Idem hic flos nubilo cælo tristatur, vulnereque contrahit; pluuio faciliè defluit, & corrumpitur; temperato sole hilaratur, atque in risum decenter hiat; ardenti perustus, formæ vitæque decoquit. Dilapso flore subit membranaceum ac triangulare caput satis magnum, atque oblongum; quo tres in partes dehiscente, sex ordines visuntur feminis confertim aggesti, plani, cartilaginosi, rufi seu rubidi, prorsusque liliacei. Iam verò, quoniam è medio bulbo cum folijs flos primum exit, aridusque deinde floris caulis (quod etiam in iride bulbosa, Colchico, alijsque hoc genus videre est) imò extimoque eruti bulbi circulo hæere conspicitur; quamobrem id fiat, enodare conuenit. In intimo bulbo, vnde caulis & flos eminet, nouus quoque bulbus, veluti gemellus fraterculus, eiusdem scapo floris adnascitur; pariterque cum illo non modò per materni bulbi fibras terræ alimentum, sed ipsum quoque succum matris exugit: vbi verò, desito iam flore, lateri cohærens caulis inaruit, reliquo ille succo innutritus adolescit; veterere interim euiscerato bulbo membranaceas in exuias, nempe in recentis inuolucra deficientes.

Tulipæ annua
corruptio &
separatio.
C. Cl. Rarior.
plat. Hist. 4.2.
6.9.

Fabritius
Sbardonus.

Mirandum iam non est, vel eruto bulbo extrinsecus hærentem aridum scapum inueniri, cum idem utrunque partus coniunxerit; vel altera nouum bulbum parte planiorem esse, cum flos adnatus absoluta offecerit rotunditati. Si tui lubeat, quod hic affirmo, fide oculata credere; periculum faciat, quod ipse feci non semel cum Fabritio Sbardono Caroli Cardinalis Pij horrore peritissimo præfecto, florumque peregrinorum sagacissimo indagatore: tulipæ, inquam, bulbum, cum iam cepit egerminare, intercidat; inuenietque inter conuoluta foliola pusillum flosculi rudimentum, adnatumque surgenti cauliculo noui bulbuli nucleum. Ita vetula parens cum floreo partu iuuentutem reparat, ac semet intra se parturit. Illud cultoribus ignorandum non est, tulipam, quæ folium eijcit singulare, florem eo anno non allaturam: sed in duplici folio proximi spem floris euirescere. Bulbosæ radices haud multum narcissinis bulbis dispares, forma modò ferè rotunda ventriosæ, modò turbinata gracilescentes; imo, vnde exeunt præterites, frequētes, breuesque fibræ, prominulo angustoque circulo coronatæ, prædulces atque edules, interiorè carne, velut excocti duratique albumen oui, solidæ candicant: exterioribus tunicis aut flauent, aut subrubent, aut nigricant. Publicum præterea est omnium, parte altera magis tumere, altera paulò compressiores esse; & canaliculo,

liculo, cui scapus ab ima corona profiliens adhæret, intermeante sulcari. Nonnullis tuliparum, seu nondum satis adultis, seu vegetissimis bulbis, & superfluente per imbres humore luxuriantibus antiquissimum est candidam, præcrassam, prolixam, sanguineo more serpentelem aut rectâ deorsum, aut in latus venam, seu nervum spargere, qui parte summa in bulbulum desinit, ceu sætus nuper editi solutior umbilicus. Fit etiam non raro, cum præsertim id bulborum diutius humatum esse permittitur, ut continuatus per adnatum bulbulum nervus unam alteramue præterea sobolem, tempestiva maturitate vernaturam, veluti catenata serie, subiungat. Id autem fieri crediderim, propterea quod naturalis tuliparum fecunditas, dum sobolem meditat, humorem nata vberiore, quam qui citò digeri possit in bulbos, in longam effunditur appendicem; quæ, quamvis radicibus consimilis, videtur tamen prominentis umbilici officio defungi; dum bulbulum, in quem deficit ac degenerat, alendo conferitur: ob eandem causam ea connexorum series bulborum continuatur. Ad hæc in altiore latebram se penetrare consueverunt complures id genus bulbi, siue nativo pondere, siue frigoris humorisque amore deorsum urgente. Usque adeo vel per solidi elementi obicem ad ima prono amanti facilis descensus. Est etiam tulipa, quæ, suam ut feracitatem,

Tulipæ præpagatio.
C. Clus. Rarior.
Plant. Hist. l. 1.
c. 9. & 10.

velut iactantior extollat, bulbulos in ipsa caulis foliorumque iunctura, hoc est inter alas parit. ac gestat. Pleræque tuliparum bulbaceæ radices, utpote indiscreta specie ambiguoque vultu simillimæ, florum discrimina certò non indicant. Duæ tamen sunt, quæ notabilem in modum dissimiles cæterarum certis apertisque indicijs floris genus præsignificant. Bulbus maiusculus, cui vulgaris coloris crassior ac durior membrana, tenui subalbidoque tomento intus lanuginosa bombycina tulipæ nomen fecit, florem dabit vel procero caule sublimem intus extraque rubrum, acuminatis & in summo subviridibus folijs distinctum; vel breui scapo humilem, forinsecus ex viridi pallidum, intrinsecus tristi purpura dilutioribus lineis virgata nigrantem, vno pavonini oculi nomine à rudi specie in umbilico adumbrata speciosum. Persica bicolor tulipa ut bulbo, sic flore longè recedit à cæteris. Bulbus igitur est auellanæ instar nucis perparvulus, prope rotundus; corio duriusculo, foris nigro, intus villoso; summo villo extante; carne candida. Flos senis coagmentatur angustis folijs, exterioribus ternis mucronatis, inter candidas oras dorso roseo distinctis, ternis verò interioribus planè niueis, capitulo luteo, cinereis crocis: caule fulcitur gracili erectoque: folijs ambitur striatis, iunceis, ac flexuosis. Ad extremum præcoces tulipas minore bulbo, serotinas grandiore ple-

Tulipa bombycina.

Persica bicolor.

Præcoci, ac Serotinae indicia.

re plerunque dignosci, Clusij vox; recentis verò *ibid.* 1.
coloni obseruatio est, illas corona bulbi laxiore,
has angustiore monstrari.

Fritillaria, Iridum, Liliorum, Orchis,
atque Ornithogali nota.

CAPVT III.

Fritillaria nomen à fritillo, ab aluco lusorio *Fritillaria.*
maculosas areolas mutuata multicolorem
ludum in hortis ludit. Hanc etiam pictis *R. Dod. Stirp.*
Hist. Pempt. 2.
L. 2. c. 28.
C. Clus. Rarior.
plant. Hist. l. 2.
c. 11.
Crispino. Pas-
sens in Hort.
florid. verno.
Africae gallinis consimilem suauiore gulæ vocabu-
lo Meleagridem recentiores coloni appellant. Ean-
dem ab inuentore dixere narcissum Caperonium,
à discolori forma lilium variegatum. Vnico è cau-
le pedali aut etiam longiore, tenui, quinis aut plu-
ribus folijs, angustis, carinatis, impensè virentibus,
atque inordinatis conuestito flores singuli, inter-
dum bini, rarò plures, more tintinnabuli pensiles
nutant. Quadratis aut oblongis maculis alternan-
tibus plerique bicolores, velut opere tessellato, ele-
gantissimè variant. Nonnulli etiam unicolores si-
ne varietate delectant. Interior foliorum pars flo-
ridiore tinctura saturatur. Vngues, vt in rosis, can-
dicant: inde ad medium vsque folium herbidi co-
loris linea producitur. Stylus è floris erumpens um-
bilico inter sex luteos crocos quodam quasi pului-
sculo conspersos multifidus eminet. Folliculus dein-

de turgescit sæpe vacialis, ac triangularis, superne crassior, haud coronatus, semine foetus rufo, exiguo, plano & membranaceo. Radix bulbosa, subiacet plerunque pusilla, orbiculata, depressa, nudula, exalbida; vbi aliquandiu inobruta fuerit, leuiter lutea, in binas vt plurimum æquales partes veluti dissecta, &, quæ caulis existit, extuberante toro puluinata. Iris hortensis tam varia & versicolor est, vt cælestem Iridem æmulata colorum vera specie coloratum cæli mendacium superet, idemque sibi decorum iure nomen adsciscat. Bulbosæ radix ferè oblonga, & adnascentium nucleorum liberaliter fertilis subrufis aut subnigris induijs obducitur. Inde geniculatus caulis in cubitalem sæpe profilit altitudinem; folijsque prolixis, angustis, striatis, superiore parte cauis, inferiore prope rotundis geniculatim circumdatur. Flos vnicus, interdum etiam geminus in cacumine dehiscit, figura picturaque nonnihil variantibus. Commune hoc omnibus, vt maiora per ambitum folia deuexis labellis resupinentur, maiora surrigantur. Post florem surgit longulum ac triangulum loculamentum, quo tres in rimas fatiscente semen apparet angulosum, aut rugosum; rufum, aut fuluum. Iris alia partibus cæteris non dissimilis, flore folioso & maiore præstantior, media floris paulò minutiora folia conduplicat, bulbumque magis rotundat. Bulbosam & latifoliam iridem è Lusitanis Bati-

cisque

Iris.

Iris bulbosa.

Iris flore duplici foliosa.

Iris prima-
Clusij latifolia.

cisque collibus cultissimos ad hortos transuectam, ab eo, qui priorem describit ac celebrat, Primam Clusij nominant. Bulbus cæterarum de more iridum modicus, candidus, phœnicea, tenui, læuque membrana velatus radices demittit vice glandium crassas, minusculum digitum longas, inde in prætenuem longitudinem procurrentes; quibus à florum defluuio senectute rugatis & flaccidis nouellæ subeunt, iuuenilem parenti vim & fecunditatem, suffecturæ: vnde fit, vt altrici terræ fibris bulbus perennibus adhærescat. Folia prodeunt vtrinque densa, sese inuicem amplectentia, modicè carinata, longa, ternos digitos lata, acuminata, mollia, in terram prona, contortuplicata, supernè ex viridi pallentia & læuia, subtus incana. Medij flores membranaceis inuolucris euoluti, breuibus tenerisque pediculis instar croci vix eminentes, ex cæruleo colore in violaceum inclinantes, interdum etiam lactei, vulgarem bulbosæ iridis in faciem senis ita folijs conformati, vt imæ præterea foliaceæ tres intersertæ exertæque lingulæ supinentur, ad quindenos vsque particularim vernant, alijs cadentibus, alijs maturescantibus, alijs verò subnascentibus. Hiberno frigore, ceu verno tepore, citati gelidissimis mensibus, Decembri scilicet, Ianuario, & Febuario ver brumale diuturnumque repræsentant. Vbi defloruerunt, ima pediculorum pars inter folia delitescens oblongam ac triangulam

C. Clus. Rarior.
plant. Hist. l. 3.
c. 44.

Iris Persica
variegata,
præcox.

Iris tuberosa

lam turget in thecam feminis, vt in tulipis, compressi, sed exalbidi; extremo Maio maturiscentis. Persicæ iridis bulbosa radix proximè superiori persimilis minorem nacta est modum. Folia pauciora, diluto virore veluti rorulenta, atque in canalis effigiem concaua sex digitorum longitudine, duum latitudine definiuntur. Exiguè post foliorum exortum sub extremum Februarium flores existunt supradictis conformatione pares, numero autem & colore dispares. Hi enim quaterni tantum quiniue pro cuiusque bulbi viribus funduntur; totique sic albicant, vt folia terna surrecta dilutiore cæruleo fūco interfuso pulchrè liuescant: totidem verò hisce subiecta tum prominula crocea lineâ intercurfante distincta, tum violaceis guttis circumlita, grandiore ianthini coloris velut holoserica macula deuexum labrum infuscant, splendidè nigrescant. Denique eiusdem formæ folliculus Iunio mense maturescit in semen. Quæ tuberosa & geniculata radice sunt irides, floris figura vix differunt à bulbosis. Quare minutiora, minusque in rem meam necessaria discrimina petat, qui velit, ex ijs, qui vnicam florum historiam elaborarunt. Iridi lilium nominis adiungit affinitas, & contigua veris extremi tempestiuitas. Nostrates horti emaculata & lactea venustate natiuum reiiciunt, aut certè externo & siluatico posthabent naturali nausea, qua domesticas delicias fastidimus,

pere-

peregrinis inhiamus. Candido autem notissimo-
que lilio cum in alijs partibus, tum præcipuè in bul-
bo squamatum compacto subsimiles liliaceæ stirpes
omnes exteræ, ac nostris è silvis montibusque peti-
tæ, vario discrimine separantur, quas vno Martago-
num recenti nomine complectimur. Silvestris lili,
siue martagonis purpurei complura genera nume-
rantur. Aliud enim maius procero caule, folijs angu-
stis, atque è nigro vitentibus circumfuso numerosos,
atque adeo sexagenos pluresue colore rubro ad cro-
ceum inclinante dilutos, nempe puniceos flores
effert. Aliud humilius, minusque floribus fœ-
cundum, necnon folijs dilutioribus siluescens,
atque ex ipso bulbo propagines in latera graminis
more dispergens partibus cæteris consentit. Illud
autem cum hi, tum reliqui martagonum bulbi fa-
miliare habent, vè supra infraque porrectis fibris
liberaliter barbati sint. Aliud inuenitur his non
absimile triplicis generis silvestre lilium etiam in-
ter folia floresque bulbosum. Est enim, quod non-
dum ferendis floribus per ætatis immaturitatem,
par secundum caulem inter folia nascentibus bul-
bulis luxuriat; ac deinde in summi tantum caulis ra-
mulosa diuisura, & iuxta flores bulbos grandiuscu-
los effundat; cum ad bina vsque cubita satis adul-
tum & senescens sanguineis floribus purpurat. Est
etiam, cuius iam adulti scapus humilior & ferè cu-
bitalis raros, cosque superioribus minores bulbos
sum-

Martagon, si-
ue lilium sil-
vestre.

R. Dodon. Stir.
Hist. Pempt. 2.
l. 2. c. 2.

C. Clus. Rarior.
plant. Hist. l. 2.
c. 6.

Puniceum,
maius.

Puniceum,
minus.

Purpurei tri-
plex, inter so-
lia floresque
bulbosum.

summis tantum in alis ferre sit solitus. Postremo est, quod inter superiora duo magnitudine medium numerosa bulborum tum folijs tum floribus adnascentium sobole semper oneretur, quodque è bulbi prædicto minoris lateribus propagines plerunque fundens, extuberantibus ad singula genicula candidis bulbulis latè sese disseminet. Pensiles porro bulbi seu vento seu contactu decussi, terraque reconditi maternam radicem pari fecunditate imitantur. Quin etiam, dum scapo adhuc inhærent, fibras deorsum agere interdum solent, ijs velut brachiolis communis gremium nutricis implorantes. Ferunt præterea lilia hæc vniuersa triquetris folliculis latum, cartilagineum, & leuiter fuscum semen. Cæterum in horum aliquo liliorum poeticum hyacinthum, atris doloris vulnusculis compunctum, flebiliter efflorescere indicat fabulæ concolor ferrugineus floris rubor, nigellis atque adeo lugubribus lituris punctim literatus. Sed iste poetarum cantu, quàm colonorum cultu nobilior flos est. Geminum visitur lepidioris formæ lilium, quod Matthioli martagon, aut hemerocallis altera dicitur, è siluis montibusque in vrbes hortosque translatum. Alterius sæpe bicubitalis, rotundus, & purpurascens caulis oblongis, latis, acuminatisque folijs in stellam sese pandentibus certa per intervalla radiatur: è pediculis prono suspendio vacillant flores purpura frequenter obsoleta, quando-

Ferrugineum
atris notis in-
scriptum, si-
ue Hyacinth^{us}
poeticus.
R. Dodon. *ibid.*

Id. ibid. c. 3.

Montanum
primum.

doque elegantiore suffusi, & purpureis aut nigricantibus interdum maculis notati, nonnunquam etiam incontaminato candore spectabiles; folijs annulatos in cirros, velut calamistro, vibratis & reflexis; staminibus summa parte capitulatis, & citra mediam styli clauam extantibus. Squameus, atq. in acumen gracilescens bulbus, quod ochræ luteo colore inficitur, apud Germanos aureæ radices pretiosum nomen inuenit. Multò alterum elegantius caulem attollit cubitalem aut proceriorem, non admodum tamen crassum, inferiùs ex purpura nigricantem: læuibus, pinguibus, surrectis, sensimque breuioribus folijs comosum. Ad hæc floribus grandiusculis, cinnabaris minijque temperie prodigè coloratis nitidè rubet: neque à lilio Byzantijs rubro distare videtur, quod à crispula & cincinnata foliorum forma Italico blanditu Dominae cincinnus vocitatur. Bulbosa radix superiore amplior minutioribus & subcandidis nucleis veluti squamatim coalescit. Habet Pomponij Martagon, quod à prædicto lilio nonnihil discrepet. Nam iustæ magnitudinis bulbus quasi squamulis compactus minutissimis, ac depressior sulphureo colore flauet. Scapus in quatuor circiter palmos adulescit; ac productioribus, tenuissimis, contortis, asperis, inferiore parte abundè virentibus, & paulatim decrefcentibus folijs fastigiatus densius capillatur. Flos priori congener tetro coronæ imperialis

*C. Clus. Rarior.
Plant. Histor.
l. 2. c. 4.*

*Montanum
alterum.*

*Martagon
Pomponij.*

Orchis.

(vt vocant) odore degenerat. Congruunt colore formaque nostratibus exteræ martagonum radices: quanquam in frigidiorē plaga, solo cæloque magis propitio, felicius florere dicuntur. Orchis radice constat bulbosa, in oleæ modum oblonga, gemina; altera plena & vegeta, altera rugosa & flaccida; vtraque alternis annis intumescēte ac decrescēte, supernè in imo caule fibrata. Inter pauca mirabilis est herbæ huius varias animantium imagines numerofo partu progignētis nunquam effecta fecunditas. Verum nobilissima in primis, florumque lectissimorum digna consortio censetur duplex eiusdem generis radix anthropophora, quarum altera hominum mares, altera fœmellas capitulis velut è galea, siue trifido inuolucro purpurascēte pensilibus, extētis brachiolis, diuarticatis crusculis, corpusculis carnis colore subrubentibus extremo vere, aut incunte autumno parit. Et quisquam dubitet humano generi decoram esse florum culturam, cum suorum illi cultorum ineffigiem humanissimè transformati grata vice beneficium recolere videantur? Masculorum parens folia fundit ex pallido virentia, alia scapo circunvoluta, latè alia diffusa, & per ambitum vndosa, vnciam lata, palmum longa: ipsū verò pedalem scapum tenerum, & viridi læuore nitidum, densissimis flosculis ab ima parte dehiscētibz inspicat. Flores, antequam dehiscant, purpurant: vbi

Orchis floribus viros exprimens.

Fab. Columna

Ninus cognit.

Stirp. & Re-

vior. par. 2. c. 4

vbi deinde humanam in faciem explicati lineamentis homunculi patuerunt, mentiente carnem, fuco suauius rubent. Priorem hanc in herbosis Casperiae collibus radicem reperit Fabius Columna, vir tum in peruadendis eruditis naturæ latebris industrius, tum Lynceus in peruidendis. Constat germinare asserit autumnò: mense etiam Aprili floruisse: autumnì initio simplicem esse, & abique fibris vegetam: aliam deinde ab ipsa gigni vegetissimam, & succi iuuenilis plenam, matre interrim senescente atque in rugas abeunte. Subsimilis est radix fœmellarum puerpera, bulborum altero iustæ oliuæ magnitudinem æquante, albicante, ac duro; altero autem minuscule, pullo, & rugato. Caulem hæc sesquipedalem, rotundum, læuem folijs duobus complectitur: ima quinque ferè semipedalia, vnciam circiter lata, & recurua, ex longa ceruice ab humo sustollit. Maio mense, floret siluosis in montibus Aequicolorum, è trifido integumento virecente, ac per oras purpurante suspensis muliebris formæ minutulis ludibrijs, congerie in acutum fastigium decrecente spicatis. Vtriusque radicis flores aureis velut arenulis puluerulenti splendide sordescunt. Notabilis in ornithogalis est bulbi candor, imique verticis, vnde capillamenta funduntur, latitudo. Sed præ cæteris, quorum pleraque nostrate in solo passim occurrunt, elegancia & raritate peregrinum spicatum placet.

Orchis floribus mulieris exprimens.

Id. par. 1. c. 146

Ornithogalum.

Peregrinum spicatum.

placet. Bulbacea ipsius radix rotunditate ac magnitudine Arabici ornithogali, quod vulgò Alexandrinum liliū vocant, radicem æquat, candore etiam superat; latitudine autem basis, ex qua prodeunt fibræ, superatur. Quina aut sena folia breuia & lata instar eriophori, siue hyacinthi Peruanī humi sternit secus, quàm aliud solet ornithogalum spicatum, quod folia surrigit. Caulem trudit gracilem, at robustum, qui post mensem Maium in floream palmarem spicam fastigiatur, Flores lactei coronario frutici, siue candidæ syringæ non absimiles, medio subuiridi capitulo turgentes, quod cum sementar, exalbicat, particulatim vernant. Neque tamen, dum summi dehiscunt, imi contrahuntur atque flaccescunt, quemadmodum in floreis plerisque spicis vsu venit: sed, ubi avarum sui spectaculum per partes & paulatim indulserunt, vniuersa demum argentea pompa simul explicata oculos ditant.

Hyacinthorum notæ.

CAPVT IV.

FLoribus hisce bulbaceis, plerisque grandioribus pulchrè attexitur hyacinthus, corpore, non gloria minor. Quoniam verò geminos, genere longè discretos vnum hyacinthos nomen

Hyacinthi no
men anceps

nomen amplectitur; alterum, quem rubrum siue
 ferrugineum lilium (vt modò præmonuimus) herba-
 rij, comosandalon Hermionenſes apud Pauſaniam, *lib. 2.*
 inſcriptum hyacinthum Theocritus appellat, quia *Idyll. 10.*
 floream ferruginem nigris & veluti funeſtis no-
 tis punctim inſcribit, funebri memoria vernans
 ſiue Hyacinthi ſiue Aiaceris in hunc florem fabu- *Plin. l. 21. c. 11*
 loſo miraculo mutati: alterum, qui non inſcri-
 ptus vocari poteſt, quique Vaccinium à priſcis *Vaccinium.*
 Quiritibus, à recentioribus Gallis tanquam priſti-
 ni vocabuli veſtigio Vacietum appellatur: hunc *Iean. Roell. De*
 nos in præſentia poſtremum non inſcriptum de- *nat. Stirp. l. 2.*
 ſcribimus. Hic in omnes prope colores tum na- *c. 104.*
 turæ tum artis felici conſpiratione facilis Vertum- *Hyacinthus*
 nus, modò candidus monſtrat nigra vaccinia exi- *no inſcriptus*
 miè poſſe exalbefeſcere, vt alba liguſtra alieno can- *multicolor.*
 dore victa penitùs cadant: modò cinereus flo-
 reum Phœnicem ſe probat, qui cineres animat:
 modò ex albo rubens humani vultus formoſam
 temperiem pulchrè transformat in florem: modò
 cælo concolor Archimodem ludit, dum cælum
 anguſtiùs contrahit: modò colores alios mille non
 fictos & breues, ſed veros & conſtantes vario è ſa-
 tu trahit, vt admirationis filiam, fugitiuam Iri-
 dem prouocet & ſuperet: modò polyanthes nu-
 merolo ſe ſoſculo conueſtit, vt vnus flos hortus
 ſit. Folia illi oblonga, porri folijs plerunque an-
 guſtiora & breuiora, carinata, læuia, & ſplenden-

tia:

tia: caulis teres, enodis, glaber, fungosus, digito sæpe minimo gracilior, interdum quoque digitalem ad crassitudinem proficiens, aliàs florea turri superbus, aliàs onere felici languidus: flores à tubularis angustijs in calathi formam repandi, lilij diuifura per oras reflexi, à medio plerunque, nonnunquam etiam ab imo caule ad summum, nunc in latus, nunc per ambitum, modò densata, modò rara serie digesti: semen in triangularibus valvulis exiguum, rotundum, nigrum: bulbosa radix intus candida, &, quemadmodum etiam tota herba, lento succo glutinosa. Orientales vulgò hyacinthos appellant, qui pinguiora latioraque explicant folia, qui crassiores vegetioresque exerunt caules, qui maiores patientioresque suspendunt flores, qui denique à fertili lucis oriente nitidam formositatem ducere videntur. Horum præterea geminum fastigium est, maioris alterum hyacinthi copiosius, alterum minoris parcius efflorescentis. Cæterùm pro discolori florum varietate cernuntur plerique bulbi & coloris & figuræ discerniculo insignes, qui florea discrimina præmonstrent. Neque verò diffiteor nonnullos tam obscurè bulbos inter se differre, ut perspicacem etiam iudicem sæpè fallant. Præcocem hyacinthum candidum bulbos arguit nonnihil compressus, & rubicundis tunicis prævelatus: bene odoratum, ac leuiter cæruleum præ-

ma-

Hyacinthus
orientalis.

R. Dodon. Stir.
Hist. Pempt. 2.
l. 2. c. 17.

Albus bru-
malis.

Cæruleus o-
doratus præ-
cox.

maturè vernantem pusillus, globosus, superiori
concolor, adnataque posteritate sese facile disse-
minans : cyani siue Lazuli cæleste decus amu- Cyaneus præ-
cox.
lantem in pyri formam turbinatus, & saturata
purpura nigricans : huius consimilis, obscuroque
discrimine prope gemellus exuberante cæli colore
splendidè fuscum; foliolisque conuolutis Februa- E cyaneo fu-
scus & cri-
spus.
rio & Martio mense cincinnatum : Byzantium, Cerule* ma-
ior odoratif-
simus Byzan-
tius.
odoratissimum floribus diluto colore cæruleis,
splendentibus, maiusculis, & raris mense Mar-
tio visendum in rapi rotunditatem depressus,
conglobatus, atro rubore suffusus: lacteum me- Candidus,
dia tempestate florentem, atque à magni Ducis
Hetruriæ stabulis viridario conterminis imparem
appellationem indeptum vastior, in latitudinem
fusus, exalbidus : violaceum dilutionibus macu- Violaceus di-
lutionib* ma-
culis distin-
ctus.
lis intercurrentibus distinctum, cui vernaculum
à leonino colore nomen est, non ita magnus, in
globulum prope collectus, nucleorum, quàm flo-
rum, fertilior, & pallidus : cineraceum modicè Cineraceus.
subsicens, inhærentis crebræ sobolis pressu atque
suctu denormante rarenter in rotunditatem glo-
batus, subpallidus : subrubente tubulo albican- Subrubens.
tem longulus, carne tenerrimus, & hanc ob cau-
sam cariola sæpe basi vitiosus : obsoleti candoris
ferotinum polyanthem facie simillima geminus Albus feroti-
nus polyan-
thes.
proximè superioris, qui florem fert ex albo ru- Violaceus po-
lyanthès cau-
le foliato,
bentem: subnascens per floridi caulis intervallo

L

viren-

Polyanthes
multiformis.

Ceruleus di-
lutior colore
rosmarini.

Subulridis du-
plex.

Racemosus
multiplex.

*Ianuari** mul-
tiplex.

Rosens mul-
tiplex.

virentibus tænijs foliatum rotundus, & frequen-
ter exesam carie imam sedem explentibus bulbu-
lis deorsum versum sobolescent: polyanthem quâ
odoratum, quâ inodorum, eumque maximè,
quem satù plerunque felicissimo prodigiosè va-
rieque multiferum suscipit quàm ferox armorum,
tam mitis florum genitrix Brixia, compactus, or-
biculatus, nullo raroue hærede cohærente infec-
cundus, tota in florei partus absolutionem luxu-
riante fecunditate: isti planè consimilis rosmari-
no coloratum, cum præcoccem parcius, tum
serotinum liberaliùs florum feracem, & præcrasso
caule spectabilem: duplicato autem flore ex albo
& cæruleo virescentem itidem rotundus, foliati
radice maior, sessili parte vitio obnoxius. Vio-
laceus est singulari pulchritudine hyacinthus, qui
de singulis longiusculis pediculis flosculos com-
plures frequentiore foliorum coma stipatos rac-
emi modo plerunque suspendens (interdum enim
præter morem abortivius more prouenit cætero-
rum) appositè racemosus dicitur. Hunc ex bulbo
conijcies mediocri, quadantenus rotundo, & sub-
rubente. Ianuarij nomenclaturam à cultoris cogno-
mine sortitum in pusillæ rosæ formam foliosum,
pretiosumque diluto cælesti colore hyacinthum
prædicto cyanei floris bulbo simillimus ambigüe
indicabit. Sed grandiore Roseum flore, pariterque
cæruleum signo nullo insignis bulbosa radix à vul-
gari-

garibus non fecernit . Anglicum siue Belgicum , Anglicus , siue Belgicus serotinus .
 nempe campestrein earum regionum florem extremo Martio vernantem ex bulbulò interpretaberis nudulo & candidulo ; si cæruleum is progignat , Cæruleus .
 sæpius orbiculato ; si candidum , aut ex candido rubellum , Candidus . Rubellus .
 frequentiùs oblongo . Hispano hyacintho serotino atque inodoro minorem natura modum , faciem Belgico persimilem dedit . Cæruleus plerumque aut candidus mense Maio palmari spica vernat , cuius apex ad quaternos digitos confertioribus flosculis oneratur : cauliculus prætenuis , & prædurus diluto colore viret : folia , quàm in Belgico , tenuiora atque angustiora canaliculatim incuruantur : albus & globosus bulbulus pusillam iunceo folio Hispani narcissi bulbosam radicem æquat . Obsoleto colore tum viridis , tum rubentis siue melini hyacinthi bulbus in crustumini minusculi pyri effigiem longiusculus , albidus , latiore basi sessilis : folia prælonga , angusta , carinata , succosa , pallido virore suffecta , mucronata , flexuosa : caulis subviridis , pedalis , gracilis , duriusculus , ab imo ad summum inæqualia per intervalla secundum angustissimas foliaceas appendiculas flores extremo vere ferens Belgicis consimiles , nonnihil tamen longiores , è breuib. pediculis nutantes , senis folijs contextos , exterioribus quidem reflexis , interioribus verò tanquam in tubulum coeuntibus , imam spicam rariore , summam

Hispanus obsoletior .

Peruanus.

Botryodes odoratus.

denfiore copia onerantes, onerique interdum imparem & languidam acclinantes: folliculi femine offertissimi plano, cartilagineo, circinato, nigro. Hyacinthum stellatum polyanthem Peruanum folijs craffioribus, latè carinatis, angustè mucronatis, splendide virentibus, propter humum fufis; caule firmo; tereti, glabro, virescente; minutis innumerisque floribus modò cæruleis, modò ex cæruleo in violam inclinatis, modò albis, modò albidis, in stellam hiântibus, spicatum in turbem conglobatis, ex ima primùm parte sese pendentibus; acuminatis ac trigonis folliculis semen rotundum & nigrum concludentibus, bulbus effundit grandior, foris fuscus, sub exteriorè tunica laniger & re ipsa eriophorus, basi lata & prominente sessilis. Mera in florem collecta suauitas, hyacinthus botryodes Chalcedonius, siue Turcarum Muscari, vel ipso barbaro nomine iucundè olens caulem surrigit crassum, teretem, fragilem, ad partem vsque dimidiam nudum; inde ad cacumen flosculus, vtpote iucundissimi odoris plenissimis, in vrceolos meritò conformatis, modò leuiter luteis, modò subalbidis aceruatiim racematum. Prægrandibus, ac triquetris vasculis semen includit nigrum, rotundum, eruo par. Folia frequenter humi sternit proluxa, in mucronem fastigiata, satis & crassa & virentia, canaliculata, tortuosa. Bulbum subiicit oblongum, albicantem, compluribus tuni-

tunicis caparum instar coagmentatum, crassis fibris ex ima extuberante basi diffusis, nec vnoquoque anno pereuntibus & rediuiuis, sed perennibus innixum. Illud habeo tandem subicere, sufflauium hyacinthum botryodem geminum esse, alterum præcocem, serotinum alterum non sine discolori discrimine: illius enim præfestinatum ante hiemem germen expallet; huius verno tempore tempestiuum saturatione purpura nigricat. Colitur præterea duplex hyacinthus botryodes inodorus, lacteo candore alter, alter diluta purpura respersus. Illius cauliculus, & iuncea folia languido virore pallent; huius autem ex viridi purpurant. Vtriusque flores Aprili mense perangustis oscillis oscitantes concava rotunditate globantur minutarum effigie margaritarum, à quibus Italicum nomen retulerunt; summumque cauliculum vna confertim vernante conuestiunt. Rotundi bulbuli penetralem candorem pullo cortice insuscant: prodigiòse etiam fecundi, quòd angustis corpusculis nequeunt, numeroso nucleorum partu late se porrigunt. Comosus florum panicula, hyacinthus, Aprilis flos, quòd in floridissima Sannesiæ domus amœnitate primùm admirabilis hospes Romam oblectauit, Sannesus dictus est: quòd autem luctibus ac funeribus dicatæ cupressus lætare imagine, vulgò cupressinus appellatur. Floresculos ramosos, capillamenti modo tenues, tenerimos, fragiles, velut vitrea glacie concretos,

C. cl. Append.
vlt. ad plant.
hystor.

Botryodes
inodorus candidus, & rubellus.

Sannesus florum panicula
comosus, siue
cupressinus.

Fab. Columna
Ninus cognit.
Scrup. ex Re-
rior. par. 2. c. 5

Indicus tuberosus candidus.

vario flexu ramulosos, è cælesti colore in purpuram inclinantes primùm instar fœminæ cupressus metæ aspectu in fastigium conuoluit; deinde, vt assolet mas, extra se spargit: cauliculo sustinetur subviridi, seu subalbicante, prætenui, rotundo, læui, lignoso, inter folia proficiente prælonga, succosa, nonnihil carinata, & flexile in cacumen extenuata: bulbum turbinat; subrubente foris tunica inuoluit, crassisque fibris firmat; à commo spurio hyacintho dilutiore potissimum rubore, & minuscule mole secernit. Indici hyacinthi, siue Asphodeli nuper ad nos translata tuberosa radix, ex qua ille cum vita nomen accipit, oblongum botryodis odorati hyacinthi bulbum imitatur: carnis, & subnascantis calli duritiem superat: nimum sui prodiga, & raritatis gloriæ officiens innumeros totò corpore parit hæredes: incunte vere folia emittit in terram conuexa, proluxa, digitum lata, in acumen deficientia, viridi læuore nitida: caulem impellit ferè bicubitale, duriusculum, læuem, geniculatum, breuia è geniculis folia fundentem, minimo nunquam digito crassiorem, numerosis floribus cacumen onerantibus vberriimè spicatum. Hi succo pleni, degenerare à patrijs Indis lacteo vultu oculis, odoratissimo spiritu naribus suauissimi, aurei malodoribus æquales, ab ima parte particulatim sæ explicantes æstiuis mensibus ad hiemem vsq; vernant.

Cycla-

*Cyclamini, & floris Indici è violaceo
nigricantis nota.*

CAPUT V.

T Vberosa radix bulbo proxima Cyclaminus *Theophrast. Hist. plant. l. 7 c. 9. Plin. l. 21. c. 9. & l. 25. c. 9. Jean. Ruell. de nat. Stirp. l. 2. c. 94.* est, quam veteres Latini terræ modò umbilicum, modò rapum, modò malum, ac tuber appellarunt. Eius duo genera discriminat florum gemina tempestiuitas, alterum vernum, autumnale alterum, vtrunque raro candore charum: nam, pretium cultumque minuente copia, sepius obuium prope omnibus, licet rosas æmuletur, licet regio colore splendeat, prorsus viluit purpurascens. Quod vere floret, Byzantio translatum duplici candet aspectu. Flos enim de more in quinque sursum reflexas foliorum lacinias distributus, & veluti refugo à fronte capillo relicinus, aut emaculatam albitudinem grandiore mensura explicat, aut vulgaribus par, & cætera candidus rotundum osculum saturata purpura expingit: odoratam vterque animam, dum viuit, expirat: vterque mucronatæ rotunditatis leniter serrata folia præmittit autumnò, quæ (quod familiare plerisque est) subter ex viridi albicant, supernè verò ramulosi toris subrubentibus virent: sed ille latiùs explicata fusco virore albidis maculis interstincto inficit; contractiora hic diluta viriditate, viridiorem umbilicum cingente, distinguit. Vernam folioso

*Cyclaminus
gemina:*

Verna.

Abutilon.

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus

Flos Indicus
 è violaceo in
 scus radice
 tuberosa.

flore prorsus candido Cyclaminum prædictarum
 priori partibus plerisque simillimam tum floris
 theca magis turgida, tum flos ipse numerosis fo-
 lijs nondum satis euolutis primò glomerofus à po-
 pulari secefnit. Probabilior autumnì Cyclaminus
 aut languide odorata, aut penitus inodora simili
 colorum in floribus discerniculo exalbescit. Eius
 folia in orbem sparsa, crispa, supernè maculosa,
 angulata, & marginibus quasi circumrosis crenata
 ipsis floribus præpostera lentè festinant. Vbi mar-
 cidi flores interciderunt, semine graui longis cum
 pediculis, quibus insident, capitula multas con-
 uoluuntur in spiras, donec terram attingant illic de-
 mum adulta, maturoque partu hiantia semen osten-
 dunt inæquale ac sulcum; quod humo exceptum
 non abit in germen more seminum cæterorum;
 sed in tuberculum rotundatur, vnde postmodum
 folia emergunt. Radix tuberosa in orbiculatam
 latitudinem effusa, oculis interdum, velut in cau-
 liculos, extantibus supernè scabra, senio etiam ru-
 gosa candidam carnem nigrante corio inuestit.
 Indicum tuber effigie rapuli, colore intus albo,
 extra subrufo, corpore binos ternosue digitos lato,
 superno infernoque umbilico angusto, & nonni-
 hil introrsum acto paucos ante annos ad Parisienses
 hortos aduectum est è Batauia. Illic toto triennio
 sine fibrarum exortu, sine floris ostentatione igna-
 uum atque inglorium latuit. Romam denique
 transla-

translatum, velut erosum terebratumque tere-
dine, in Tranquilli Romaui manus, efficaces nempe
cultrices, venit. Hæ vario satu indolem tuberis per
biennium explorarunt. Et primò quidem florem
elicit macra humus cum exiguo sabulonis admi-
sta. Iam verò ferum tuber adeo cultus edomuit,
& consuetudo mansuefecit; vt communi bonoque
olerum solo gaudeat, arcanumque gaudium flo-
reo|risu exprimat. Septembri mense radix in fi-
ctili primum deposita germinauit Octobri; tum
verno tepore turgere cæpit in florem: sed florea
spes intempestiuis pruinis præusta decoxit. Folia
exeunt à tubere longa, & sæpe cubitalia, lata, ner-
uosa, striata, gladij modo in mucronem exacuta,
diluto virore albicantia, propter humum candida
rubrisque guttis intertincta. Medius deinde scapus
exilit dense ramulosus, & bulbosæ iridis more ar-
ticulatus, ac breuioribus mucronatis folijs articu-
latim armatus: vt licet iridem nonnemo vocitet,
gladiolo tamen propior hæc planta videatur. Flo-
res simplici narcisso grandiusculo prorsus albo
suppares in sex folia decussantur subter virescen-
tia, supra è violaceo fusca, natiuo tanquam holo-
serico villosa, furuis & velut fuligine oblitis per
ambitum cirris, seu fimbrijs crispula & corrugata,
atris albidisque vnguibus maculosa, prominula li-
nea intermeante distincta. Medium præterea sty-
lum surrigunt ianthinis, atque albicantibus macu-
lis

Tranquillus
Romanus.

lis notatum, staminibus tenuissimis in imo violaceis, in summo luteolis capillatum, quaternis quoque maiusculis bifidis crocis exteriorem in decussem demissiùs digestis coronatum. A medio caule ad cacumen usque summis è ramulis, atque ex ipso foliorum complexu mense Martio atque Aprili particularim existunt. Medicamenti cuiuspiam, aut mellis excocti inelegantem odorem expirant. Diem, aut paulò diutius viuunt breuissima digni vita, quippe nocti mortique nigritudine concolores. Emortui, velut informia vesperilionum cadauera, illepidè contrahuntur: deinde ultro caduci voluntarium properant ad sepulcrum. Mira est huius tuberis fœtura: ex imo enim vmbilico fibra prodit modò longior, modò breuior, narcissinæ instar candida & modicè crassa, cuius summa pars in tuberculum paulatim sobolescit. Quare factum est non semel, vt eius fibræ iam corruptæ soluto nexu procul à matre præter morem natus fœtus inobseruato adhuc miraculo inueniretur: interdum quoque breuioris fibræ ligamine adhuc integro soboles matri cohærens & contigua, vel etiam de more adnata deprehenditur. ..



FLOS INDICVS E VIOLACEO FVSCVS
RADICE TVBEROSA



Anemones notæ.

CAPVT VI.

FLoriferis oculis abundat exigua radix anemones, vt omnium voluptati oculorum quàm maximè prospiciat. Sunt, qui anemonen Phenion vocent: alij Adonidis ab proterempti florem appellant: alij Veneris Adonidem lugentis lacrimas in eum florem concreuisse deblaterant; innocentissimi risum floris impuræ fabulæ tragico luctu funestantes: alij denique vim Græci nominis interpretati florem venti nominant; quia non sine vento aperitur; & (quas etiam aulæ vices alternat) eadem, qua fouebatur aspirante aura, reflante diffilatur. Duo autem sunt huius herbæ fastigia: alterum enim tenuibus coriandri folijs altè multifidis, minutim laciniosis, atque tergeminis; alterum apij modo diuisis, tripartitè dissectis, rotundum per ambitum modicè serratis, & leniter crispis viret. Eius, quæ tenui folio est, anemones cauliculus nudus, exilis, leuiter lanuginosus, palmaris, aut etiam pedalis, circa dimidium aut sub ipsum cacumen tribus foliaceis lacinijs sine pediculo pressius cohærentibus, & aliquantulum surrectis intercinctus, in cacumine florem explicat latioribus folijs non minùs senis, ferè in rosæ amplitudinem circinatum, medio interdum

*Plin. l. 21. c. 23
Nicander.
Theocrit.*

*Plin. l. 21. c. 23
Nicander.
Theocrit.*

Anemone duplex.

Tenui folio.

Læo folio .

Vtriusque discrimina è radicibus .

terdum globulo staminibus obsito , exalbido, atque villoso capitulatum, qui tomentosam in lanuginem semine subrufo , longiusculo , planoque plenam, aura leuissima soluitur ac dissipatur ; interdum etiam sine seminali capitulo coma densissima capillatum . At verò latifolia flos simili caule suffultus angustiorum foliorum modò simplici , modò multiplici serie contextitur . Excusso flore caput in umbilico eminulum nascentis asparagi cacumine intumescit, exili flocco incanum, & lanuginoso semine densatum; quo tandem fatifcente, leuiter volitantes feminæ villos incautis cultoribus auræ præripiunt . Vtræque anemone multum, sed latifolia è semine variè degenerante progenita licentiùs versicolore varietate lasciuir . Quæ folio tenuiore pubescunt floris huius radices, intus candidæ, pullo foris castaneæ colore non sine multiplici discrimine nigricant : pleræque etiam in graciles, pressas, longulas, & inæqualiter articulatas appendiculas, quas ab imitamento linguas vocitant, effunduntur : nonnullas tamen animaduertimus nodosis oculis , quàm porrectis lingulis , frequentiores; ex præsertim sunt, quæ florem ferunt arboris persicæ flori concolorem , minutulas lacinias conglomerantem, quæ viuido cinnabaris rubore splendescentem , quæque planè viridi facie ancipitem an inter flores herba sit, an inter herbas flos . Diuturna quoque obseruatione comperimus linguæ figuram
fatam

fatam radicem in tuberosum oculum adnatis circa oblongis, & planis internodijs lingulatum sæpe degenerare. Latifoliæ autem vniuersæ radicibus indicantur magis nigricantibus, nullas exertantibus lingulas; sed rotundos in oculos extuberantibus. Hæc autem oculata tubercula aut lata rotunditate subsidunt, aut gracili longitudine assurgunt. Dubia & facilè fallentia florum discrimina petuntur è radicibus; quia sæpenumero vix, aut ne vix quidem facie discrepant: nos certiores cuiusque notas præmonstrabimus. Inter eas, quæ tenui minutimque conciso sunt folio, & folioso flore, anemones pallido candore lacteam radix indicat fusca, tenera, longis hæredibus sobolescens: circumfusus folijs albicantem, medioque villo subrubentem, subpallida, duriuscula, longulas in soboles porrecta: rubram colore fusco ferruginea, lingulis oculisque pariter articulata, rara carie laborans: vegeto cinnabaris colore miniatulam, oculosque hilari luce perstringentem degeneri pallore decolor, nodosis toris leui nexu coeuntibus frequentius compacta, cariæ sentire facilis: isti persimilis eodem fulgentissimo minio albis maculis guttato bicolorem: conuoluta vtrinque folia exuberante cocco saturantem proximè superiore magis fusca, pluribusque ac longioribus lingulis foecunda: languidè miniatam ex fuluo nigricans, in longas lataque soboles ramosa: rubram albo virgatam è cinereo fusca, atque

Anemone tenui folio, pleno flore lactea.

Albicans:

Rubra.

Cinnabaris saruro colore miniatum.

Cinnabari albisque maculis bicolor.

Coccinea folijs conuolutis.

Diluto minio colorata.

Rubra albo virgata.

ex

Alba rubro
circundata.

Trium colo-
rum.

Quinque co-
lorum.

ex facili putrescens. Huic parenti pallore ac teneritudine corruptioni obnoxia congener, nouo mirabilique flore formosè degener geniculatus fœtus pudico & matronali visendam ornatu profert anemonen, purpurea nimirum instita circumdato foliorum candore stolatam. Vsq̃ue adeo non bene floret candida pulchritudo, nisi tutelari pudoris ambitu circuntegatur. Flos autem hic vt habitu, sic origine & pulchritudine Romanus natales habuit sanè memorabiles. Etenim rubræ albo virgatæ anemones humata radix inter flores de more maculosos è sobole adnata candidum florem edidit, cuius oras instar subsuti limbi ambitiosa, purpura obibat. Ea soboles & adnotata, & à matre diuulsa simili semper miraculo floruit, perpetuamque demisit ex se posteritatem, eiusdem laudis hæredem. Trium colorum anemone, folijs nempe fusco rubore saturatis, amaranthina coma, medijsque eminulis cirris blandè rubentibus insignis è radice dignoscitur nigricante, planos in oculos sæpius collecta, quàm longas in linguas diffusa, & frangentibus contumaci. Alia quinque colorum anemone addit superioribus tribus, aut certè consimilibus coëuntium in oculi speciem vnguium sulphureum, expassæque comæ imum argenteum colorem. Eius radix proximè superiore, parciùs nigrat, molliùs riget, floresque pro vocibus locuturas copiosè sobolescit in linguas. Monendus

nendus hic es, inueniri præterea degenerem & mendacissimam nomine tenus quinque colorum anemonen, re autem ipsa nullius prope coloris: perrarè enim floret, ac luxuriantibus tantùm folijs infeliciter siluescit. Radix hortorum exilio multanda oculorum nodosa fœcunditate discernitur. Saturo rubore fusca, albo distincta trium colorum anemonen refert radicis nigrore; in linguas ocellosque porrigitur, & frequenti carie absumitur. Violaceam, siue (vt alij à diluto colore nominant) columbinam ex radice prædisces misto atrore cinerea, lingulata, & vitio, postquam ingranduit, opportuna: mali Persici subrubicundis floribus concolorem, & medium capillitium colligentem, è subalbida, tuberculisque sæpe: acruatim adnatis incommodè coagmentata: eodem languido rubore gemellam, sed promissa & violaceis circumdata staminibus coma disparem è longis latisque ramosa internodijs, & magis pulla. Quæ floris folia holosericum imitantia obsoleto rubore infuscans, medijsque lacinijs virens supra morem cæterarum caulem in excelsum impellit; radicem oblonga per interualla geniculatam vehementer denigrat. Quæ verò viridior herbescit, biformis est: altera enim confertum medium villum superiore molliorem, velut in paniculam, conuoluit: altera, sic ab umbilico ad media vsque exteriora folia viret, inde ad oram subrubet; vt pavoninæ cau-

Saturo rubore fusca, albo distincta.
Violacea.

Mali Persici flore subrubicunda comam colligens.

Mali persici flore subrubicunda comam explicans.

Rubra medijs lacinijs virens

Tota viridis.
Umbilico viridi subrubet

Alba diluto
rubore umbi-
licata, & co-
ma duplici
bicolor.

Flammea flo-
re simplici.

Purpurea flo-
re holoserico
simplici.

dæ oculatum orbem imitetur; molliſſimum quoq.
florei verticis frequentem capillum non criſpat,
ſed promittit. Vtraque radicem tum oblonga,
tum rotunda ſobole extuberantem pullo indiſcri-
minatim colore ſufficit. Poſtrema inter folioſas
recenſetur anemonas, quæ nuper è ſimplicis floris
ſemine Romæ floruit formoſiſſima: candidis fo-
lijs diluto rubore umbilicatis latiffimum in orbem
patens duplici ſpiſſa coma, & veluti gradata capil-
latur, altera attonſa & viridi, interiecta mediaque,
altera intonſa & incana; quæ folijs etiam dilapſis
diu florida tam latè expanditur, vt lacinioſum flo-
rem anemonas latifoliæ mentiatur: prouenit autem
è radice pallida, compacta, carnoſa, & vegetiſſimas
linguas exertante. Probabiles præterea exiſtiman-
tur ſine medijs lacinijs anemonæ ſimplices non-
nullæ. Inter has quæ, foliorum candorem flam-
mea purpura in radios diſtinguente, purpureis à
flammis nomen trahit, radice ſubpallida tenuique
cum in oculos, tum in lingulas propagata ſe repa-
rat; lanuginoso etiam ſemine in varios diſcolo-
resque vultus ſeſe reſeminat. Neſas hîc fuerit in-
dictam præterire anemonen, cuius flos à pulchri-
tudine Rex indigitatur. Non deeſt huic Regi ni-
grans, & florido ſerico villoſa foliorum purpura,
cæleſti eleganter colore umbilicata. Purpurea
idem folia & laxa & promiſſa in tuliparum æmu-
lationem expandit; vt regio more ſyrma trahere
videa-

videatur. Radicem articulata gracilitate ramulosam subnigro squalore rufat. Cæterum latifoliae anemonæ pari ferme atrore suffectis, nodosis, oculatis, interdum quoque ab opacitate, à morbo, à senio tenuiculas protendentibus ceruices radicibus inter se vix differunt. Florem verò duplici Latifolia duplex. aspectu proferunt: aut enim exterior atque imatiorum foliorum series subviridis, ac discolori floribus rudimento virgata tenuissimas & consertissimas floreas lacinias suffulcit; aut folijs flos vniuersis æquè angustis, prolixis, & coloratis micat. Anemones tenui folio discriminae folijs. Florum præterea, quos tenui folio anemone parit, genera varia præfagimus è prægerminantium varietate foliorum. Candore tum emaculato suauiter lactea, tum obsoleto nitidè sordida folium præmittit frequentibus incisuris leniter laciniosum, interque incisuras laxius anemones folio, quæ mali Perfici florem diluta purpura æmulatur, comamque colligit: lactea tamen & magis explicat, & in viridi dealbat; albicans & angustat, & fulcat. Rubra, albo rubroque maculosa, & oris puniceis candida effundunt prope consimile, longulo videlicet ab radice pediculo porrectum, mediocriter incisum, sparsum, herbeo colore viride ac subrubens: alba languido rubore umbilicata, & coma duplici bicolor viridissimum, peramplum, crassum, erectum, rariùs intercisum, crispum: hilari cinnabaris fulgore ardentissima, & lacteis guttis irroratis minùs ardens,

dens, magisque visenda bene virescens, leui per
 oras rubore conspersum, raros in ramusculos di-
 scretum, & ferè iacens: quæ profundi coloris
 tristem ruborem interfuso candore diluit & hila-
 rat, minutatim laciniosum, satis viride, non
 admodum assurgens: quæ contractis vtrinque
 folijs cocco saturatiore nitet, mediocriter sessile,
 temperatè virens, & modicis diuisuris incisum:
 diluto minio fucata spissum, laxum, rariùs crena-
 tum, prasinum, nonnihil assurgens: quinque
 colorum ornatu multiplici singularis rarum, bre-
 ue, retusum, minutè concisum, humi stratum &
 planè supinum, fusca viriditate inamœnum: trium
 colorum felici numero gaudens, & mali Perfici
 flore languidè punicea, quæ mediam glomerat cæ-
 fariam, pusillum, densum, multifidum; sed illa
 herbidum & reptabundum, hæc luridum & mi-
 nùs prunum: eiusdem mali Perfici rubello con-
 color flori, quæ prolixam depexamque comam
 staminibus ianthinis coronat, raris diuisuris crena-
 tum, latis particulis distinctum, & pleno virore
 splendidum: violacea medijs inter extremas inci-
 suras interuallis superiori sub simile, surrectum, &
 vegeto colore iucundum: circa umbilicum viri-
 di ambitu oculata oris rubentibus breue, minu-
 tum, fastigiatum, modicè incisum, blandè virens,
 humili siluula procumbens: at verò toto inter-
 dum subrubente flore, ac virente coma bicolor
 gran-

grandiusculum , parcius fimbriatum , paulò erectius , minùs filuosum , in viridi pallidum : circumfufis folijs obfoletiùs purpurea , medijsque conglomeratis foliolis virefcens altè infectum , longis & ramulosis pediculis diffipatum , raris ramulis brachiatum , incuruum , ac decolori facie inamabile : ifti cætera confimile , at viridius , laxius , denfius , atque in excelsum emicans quæ villofo florentem holoserico fufcam purpuram induta regale cum habitu nomen vfurpat : quæ denique floreas foliorum niues purpureis radijs innocenter flammea peruadit minutulas in lacinias diffectum , contractum , vegetiffima viriditate coloratum . Cæterùm ex huius , quæ tenui folio eft , anemones , atque etiam è latifolix cuiuslibet feto femine vt multicolor florum , ita multiformis atque inenarrabilis foliorum varietas exiftit .

Ranunculi notæ .

C A P V T VII.

INter hortenfes ranunculos lectiffimi habentur , quorum exigua radix , pluribus ab vno capite demiffis prope rotundis aut longiusculis pallidis radiculis in tenues fibras definentibus , grumuli effigie coalefcit . Oblongis & craffioribus coagmentata fimplici flore ranunculum feret . In

*Ranunculus
radiculis in-
grumū acer-
uatis .*

Simplex .

Afiaticus flore aureo simplex.

ter simplices in primis aureus pretiosus est . Breui prætenuique pediculo nixus quaternis, quinis, senisue latis folijs nigrum capitis rudimentum coronat, in longuli, plani, minutuli, & subrubentis seminis teretem thecam transiturum . Imma folia modicè lata, pingua, laciniatim diuisa, & leuiter ferrata ex viridi flauescunt . Cohærentes in grumum radicula gracili longitudine porriguntur .

Afiaticus flore coccineo multiplex.

Sed radices illæ, quarum flores densa structilique foliorum copia compacti ardentissimè rubent, minusculis quæ ferme rotundis, quæ oblongis glandulis coagmentantur . Folia pallida, itidem crenata, sed minora, & sæpe tripartita prosiliunt . Cauliculus crassior & procèrior, leuiter lanuginosus, adnatisque minutim incisissimis folijs pinnatus aut rectus in vnicum, aut obliquè ramulosus in plures desinit flores; qui læta quandoque pabuli luxuria, radicisque robusta iuuenta è sinu medio altius impulsus, breuique pediculo nitentem vnum alterumue pariter foliosum sese euiscerant in flosculum .

Flauus multiplex folio rutæ.

Eum præterea ranunculum nostrates educant horti, cuius granosa radix granis paucioribus, quàm superior, albidis, rotundis, duplo, quàm triticea sint, maioribus in grumulum coalescit . Folia humi repunt rutæ simillima, sed herbaceo colore lætiora : caulis gracilis, imbellis, atque striatus in palmum adolescit : eius fastigium flore instar candidi multiplicis ranunculi mox descri-

describendi folioso , grandiore tamen splendorque à Martio mense in Aprilem vsque flauescit . Flos autem duplex; alter laxiorum foliorum; imo ambitu media foliola spississima coronat; alter paulò ampliora proxime superioris medijs foliolis folia serie pariter densissima in rotunditatem conglobat . Alium prælongis, tenuibus, diffusisque radicibus inhærentem solo ranunculum nostri cultores in pretio habent, cuius folia oblonga, serrata, dura, neruosa, aut in summis pediculis aut circum ramulosi caulis alas in stellas collata, supernè fusca, subter diluta gemino virore pinguntur . Lactei flosculi minuta foliorum densitate instar bellidum turgiduli, vnoquoque in ramusculo solitarij gemmantium hortorum smaragdinis virgulis præfixæ margaritæ sunt . Ranunculo, quem Fibræus flore pleno cædido.
Globosus. globosum vocant, radix est è capite plurimas prætenues fibras in capillamenti modum spargens, adnascentem in sobolem itidem capillatam, quæ multiplici è germine prænoscitur, multiplicabilis: folia eidem lata, rotunda, stellatis anfractibus sinuosa, crenata, neruosa, ex viridi pallida: caulis concolor, palmaris, exilis, ac tener: aureo colore flos, geminatis folijs atque in anemones amplitudinem adultis in globum collectus, semperque nascenti similis, Aprili atque Octobri mense bis vernans: à flore loculatæ vaginulæ complures semine plenæ minuto, nigricante, eiusque simillimo,

Tuberosus.

M. H. de herb.
virtutib. s. 9.

mo, quod regius flos, siue delphinium reddit. Tuberosi ranunculi, quem batrachium cum Græcis appellat Apuleius, tuber cinereo colore fuscum, rudi verticilli forma scabrosum, grandiolem iuglandem nucem magnitudine solet æquare: adnatis è tuberculis pallidas tenuesque fibras longè porrigit: numerosa protrudit folia latam in stellam angulosa, diluto virore picta, ravis maculis distincta, nervulis intercurrentibus lineata, mediocri pediculo nitentia: in tres palmos caulem excitat ramosum, singulis ramusculis summum flosculum fundentibus luteolum, ranunculi, qui rutam folio imitatur, persimilem, at minorem, Maio mense vernantem.

*Asphodeli, Pæonia, Lilij convallium,
& Luca Indica nota.*

CAPVT VIII.

Asphodelus.

Flatus.

Asphodelus, siue hastula regia, non ferro, sed flore cuspidata, bicolore vernat aspectu: aut enim flauet, aut albet. Flauentis radix oblongarum veluti glandium, seu naporum aceruatis numerosis appendicibus compacta rufescit; nostratibus in hortis libenter hospitatur, feliceque floris ac sobolis respondet euentu. Densiore silua folia funduntur herbea, prælonga, angu-

angusta, lenta, concaua, mucronata : medius teres ac firmus in vnum alterumue cubitum scapus adolefcit ; modicisque liliaceis floribus suauiter olentibus, florido colore flauis, circa summum cacumen per partes vernantibus Aprili mense decoratur . Albi Asphodeli nomine paucos ante annos à Byzantinis hortis ad Romanos transducta est radix phalangio non absimilis ; complura, oblonga, crassa, exalbida fibrarum cruscula, flauialphodeli radicibus graciliora ex vno capite diuaticans : peregrino eadem in solo exilij perterrita nec vnquam floruit, nec diu vixit . Verutissimum & saluberrimum inuentum, montanæ opacitatis filia, hortorum vrbano splendore donata, atque Hispano præconio montium rosæ, Pæonia, minore florum in populo speciosissima, superbit ; quæ confertissima foliorum congerie peramplum explet ac perficit orbem absolutissima formositaris : vtque iudicibus oculis triumphet, triumphalium saturatæ, tum dilutæ purpuræ splendescit ornatu . Si ardentius purpuret, flore sensim exalbescente & caduco ferè intra dies octo deflorescit : bipalmi nititur caule carnosò & brachiatò in folia ramosa, rariùs fimbriata, vegeto colore splendida, inferiùs cæsia & lanuginosa : radice gignitur præcrassa, torosa, foris subrufa, intus candida, oblongos & carnosos in balanos diuisa . Sin leuiùs & suauius rubeat flos ; paulatim è roseo pudore

Albus.

Pæonia pleno flore.
Plin. l. 25. c. 4.

Rubra.

Subrubens.

Lilium conuallium.

Album, & subrubens.

Iuca.

pudore niueum in pallorem elanguescit, natioque scapo pertinaciter adhærescens immoritur, folioso cadauere primùm nigrescente, tum emarcido, siccitate denique notabilem in modum contracto: folia illi dilutiora, & angustioribus lacinij concisa: radix præterea contorta, crassa, dilutior, longioribus & gracilioribus nodis glandulosa. *Lilium conuallium* pusilla rotunditate plus odoris, quàm floris includens, per oras denticulatum & reflexum, toto etiam osculo suauem inhalitum oscitans aut summè albet, aut modicè rubet: palmaris & rigidus cauliculus à medio sursum versus pronis flosculis oneratur: duplex aut etiam triplex folium liliaceis non absimile, breuius tamen splendide viret: graminea radix geniculatis latissimè proserpit internodijs: ab ipsèdem & radicis cacuminibus nouas radículas dispergit. Floris candorem languidior, ruborem vegetior radicis & folij color; illum præterea laxior, hunc angustior vtriusque mensura significat. A floris occasu bacca turgescit primò viridis, deinde rubicunda, duriusculo semine referta. Occidentalis Indiæ *Iuca* radice nititur crassa, intus candida, foris rufa, geniculata, & velut arundineis bulbis, quos oculos vocant, sobolescente. Verno plerunque tempore citata folia denso nemore fundit foliorum Aloës prope gemella, binos palmos longa, robusta, & rigida, in semicirculum canaliculata, in præ-

prædurum, præacutum & fuscum aculeum conuoluto vtrinque cacumine minaciter muricata, tenuiora tamen, crassitudine & colore palmea; nec obliquis per summa latera spinis exasperata, sed fulua margines percurrente linea distincta: cum cæteris anni temporibus, tum præcipuè vere torosus thyrsus asparagi, siue hastulæ regiæ modo emicat assurgitque in trium quandoque cubitorum læuem, & sanguineo colore splendentem virgam; quæ diffusis palmaribus ramulisturbatim arborefcens florea tintinnabula, fritillarias citra quadratas maculas imitantia, obsoleto candore pallida, leuique nonnunquam rubore interfusa, inodora, deorsum versum spectantia, raris intervallis numerosa suspendit: eadem tandem sine semine decidua sibi posterisque moriuntur.

Byzantine Lychnidis, & Americani Trachelij notæ.

C A P V T I X.

LYchnis Byzantina miniato siue coccineo flore multiplici in oblongam, luteo colore nonnihil aspersam, densis, promissis & capillaceis fibris comatam radicem gracilefcit: in trium quatuorue palmorum caulem excollitur recto statu nitentem, striatum, geniculatum,

Lychnis Byzantina miniato flore multiplici.

Trachelium
Americanum
flore rubro.

tum, bina ab nodulorum toris folia longula, è latiore basi in mucronem fastigiata, supernè læuia, subter hirsuta pandentem, geniculatim in ramulos fruticantem. In flores ita lepidè luxuriat: ex oblongis, confertim in orbem circumactis, atque striatiscalyculis caulis vertici umbellam primùm obtendit: ex illis deinde prægnantibus inuolucris floream pilam densissima serie circinatam parit: florem bellio breuiorem non admodum diuersis, per ambitum, bifidis confertisque barbulis contexit: cum Americano trachelio æstate vernat: in flore implendo exhausta semine deficitur. Trachelium Americanum flore rubro, cui Cardinalis plantæ vulgare nomen indidit color, tenuissima & candida capillamenta demittit, quæ flore dilapso, marcidoque caule corrupta defluunt, exiguè post fruticantibus nouis: folia emittit bellidum folijs subsimilia, pingua scilicet, humi iacentia, leuissimè serrata; sed viridiora, longiuscula, & crispula: instar asparagi stylum excitat modò simplicem, modò ramulosum, adnatis per interualla folijs etiam pinna- tum: styli ramorumque cacumina conglobatis, velut in paniculam, creberrimis flosculis leuiter onerat; subiectam inde teretem viriditatem rarioribus distinguit: flosculos tum extremo vere, tum æstiuis mensibus tempestiuos, simplicis floris delphinium ex parte referentes fusco rubore villosum sericum mentiente colorat: intra eosdem
iam

iam peraridos capitula occultit feminis plena nigelli, orbiculati, ac tam exigui, vt in cernendi lensum prope non cadat : vbi flos intabuit, propagandæ soboli vacat.

Caryophyllorum nota.

CAPVT X.

VT coronariæ vettonicæ, siue vulgatiore nomine caryophylli discrimina internoscantur; ambigux fidei semina, radices, & folia inconsultè consuluntur. Floreus enim iste in omnem varietatem Proteus nullius hætenus Aristæi calliditate, vt vera præmonstret, deprehendi potuit. Sæpe fit, vt pulcherrima indicia florem spondeant pulchriorem; flos deinde promissus turpiter degeneret. Quare, dum florent, plantæ præsignandæ, & probabiles ab abortiuis segregandæ sunt : eadem enim facies bonis malisque promiscua ex facili fallit. Publicum est omnium niti radicibus lignosis, subrufis aut albidis, multiplici fibra crinitis, in foliaceos sæpe surculos abeuntibus : inde cauliculos existere teretes, graciles, in ipsa gracilitate ligneam duritiem affectantes, pyxidatis geniculis articulatos, folijs obseptos geniculatim inter se aduersis, breuib, carinatis, in viridi colore plerunque glaucis : summos calyces multifidis calyculis suffultos, oblongos, glabros, extre-

Caryophyll'
pleno flore,
pinnatus mi-
nor & maior.

Flos Arme-
rius.

extremas per oras orbiculatim denticulatos in flores hiascere modò simplices, modò foliosos, superari amplitudine rosis proximos, breuibz frequentius, interdum etiam profundis lacinijs incisos, mira varietate coloratos, inter aromata nobilis caryophylli tum odore tum nomine insignitos: arefactis demum floribus, longos ac duriusculos calycibus inclusos folliculos plano & nigello semine turgescere. At verò caryophyllus pleno flore minutè alteq. infecto pinnatus seu fimbriatus & minor & maior apertè proditur saturatæ fuscæque viriditatis folio: ille præterea minutulo secernitur à cæteris. Caryophyllo propemodum par & congener recenti nomine flos Armerius, ne magnitudine superetur, flosculorum congestu latam explicat umbellam. Eius quoq. præuium discerniculum in folio est breui, lato, & eius herbæ, quam saponariam vocant, simillimo.

Granadilla, siue Maracoti notæ.

CAPVT XI.

ILle diu à nostratis mundi hortis omnibus hiulco florum ore suspiratus, ille è Peruanis ac Mexicanis longè determinatis finibus accersitus, poëtarum ille canoro, atque oratorum facundo plausu tandem exceptus, diuini Amoris manu vitalibus inscriptus doloribus Granadillæ flos, quem Indi Maracotum vocant; vt à mortali-
bus

bis obitos pro Deo cruciatus in coronam transituros intelligamus; illud, inquam, florem ac suauem miraculum quotidiano spectaculo prope iam vniuersis. Vix est, qui præterea miretur, pœnas degenerasse in florem, tortiter tolerantibus adulantem; extima per ambitum folia in aculeos extenuari, spinæ coronæ memoria molliter compungentes; ream pro nobis innocentiam in folijs albescere; pertæsa sæui laniatus cruenta flagra, in floridæ voluptatis purpuream telam redordientem filatim retexi ac superinduci; saxo in germen emollito, columnam ex atrio crudelitatis ad piam, in flore medio structuram excitandam transmigra- re; columnæ imminere globosum rudimentum spongiæ quondam felle imbutæ, deliciarum auiditatem detergentis; modò ternos, modò quaternos extare conformatos capitatis è staminibus clauos, animis amabiliter configendis aptissimos; vnâ crucis effigiem desiderari, quòd extremam sæuitiam floris indoles mitissima repræsentare non audet; folium in lanceam exacui, sed innocentem, quippe retusam in ipsius vulnerato pectore charitatis; suauem denique ac medicatum fructum ad cordis imaginem rotundari, cum è diuini vulneris flore vitalis fructus extiterit, amantis Dei cor. Vix, inquam, est, quem cura & cultura tangat floris planè admirabilis, in quo ipsi vernant ac rident acerbissimi dolores. Si
quem

quem tamen non piget, imò delectat, salutis à Deo acceptæ infinitum beneficium in floreas notas suauiter contractum grata recordatione relegere, eodemque mortalium animos immortaliter esse inscribendos vel à floribus placet admoneri: si iuuat è funebri Amoris flore salubrem sæpe fructum colligere in cordis amabilem figuram, vt cordatissimos amantes faciat, conformatum; radicem & folia, ne fallant indicia, præno-scito. Radix in luteum pallorem languida & geniculata inextirpabili fœcunditate proserpit, sobolescit, & fruticat: fictilibus verò claustris contineri nescia per imum foramen in subiecti soli amplitudinem clandestino reptatu se penetrat; multiplicique atque erratico gramineo lapsu latissimè spatiatur. Folia quasi trigona sambuci roseæ, seu potiùs lupi salictarij profundo incisus tripartita, maiorem mediam laciniam porrigentia, quaternas aut senas uncias longa, minutim serrata, læuia, tenuia, imbecilla, aliquantulum venosa, diluto colore virentia, inferiùs etiam dilutiora, grauiter olentia, alternis disposita, ternos inter se digitos diffita lentum vitilemque caulem præue-lant; qui, cum vires sine adminiculo standi non habeat, quicquid clauiculis, veluti manibus, nanciscitur, auidè comprehendit, arduoque ascensu reptabundus, & cameras ac pergulas operiens æstuantium Indorum hortenses cœnas iucundissimè

mè inopacat. Nobis etiam cancellarim scanfilem
arundineam, siue virgeam structuram sequaci vi-
riditate prætexens Indicæ regionis remotissimam
vmbra commodat. Atque hoc sanè sapienter de
more congruenterque artifex natura caduco in flo-
re ludit; vt, qui diuini Liberatoris seruire suspen-
dium eligentis acerbissimos cruciatus opere sin-
gulari velut miseratus exprimeret, in crucis for-
mam decussata statumina pensilis adamaret.

Gelsiminorum nota.

C A P V T X I I.

Citerioris eius Hispaniæ, quam veteri nomi-
ne Laletaniam, recenti Cataloniam vo-
cant, flos fortasse ab animæ suauissimæ
prodiga expiratione exanimato similis, & exangui
colore candidus, æstate autumnoque tempestiuus,
blando vocabulo ab Italis deducto Gelsiminum,
asperiore Arabum appellatione Græcam odorariæ
violæ significationem subolente Iasme vel Iosme,
Iasminum vel Ieseminum tum ampliore mole,
tum acutiore odore à siluestri nostrate seiungitur.
Virgæ præterea è pallido, scabro, duro, lignosa
fibrataque radice stabilito caudice similiter fruti-

Gelsiminum
Hispanum
candido flo-
re simplex.

Matthiol. in
Dioscor. l. 1.
c. 66.

Joan. Ruell. de
nat. stirp. l. 1.
c. 84.

N

can-

cantes, proceræ, lentæ, &, quò libeat, flecti oblequentes, geniculatæ, binis ad singula genicula folijs alatæ, ramulosæ, medullitis candidæ fungosæque, foris tamen diluta viriditate latiores modò arundineos cancellos topiario textu conuestiunt, atque scenas hortenses textili vmbraculo prætendunt; modò circumfuso conuexoque in fictilibus nemore viride cælum cæruleo subtexunt: folia, quoque Hispano, quàm siluatico nostrati, simillimis in diuisuris latiora, obtusiora, crassiora, nigriora.

Hispanum
multiplex.
Tranquillus
Romaulus.

Quod autem in suis Romanæ amœnitatis hortis Tranquillus Romaulus conferta foliorum serie omnino singulare prior aluit gelsiminum, dimidio, quàm proximè superius, breuiorem tubulum protendit: quina vel sena folia in stellam diuidit: terna siue etiam quaterna ex umbilico surrigit, quæ nonnunquam in globulum colliguntur: quinto ferè die senescens non dilabitur, sed in natali ramulo inarescit: post multos dies dehiscens tubulus florem alterum plerunque parit: acriùs olet: more superioris ab æstate in hiemem vsque vernat, & gemella viriditate frondescit. Gelsiminum Arabicum, siue Alexandrinum, siue etiam Arabica nouo nomine Syringa (Sambacum Arabes vocant) frutex est Aegyptius in vnum alterumue cubitum arborefcens. Quamuis pollicari crassamento, breuique longitudine nanus, arborea tamen duritie scindi contumax,

Arabicum,
c. cl. f. cur.
p. 3. pag. 3.

max, squarofus, pallidusque ftipes in tenuia & longa ramorum brachiola fpargitur: folia inter fe aduerfa mali aurei, quod aurantium dicunt, feu potiùs coronarij fruticis, quem albo flore Syringam vulgò appellant, folijs confimilia, tenuiora tamen ac pallidiora, nullisque crenata incisuris ramulos inueftiunt: è fummis ramulis flores breuibus innixi petiolis ab Aprili menfe ad extremum ufque Octobrem erumpunt, modò duodenis, modò denis, nouenis minimum folijs duplicem in feriem digeftis inftituti, proximè defcriptis anguftiores, albitudine obfoleta palliduli, parum tubulati, umbilico circa tubum flauente difcolores, Hifpani gelfimini atque aurei mali floream fuauitatem odoratiflimo coniunctim halitu inhalantes, more ceterorum caduci. Vt illud hìc dolere & conqueri habeamus, Aegyptum effe iam floribus, quàm moribus odoratiorem. Luteum Italiæ gelfiminum, quippe minusculum nulloque odore amabile, præcipui noftres horti non dignantur hofpitio. Flauum Indiæ odoratiflimum alio loco opportuniùs, nempe in hortis Barberinis inter Indicas plantas ^{l. 3. c. 20.} olfaciemus. Planta eft inter Indicas, vt natiuorum ^{Americanum} florum, fic peregrinorum nominum fertiliffima, quæ patria voce Quamoclitum dicitur. A noftreis enim cultioris ingenij fermonisque cultoribus modò gelfiminum Americanum, modò rubrum In-

*C. claf. cur.
Poff. pag. 4.*

*Fab. Columna
Minus cognit.
Strep. & Rarior.
par. 2. c. vii.*

*Indicum maximum flore
phoeniceo.*

dorum gelsiminum annuum, modò gelsiminum folio millefolij, modò Conuoluulus tenui folio, modò denique Conuoluulus pinnatus exoticus rarior nominatur. Hic ab imo ad summum geniculatum fruticat, in longos vitilesque ramulos itidem geniculatos & fruticosos ambitiosè brachiatus, imò verò folijs tenuissimis diuisura pinnatis volucer ad inscendendos libertate pensili summos cancellatæ structuræ gradus. Tanta est vel ipsis herbulis auditas sublimitatis. Quin etiam æstiuis caloribus viridissimæ umbræ topiarium Briaræo par, hoc est numerosis viticulis centimanus prætexit. Flores oblongi ac tubulati, summa partè repandi & quinquepartiti, exuberante Cancami, quod vulgò Laccam vocant, colore renidentes, lineolis rugisue striati, staminibus quinis pallidis capillati, longo petiolo singuli biniue insidentes, alternato situ è ramulosis caulis geniculis ab Augusto mense ad extremum vsque Septembrem existunt. Squamosi demum folliculi turgent quaternis, oblongis, nigris, durisque seminibus fœti. Indicum, siue Canadanum gelsiminum maximum caule tenui, geniculato, lento, atque erratico, quamuis suapte natura caducum, reptabunda tamen ambitione ad excelsa fastigia euadit. Ligneæ in primis amat adminicula, quibus hederacea tenacitate adhæret, non quidem instar hederæ toto corpore, sed

vnis

vnis geniculis radicofum . Ex ijsdem folia fundie
 agrestis gelsimini folijs non abfimilia, fed produ-
 ctiora & per ambitum ferrata. Ramofi caulis defle-
 xa cacumina rotundorum calycum fufum verfum
 fpectantium denfis & fubrubentibus corymbis ra-
 cemata turgent; è quibus in gemini tranfuerfi digi-
 ti longitudinem adultis, punicique Cytini denticu-
 lata figura dehifcentibus tubuli leuiter crocei, fuma-
 ma parte conniuentes, porrectum circiter digitum
 longi procurrunt; hiulco deinde osculo in quinque
 labella refupinato, imo ventre fubftricto, medio tur-
 gidulo, ceruice anguftiore æftiuis menfibus efflore-
 fcunt; dilutifque crocis, necnon medio longiore al-
 bicante ftamine capillantur. Dum vernant, fatura-
 tiore fubinde phœniceo colore, villofum holoferi-
 cum referente, ac flauentibus longas in ftrias lineis
 diftincto expinguntur. Tabidi tandem florei tubuli
 defluunt, hærentibus cum extante medio ftamine
 calycibus. Barberinos recens in hortos translatus
 hic flos cæpit in femen filiuari. Ex arido calyce
 filiqua porrigitur in viridi fubrubens, in digitum
 longa, ima parte fummæque tenuis, media tur-
 gens, infra fupraque intercurrente prominulo toro
 bipartita, feminibus grauis, vt in luteo leucoio, mi-
 nutis, rufis, membranaceis. Quanquam hæc mem-
 branæ prætenuis inuolucro circunfepta, multi-
 plicique ferie prope innumerabilia circa nigrum &

molle dissepimentum, lingulae imaginē interie-
ctum, confertim conferteque constipantur.

Rosa



Rosarum nota.

CAPVT XIII.

Rosa ex alabastri concha emergens hortorum pudica Venus est; nec alterius Veneris impuro sanguine impudenter erubuit, suo decentius pudibunda. Eadem non aspersa nectare inter fabulosas Deorum epulas tripudiantis ad Amoris impulsu effuso, sed succo suo nectarea purpurauit. Quin potius toto vultu Amoris æmula, semper iuuenis, mollis, & recens, necnon aureis capillis nitida; folia pro alis, pro face fulgorem, spinas pro spiculis gestans, alter floridulus Amor est. Rosa punctiunculis vellit, ut cupere se legi præmoneat: amicè vulnerat, ut vulnusculis geminet rosas: spinam emoriens hæredem relinquit horridulam, aculeatum nempe desiderium sui. Rosa volumen amœnitatum omnium, in qua legitur tota in florem contracta formositas, tam decoro suomet nomine inscribitur, ut inscriptis aliena Regum nomina floribus florum Regina non inuideat; imò suum commodet nomen rebus blandissimè nominandis. Rosa, ingenuus anni tenerioris pudor, odoratum veris blandientis osculum, terræ comantis pulcherrimus cinnus, fugacis pulchritudinis lætum fulgur, quamuis plurima spina fulmineum,

Rosa laus.

*Theophrast. de
hist. plant. l. 6.
c. 6.*

Plin. l. 21. c. 4.

*Rosa alba,
multiplex.*

*R. Dod. Strep.
Hist. Pempt. 2.
l. 1. c. 28.*

*Ro. Bapt. Porta
Villa l. 9. c. 5.*

*Albicans flo-
re pleno.*

*Damascena
multiplex.*

*Mettbiol. in
Disco. l. 1. c.
115.*

*Subrubēs flo-
re multiplici.*

*R. Dodon. ibid.
Ro. Bapt. Porta
ibidem.*

mineum, vultu multiplici variat, in quolibet for-
mosa. Quicunque autem rosarum differentias à
nocentibus indicijs innoxius prædiuinare vult;
spinas oculis, non manibus consulat. Odoratior
scabro cortice præsentiat, halitu crassiore atque
terreno in extimam scabritiem concrecente, te-
nui verò igneoque odoratam animam inspirante.
Rosa alba multiplex; nempe erudito scriptorum
diffidio siue Plinij Spineola, siue Campana, siue
Alabandica, lacteo flore splendescens virgas ex-
erit exuberante colore virides, proceras, spineis ha-
mis aduncis, grandibus, frequentibus, subruben-
te liuore vulnera & sanguinem sitientibus captio-
sas. Non absimilis obsoleto albore languide ru-
bens, dubioque rubore albicans, folioso flore
rosa præacutis recuruatique sentibus, quasi ca-
ninis dentibus, mordacissima est. Odoratæ pal-
lidæque pleno flore Damascenæ rosæ, quam Plin-
ij Coroneolam alij, alij spineolam interpretan-
tur, è viridi purpurascentem caudicem, ramo-
saque inde siluula diffusas saturo colore virentes
virgas obarmant spinæ admodum infrequentes,
breues, duræ; rubidæ, lata è basi recuruos in acu-
leos vncinatæ. Vulgari satiuæ densis folijs leuiter
ex albo rubescenti, quam aut Plinianam Alaban-
dicam, aut Trachiniam esse scriptores sanè nobi-
les autumant, virgei rami breuiores, graciliores,
subuirides, minorum grandiorumque spinarum
pro-

promiscuè crebris , languido pallore liuidis , in-
 tentisque mucronibus minaces . Quæ variè dilufo
 foliosi floris rubore maculosa , Prænestina dicitur ,
 asperitate pariter aculeata inhorrescit . Italica flo-
 re suauiter rubente perpetua , proximè superioribus
 duabus persimilis , densioribus sœuit aculeis . Bata-
 ua flore oris humani rubicundam temperiem imi-
 tante atque odorato Centifolia fruticem quâ be-
 ne virentem , quâ ex viridi rubescentem spinis
 asperat quamuis aduncis , tamen mollioribus , non
 ita crebris , è cineracea basi rufum in aculeum de-
 sinentibus . Flore ardentius rubente , odore nullo
 probabilis , vno gloriosa nomine altera Centifolia ,
 quam Plinius Campanam , Prænestinam Clusius
 appellat , viridi , graciliore , improcero , nullisque
 ferè spinis metuendo frutice funditur . Cinnamo-
 minæ flore multiplici subrubentis frequentes , bre-
 ues , exiles , sanguinea purpura nitidi caules spinis
 non admodum densis , exiguis , hamatis , leuiter
 fuluis leniter pungunt . Gemellas pleno flore ro-
 sas , nempe tum ardentissimè rubentem MileSIam ,
 tum ex rubro nigricantem , cui fecit holosericæ no-
 men serico simillima , & veluti villosa mollities ,
 tenues , teretes , fusca viriditate illitæ , atque ex par-
 te subrubicundæ , minutis & ferè aspectum fugien-
 tibus aculeis innocenter hispidæ virgæ proferunt .
 Miror hîc , postremam ex rubore in atrorem incli-
 natam Plinij Trachiniam vocari à Camerario ;

Variegata flo-
 re pleno .

R. Dodon. ibid.

Italica flore
 pleno perpe-
 tua .

Batava centi-
 folia .

Centifolia
 inodora .

Plin. l. 21 c. 4.
 Io. B. opt. Porta
 ibidem .

C. Clus. Rerum
 plant. Hist. l. 1.
 c. 81.
 Cinnamomi-
 na pleno flo-
 re .

Rubra flore
 pleno .

Ex rubro ni-
 gricâs dupli-
 cato flore .

Iuxta multi-
plex.

cum Trachiniam idem Plinius Mileſia minus aſſe-
rat rubere, nigricans verò longè ſuperet purpura
coloratione Mileſiam. Folioſo auro flaua ſiue lu-
tea, iucundi aſpectus, ignauique odoris roſa ruſi
fruticis virgeos caules numeroſiore pertinacium
ſpinarum agmine inſtruit, quarum pleræque lu-
teolæ ſpiculis vellicant minutiffimis, perraræ paulò
grandiores, ſubnigro pallore cinereæ, recuruæ,
identidem etiam binæ; iunctimque prominulæ
altiùs lacerant.

Florentium arbuſcularum notæ.

CAPVT XIV.

Arbor Perſi-
ca flore mul-
tiplici.

Florentium arbuſcularum adhuc infrequen-
tes noſtrates horti perpauca nobilioresque
mihi ſuppeditant commonſtrandas. Ar-
bor Perſica flore multiplici nobilis ligno extra-
cinereo, intus flauente, mediocriter læui, folijs
oblongis ſerratisque non diſcrepat a vulgari. Flo-
res tepore verno euocati, roſeo pudore ſubrubi-
cundi, leuiter odorati, folioſo textu Damascenæ
roſæ pares ſpiſſo arctoque congeſtu ramulis ad-
hæreſcunt; rari autem in fructum exeunt, ma-
gna virium parte vernam in oſtentationem effu-
la. Eſt etiam Ceraſus, quam cæteris partibus,
ideſt obſcurè puniceo, & circularim albicante
cortice, crenatis etiam mucronatisque folijs in-
diſcre-

Ceraſus flore
multiplici.

discretam pleniorum tantummodo florum gloria
discriminat. Flores è plerisque ramorum oculis mi-
nimùm terni, foliosi, medijs sæpe foliolis conuolu-
tis ex parte conniuentes, de more candidi, longulis
petiolis appensi numeroſo prouentu pendent. Flo-
re albo Geniſta, ſiue tertium Cluſij Spartum Hispa-
num iuſta proceritate arboreſcit: lignoſas & arbo-
reas radices agit: cineraceo caudice aſurgit: nu-
merosos implexosque ramos viridi pallore tingit:
ex iſdem virgulas more paſſi diſſipatique capilla-
menti demittit denſiſſimas, prætenues, ferè cu-
bitales, ramuloſas, lentas, inſtar viminis obſe-
quibiles, ocellisque diſtinctas creberrimis; vnde
folia rutæ foliolis minutiora, floſculique imo tan-
tùm nodulo rubentes, cætera candidi exiſtunt;
pulchrè pendulis floridis virgulis, tanquam lineis
margaritarum: vere toto vernat: exinde cartilagi-
neas, prope rotundas, ex viridi flauelcentes ſili-
quas ſeminibus implet ſingulis, rarò binis, ferme
orbiculatis, colore fuſco virentibus, læuibus, duris,
germinare moroſis. Myrtus pleno flore latifolia,
in arbuſculam commodæ ſtaturæ adoleſcit: myr-
tum ſilueſtrem foliorum infrequentia, latitudine,
dilutaque viriditate ſimulat: florum autem can-
dore ambituque Bellidem adæquat: ab Aprili
menſe ad hiemem uſque, nonnunquam etiam re-
pidioribus hibernis menſibus floret, ac triſte ſe-
nium anni genialiter coronat. Suam quoque
myrto

Geniſta flo-
re albo.
C. Cluſ. R. arbor.
plant. Hiſp. l. 1.
c. 70.

Myrtus lati-
folia flore
pleno.

Laurus Indi-
ca.

Oleaster
exoticus.

Sambucus
roica.

myrto lectissimæ India Laurum adiungit, quæ iure Farnesia primùm exiit in domo, quippe inusitata laureas promerita. Discrimen est in dilutæ hilarisque viriditatis cortice; in folijs inter vulgarem ac regiam laurum interiectis medijsque, ac ferè citrinis; in flosculis subalbidis, tereti congerie racematis; in baccis instar oleæ grandioribus minusque nigrantibus. Exotici oleastri, quem ab odoris suauitate Paradisi arborem aliqui malunt appellare, cortex saturato rubore nigricat: rami dilutiores atque spiniferi densa fruticatione siluescunt: folia vere primo renascentia, extremo autumno decidua, angusta, oblonga, glauca, lanuginosa, tactuque mollia siluestrem Salicem referunt: flores totis ramis Maio mense quâ separatim, quâ coniunctim internascentes, Hispani hyacinthi aspectu perbreues, ex obsoleto virore in luteum colorem inclinantes diductis labellis aromaticum halitum procul inhalant: baccæ subeunt oleæ satiuæ baccis minores, tenuique cute rubentes. Ex arbusculis vulgationibus rosea Sambucus globoso speciosoque flore persuadet, vt rariores inter arbusculas numeretur. Fruticosa nascitur: cinereo corticis colore sordet: candidæ multum medullæ includit: folia explicat angulosa, vitiginis consimilia, sed minora & molliora: quin folijs flosculos complures, eleganter albidos, inodores, steriles, in globosum florem floremue globum

bum culturæ (vt creditur) mangonio densatos, ex-
 tremo vere colligit . Multiplici punicantem Ba- Malus Punica
 laustio siluestrem arbusculam libro materiaque fla- siluestris ple-
 uentibus , folijs angustis nixideque viridibus Pu- no flore.
 nicæ mali gemellam infructuosam ipsa sterilitas vo-
 luptati oculorum a Maio mense ad Augustum,
 usque fertilis hortorum amœna sede donauit . Hoc Rhus pere-
 primùm anno Romæ vernauit peregrina Græci grina.
 nominis Rhus , siue Arabicæ appellationis Su-
 machus Indorum , excelsa floridæ purpuræ osten-
 tatione arborefcens . Ante quatuor annos fe-
 rè bipalmis ad Tranquillum Romaulum Parisijs Tranquillus
 missa hæc planta in quindecim palmos adole- Romaulus.
 uit . Radices illi copiosæ , spissæ , minutæ , sub-
 rusæ . Recenti germinatione impulsæ virgæ
 breui pilo hirsutæ rufescunt , solæque fron-
 dent . Annuo spatio iam exacto atas robustior li-
 gneam duritiem , raripilum læuorem , foliaceum
 defluuium , palloremque cinereum inducit . Sor-
 bum è foliorum oblonga figura , ferratoque ambi-
 tu conijceres ; nisi horum longitudo maior obsta-
 ret . Eadem folia læto virore saturata prolixis ,
 modicè pilosis , perque ramorum latera alternatis
 ramulis siue pediculis gemello vtrinque ortu pin-
 narum aspectu cohærent . Floribus tempestiuus
 est Maius extremus . Suum quisque initio summus
 ramus rudem viridemque turgēt in racemum , qui
 cum incremento paulatim formam ruboremque
 trahit .

trahit. Etenim flos in vulgaris amaranthi spicam exacuitur, atque in villosam purpuram accenditur, medijs granis pulchrè flauentibus. Vt idem videri possit, fertili vernans miraculo, spicilegium simul & racemationem facere; seu verna facie geminam æstatis autumnique annonam præferre. Et lignum & folium ficulneo lacte, quo nutriantur, abundant: assiduoque dum lactatu viuunt, etiam, vbi consenuerunt, in infantia sunt. Quare cautio est, ne stato anni tempore vberime lactescentis in teneram germinationem arboris rami vel amputentur, vel auellantur: quia, ex facili fieret, vt alter hic sine fabula Polydorus, si non sanguineam, certè lacteam ex vulnere animam funderet; profusoque vitali succo præmoriens vitam sibi natiuo nomine fluxiorem esse conquereretur. Extremi autumnus primus rigor decussis folijs ramulos relinquit inuestes; quos etiam adultiora paulò post frigora deiiciunt, quæ parte extuberantem ramorum oculum, tanquam altricem papillam excipiunt, modicè cauos. Ab exitu Nouembris ad veris initium crebris oculis distincti pilosique rami silent. Verno tandem tepore à frigido sterilique veterno excitata virgarum cacumina & capita summum folioso rubentique germine turgidulum oculum aperiunt. Inde ramusculi sensim existunt & adulescunt, æquali, quam supra descripsi, serie foliati. Illud etiam inter-

interdum euenit, vt è duro nonnulla vegetior
 gemma trudatur, & materiæ anilitas raro germi-
 natu lasciuiat. Posteritati consulit hæc arbor mo-
 re lauri, è radicibus latè dispersis hærede submis-
 so. Eadem Indicæ Acaciæ Farnesianis in hortis Acacia Indi-
ca.
 primùm visæ magnitudo, quæ nuci Auellanæ: ra-
 dix vnica, prælonga, crassa, radiculis pluribus ra-
 mosa, in rectum altè descendenis, per autumnum,
 dum flores lactat, succosior, ab incisione atque
 fractura contusam putremue brassicam validè lon-
 geque olens: caudex cortice pallido, materia al-
 bicante, dura, inodora, insulsa: rami proce-
 ri, frangi contumaces, flexiles, alterno aduer-
 soque situ articulati, binis ad ipsos articulos albi-
 dis, ferè vncialibus, perennibusque aculeis quo-
 dammodo cornigeri, diluto colore ferruginei, &
 punctim maculosi: folia bellè virentia & pinna-
 ta, idest composita è foliolis inter se aduersis,
 per æquales numero pediculos medio ramu-
 lo adnatos distributis, mane sese pendentibus,
 sub vesperam contrahentibus: flores inter aculeos,
 interque foliorum alas tum verni, tum autumnal-
 es; illi parcius, hi vberius prouenientes; illi bre-
 uissimo, hi longulo pediculo porrecti; vtrique
 verò mediocris cerasi magnitudine globosi, primò
 virentes, deinde lutei, post biduum triduumue
 pallidi, tenuissimorum staminum in luteos apices
 deficientium eminentibus flocculis ex oblongis ca-
 lyculis

Molle.
C. Claf. Exot.
L. 10. r. 24.

L. 3. r. 10. & L. 4. r. 6.

lyculis compluribus in orbem digestis lanuginosi ,
& acuto luteum Leucoium odore vibrantes : è flo-
ribus medijs filiquæ modò singulæ , modò binæ ,
modò ternæ , atque adeo denæ pluresue , vtpote à
numerofis calyculis exortæ , initio virides , postre-
mò nigrantes , falcata , longitudine digitales , la-
titudine ferè pollicares , ab inclusis feminibus ver-
rucosa : ipsa verò semina cum filiquis primùm vi-
rentia , deinde ferruginea , inordinata , compres-
sa , oblonga , pisum æquantia , bifida , durissima ,
mandentibus allium olentia. Molle nominant Indi
arborem è Peruanis conuallibus ad nos inuectam .
Ea cortice est exalbido , scabro , candidam refinam
oculorum caligini discutiendæ medicatam exudan-
te : ramis prolixis , læuibus , lentis , atque in terram
procliuibis : folijs more lentisci velut in alas expli-
catis , nonnihil flaccidis , longo pediculo vtrinque
cohærentibus , minimè ferratis , asperrimum piperis
odorem saporemque præstantibus , ab auulsione la-
cteo succo , eoque lento , glutinoso , odoratoque ma-
nantibus : floribus minutissimis , candidis , rubellos
crocos includentibus , palmari racemo pendulis , ab
Augusto mense ad Octobrem vernantibus , dein-
de in semen abeuntibus albi piperis aspectu rotun-
dum , læue , subrubente pellicula inuolutum , race-
mosa congerie cohærens , sapore acerrimum . Sa-
tis iam multa de præcipuis arbusculis : exoticas alias
nonnullas locus duplex opportunior exhibebit .

F L O -

FLORVM SATVS ET EDVCATIO LIBER TERTIVS.



Lex floris ferendi.

CAPVT I.



Egiferæ Floræ oraculo similis, ^{Quo pacto præformandi horti papyracei, in istisq. semina disponenda.} & perplexa lex est: Quicumque rite serere vis, prius papyrum, quàm solum conferito. Hunc ego nodum Gordiano sanè impeditiorem Magno faciliùs Alexandro sine ferro sic expedio.

Antequam hortum conferas, eiusdem linearum picturam quàm breuissima poteris in papyro graphicè deformato: areolam vnāquāque varia numerorum nota distinguito: graphidem hanc in geminas pagellas plicatilem scriptoriæ thecæ, vt diutius maneat, agglutinato: memorialem præterea libellum ad graphidis commensum compingito: in eandem thecam includito: in eo libello ad pagellarum margines areolis ipsis inscriptas notas ordine describito: post singulos nu-

O 2

meros,

meros, puluinorum indices, destinatarum adijcito nomina radicum, quæ tum in bulbos, tum in tubera conglobatæ potissimum feruntur; quæque hortensium deliciarum præcipua semina sunt: ut varias cuiusque puluini radices breuiter & clarè annotes, lineatas areolas, quo quæque loco diuersis conferi radicibus debent, litterulis, vel quo alio arbitrario signo insignito: eadem signa areolarum, ad quas pertinent, numeris libello adscriptis subijcito: è regione atque ad lineam florum nomina in album referto. Quod si laxioris horti tota descriptio in geminas contrahi paginas non possit; in plures membratim partiteque ita colligatur, ut medijs duabus ipsi thecæ conglutinatæ, quæ vtrinque excedunt, plicatili compendio intra eandem thecam includantur. Verum, ut præuia hæc papyracea consitura quàm consultissima sit, florum patriam indolemque prænosco. Debet enim accuratus callere sator, ex quo natali loco, è calido ne an frigido, ex humido an sicco, è pingui an ieiuno, ex aprico an opaco vnumquodque florum genus in exteras oras propagatum sit; ut suis quæque locis queat florem prudenter atque feliciter destinare. Ad hæc floriferarum radicum, suas in classes tributarum numerum inito: ne is excidat, annotato: quot quisque puluinus radices quaternorum inter se digitorum interuallo, aut rariùs differendas capiat, computato: puluinis ita radi-

Florū patria
prædiscenda.

Numerus re-
censendus.

radices destinato, vt, quæ præcocem, quæ tempesti-
uum, quæque serotinum florem ferant, singuli contineant; totoque ferme anno vernantes simul pubescant, simulque consenescant. Ea præterea in florifero statu diligenter curato, vt radices permisceas, quarum vna ab alia, cum eruetur, facile discernatur, cuiusmodi sunt hyacinthinæ ac narcissinæ: vt cuiusque generis radices certis pro arcæ figura locis collocatæ artificioso florum colorumque in aduersis transuersisque puluinis responso oculos delectent: vt è pluribus vnum florum genus unicuique puluino copiosius assignes, quod, velut unicolor vestis, variorum flosculorum, discoloribus gemmis distinguatur: vt ordinatæ denique colorum confusio aut versicoloris texture aulæum, aut acu pictum variatumque phrygium opus æmuletur. Scio complures esse, nec ipse paucos noui nobiles colonos, colendi floris callidos & solertes, quorum alij differunt in areas sui cuiusque generis res; alij verò tam multa tam varia inter se confundunt, vt in singulis puluinis ex vnoquoque genere vix florum vni aut alteri locus sit. Equidem, vt omnes vnice amo, sic ab vtrisque amicè dissentio: quòd illorum arcæ unico rerum genere consistat, floribus per temporum statas vices deflorescentibus, sparsim nudæ turpiter caluescant; horum verò valde miscellus & quasi confusaneus hortus colorum obruat grata discrimina,

Mista facio vt
facienda.

mina, discretamque radicum inuentionem impediat. Quare consultior mihi Apollo, siue sanior sententia non aurem, sed animum vellit; atque non Phaëtoni solum in cælo percurrento, sed mihi quoque in hortulo conferendo fugienda esserum extrema sic admonet, Inter vtrunque tene: medio tutissimus ibis. Mirandum igitur non est, & præferri à me, & præcipi mediocrem florum in satione misturam. Non diffiteor mitissimos etiam hortorum ciues, ac meram suauitatem, flores ciuilibus inter se odijs adeo posse diffidere, vt, si promiscui serantur, inimica vicinitate cominus pugnantes vel sese mutuò interimant, vel in sterilitatem effascinent. Verùm adhuc tam graues inimicitiae compertæ mihi non sunt, vt versicolor societas inamœno diuortio mutanda videatur. Vnus Tranquilli Romauli, erudito florum cultu florentissimi viri, consilio ab anemona ranunculus distineri debet: assitus enim eam perurit & emaciat. Ad hæc non forensis modò, sed hortensis quoque negotij peritissimus, cultissima indole ciuis meus, Polydorus Neruccius diuturno sibi experimento deprehensum affirmat, quæ florem fundunt radice maiorem, distinctè, quàm permistè positas plantas feliciùs prouenire. Hoc igitur authore ranunculos, iunceo folio Hispanos narcissos, tulipas, aliosque huius notæ flores separatim; cæteros eo, quem præscripsi, coniunctim ordine


Tranquillus
Romaulus.
Ranunculus
ab anemona
distinendus.

Polydor' Neruccius.
Qui flores se-
orsum, qui
permistè se-
rendi.

ordine collocabis . Illa quoque speciosè nostros <sup>Ducis Caëta-
ni consilio .</sup> distinguet hortos ingeniosa permistio , quam in-
suis adhibet Cisternanis Franciscus Caëtanus Ser-
monietæ Dux , tam hominum , quàm florum
temperator amœnissimus . Is ergo areolas ple-
rasque floribus triplici dupliciue tum genere ,
tum colore discretis seorsum , hoc est triparti-
tò bipartitòue ita conferit , vt aduersæ transuer-
sæque vel eadem , vel simili varietate respon-
deant ; vtque proximæ diuersarum satum colorum
discriminentur . Si qua verò commodè vacent
interiecta spatia , ea tuberoso Indiæ candido hya-
cintho confitis depressisque fictilibus media im-
plet , miscellaneo pulchrè eminentis coloris flo-
re per angulos distributo . Quin etiam per oppor-
tuno inuento ad colores eleganter distribuendos
in hortorum graphide vnamquaque areolam
tripartitam bipartitamue eo triplici seu duplici
colore distinguit , cuius coloris floribus eadem
in hortis ipsis obserenda est : in areolis quoque
flores genere diuersos depacti laterculi crebro in-
terpositu seiungit . Verùm vt florei satus opti-
ma ratio non aures modò tradita , sed oculos etiam
perspecta erudiat ; eorum hìc hortorum , quos
idem Caëtanus Dux ad veteres Tres Tabernas ,
siue ad Cisternæ recens oppidum amplissimos
excitauit , quarta pars in paginæ angustias contra-

cta, & areolis prædicta partitione distinctis notabilis exhibetur . Nequid autem Cisternanae amœnitatis in eadem pagina desideretur , extimæ etiam apponuntur bāses, sustinendis vasis floralibus certa per intervalla collocatæ .

HORTI CISTERNANI QVADRANS



10 20 30 40 50



Ducis eiusdem geniali stratagemate bellica munimenta floribus occupantur, feliciterque seruit Bellona Floræ; hoc est, arces in hortos mutantur. Earum enim ichnographia primùm delineatur, deinde partes singulæ in vnam pluresue arcolas deformantur; in quibus distinctè vel permistè sati flores velut eminus aut cominus de formæ principatu innoxia & voluptaria bella committant. Vbi papyrus, vt monui, florea partitione graphicè conserueris, tum demum ad hortensem constitutionem tempestiuus accedito. Septembri mense ab ipso æquinoctio, aut ex aliorum sententia cultorum Octobri serito. Etenim experientissimæ antiquitatis vox est: Ante calendas Octobris serere non expedit. Quòd si eandem antiquitatem audias, cum obitum Vergiliarum, tum in primis Coronæ ortum & occasum obseruabis: quia, quæ intra hos dies posita sunt semina, felicissimè provenire dicuntur. Quin etiam ex accurata observatione subijcit Democritus, præcipuè circa eiusdem Coronæ occasum non modò largos imbres effundi, verùm etiam veluti genitalis anni hora stimulatam gestire terram ad satus audissimè accipiendos, partusque ipsos insigni fertilitate fundendos. Oritur hac ætate, in hoc Romano cælo Septentrionalis Corona quarto Calendas Nouembris, cum Solis in ortum regressi digressique lumine ultra non hebetata, matutino in exortu antelu-

Serendi tempus.

Const. Paganus, de agricul. l. 3. c. 13. Virg. Geor. 1. pl. l. 18. c. 24.

Apud Const. Pagan. l. 2. c. 12.

Colum. l. 11.

c. 2.

Plin. l. 18. c. 24.

Colum. l. 11. c. 1

Theophrast. De

caus. plant. l. 3.

c. 37.

Cato De re ru-

stic. c. 34.

telucana incipit affulgere. Eadem cum occidente sole occidit septimo Idus Decembris. Ad properandos alij satus veteri agricolarum prouerbio illo incitantur : Properata satio solet saepe decipere, sera semper. Alij verò properationem istam rati temerariam, vt incertas futuri temporis vices declinent, consitionem totam in tria quatuorue tempora partiuntur: vtque consilium ipsi quoque suum antiquitatis autoritate suffulciant, decantato veteris agriculturæ oraculo, Serere ne dubita, suaderi sibi satiuam hanc partitionem interpretantur. Equidem cum grauissimis quæ Græcis, quæ Latinis rusticæ rei magistris censeo, pro vario regionum positu ferendi tempora esse varianda: vbi quisque natura locus frigidissimus aquosissimusque crit, ibi primùm, nempe ante autumnale æquinoctium, siue etiam ab eodem æquinoctio ferendum esse; tunc enim is calidior & siccior est: vbi quisque calidissimus & maximè siticulosus, ibi postremùm, siue post ipsum solstitium semen tem fieri oportere; quòd is, quò largiores pluuias hauserit, eò vernabit vberior. Temperato denique solo conferendo mediam autumni temperiem, vti præmonui, conuenire. Illud quoque tradendum hic habeo, tempestiuè commodeque hortos obferi, postquam æstiuo igneam æstu terram largus ac ter saltē effusus imber ad palmum infuso humore refrigerauerit. Quippe leuis plu-
uia,

uia, cum post longos æstus ac diuturnas siccitates
superiorem terræ partem madefaciat, inferiorem
verò non attingat, terram ipsam adhuc æstuan-
tem vehementius aduersum positas radices succen-
dit. Neque tamen, simul ac magnis imbribus ter-
ra permaduit, feres: sed tantisper expectabis, dum
pluuus ille mador modicè siccetur; ne madente
limosoque in solo statutz radices exputrescant.
Quid, si (quod euenire non rarò solet) serenus
imbrem sitiat autumnus? Non erit, cur ipse hor-
tuli tui priuatus Iuppiter fictili vel cupreo nimbo
fontanam pluuiam areis affundas: quia cælesti Li-
bra examinatz æquatzque diebus, aut mox pro-
ductiores noctes humifica vmbra diurnam satis
emollient siccitatem. Huc adde, sicco solo com-
missas, tanquam domi reconditas, radices non cor-
rumpi, sed sub natali terræ tecto commodè habi-
tare ac protegi, donec emollito pluuijs exitu altis
nixæ fibris suo quæque tempore in floream sil-
uam feliciter egerminent. Quid, si ipsa constitu-
tæ tempestiuitas ab imbribus intempestiua &
naufra radicibus sit? Erit, cur sationem pru-
denter procrastines, donec humus nimis humida
ferefcatur. Illud quoque inuiolatè custodies, vt au-
strinis tepidisque diebus hortos conseras; quia te-
por laxato è terræ sinu fertiles ad semina vapores
euocat, fibrasque citat: aquilonijs verò & perfri-
gidis sationi parcas; quia frigore astricta humus

ægrè

*Consiant. Po-
gonat. l. 2. c. 12
Pallad. l. 1. ait.*

6.

Luna obser-
uanda.
A^{quid} Plutarch.
in Camillo.

ægrè satus accipit, interclusoque materno halitu languidè fouet. Cæterùm satori potissimæ curæ sit, vt lunares vices viresque prædīcat, ac felices operi dies eligat. Neque enim eum Heracliti discipulum placet esse aduersùs Hesiodum sentientis; vnā eandemque dierum omnium esse naturam; sed ipsius Hesiodi auditorem volo disertè docentis, dierum aliam quidem esse matrem, aliam verò nouercam. Luna enim, inter sidera Vertumnus, inæquali vultu subditos hominum labores non æqua semper aspicit & iuuat. Idcirco sunt è Græcis agrestis rei scriptoribus, qui serendum putent crescente Luna, à quarta scilicet vsque ad plenam, dum eadem infra terram est. Sunt etiam, qui doceant per Lunæ senium, quàm per adolescentiam, præstare hortos conferi: quia, cum senescentis lunaris luminis languidior calor humorque, gemina nempe generandarum rerum initia, terræ seminumque tenuissimos meatus, quos poros vocant, lentius relaxent ad germina; cumque naturalem plantarum calorem humoremque parciùs augeant, atque inanem foliorum luxuriem retardent; prior impetus genitalis in altissimas firmissimasque fibras abit, quarum numeroso largoque succu ad floridam quæque radix alitur feracitatem. Verùm enimvero experientissimos colonos diuturna secus docuit experientia. Hi tandem felici periculo didicere cum augescente Luna, tum præcipuè præeun-

te & conſequentē plenilunium quatrīduo vtiliùs deponi radices, quæ deinde in flores denſitate, amplitudine, numēroque præſtabiles exeant; floridæque præſtantiæ magno ſcœnore cultores abundè remunerentur. Per id enim tempus lunaris potestas caloris humorisquæ fœcundiffima, luce auctior & potentior innatam radicibus calidam humidamque vim ſic exauget & fœcundat; vt eadē & fibris diffundendis, & implendis, amplificandis, multiplicandisque floribus abundè generosæ & succosæ ſint. Hæc ergo huiusce ſententiæ ſumma eſto: Florum ſationi Lunam adoleſcentem, & globosam eligito: ſenio corniculatam (cornu ferit illa) caueto. Aliorum & quidem nobilium cultorum nonnihil diſſidens vſus ita monet: Radices & bulbos creſcente Luna, ſemina verò minuerite deponito. Neque tamen vna ſatis eſt curioſis cultoribus citimi ſideris notatio. Etenim penetrales quoque cæli fulgores florum genitura propitios coniunctim obſeruant. Hinc Accius in Praxidico (vt ex Plinio accepimus) ſerendum ait, cum Luna eſt in Ariete, Geminis, Leone, Libra, Natural. hiſt. l. 18. c. 24. Aquario. Cum eadem commoratur in Tauro, Scorpij partes duodenas Sole tranſgreſſo, tempeſtiuè ſeri exiſtimat Zoroaſtres. Vnum ego aliquem noſtra ætate noui domi foriſque prudentiſſimum virum, qui conſimili cæli obſeruatione feliciffimè ſerit. Non enim vnicum lunare lumen, ſed orbis quoque

quoque signiferi, quem Lunæ menstrua volubilitas totum permeat, sationi commoda aut certe non incommoda signa obseruat. Prospera comperit Pisces, Arietem, Taurum, Virginem, & Libram, ea ferè nimirum, quæ cum verno atque autumnali Sole coniuncta sementinam tempestiuitatem afferunt. Vnam Geminorum extremam partem inimicam expertus est; reliqua media atque indifferentia. Animaduertit præterea ex prædictis signis ea sationi feliciora esse, cum quibus Luna crescens aut plena concreditur; horum verò aliqua in Lunæ auctum semper incidere, cum partim verna, partim autumnalia, idest aduersa inter se sint. Igitur cum augescens Luna feliciū signorum cuicunque subijcitur, ille semine ferit; cum Taurum eadem aut Virginem subit, radicū bulborumque tempestiuam iustamque sementem facit. Quanquam autem istum crescente Luna ferendi morem potissimum ducit; eadem tamen sub auxiliaribus aut saltem indifferentibus signis decrescēte, rectam sementem fieri posse affirmat. Quare si laxior hortus diuturniorem sationem exiget, quàm quæ intra lunaris adolescentiæ curriculum perfici possit; nobiliora semina adolescente, vulgaria senescente, fidere deponentur. Quærenti demum vtra sit satio commodior, an quæ crescente Luna sub indifferentibus signis, an quæ decrescēte sub propitijs sit, secundam vtiliorem esse respondet. Ut
autem

autem Lunæ cum sideribus cæteris statas congregaciones exploret; mathematicæ perspicacitatis cælestes ephemeridas consulit, aut Christophorum Clauium, ad inueniendos Christianos fastos cæli numeros, ordinatosque lunares errores computantem legit. Lubet hic (ne quid indictum præteream, quod expedire floriferæ sationi videatur) alias in obserendis hortis nonnihil diuersas cæli notationes attexere. Qui tantidem facit flosculi satum, quanti principis viri genitura fieri solet, vt felicissimum horoscopus minutius & scrupulosius inspicendum putet; is vnumquenque morem periclitetur, optimum persequatur. Sunt igitur, quibus authoribus ferere atque plantare oportet à quarta ante plenilunium die ad vigesimam vsque Lunam, præcipuè verò cum orbe prope iam pleno Luna supra terram est. Etenim per eos dies sidus tum incitatum tum lumine auctum obruta semina feliciter euocat & fouet. Seruandum præterea est, vt nocentissimus Martis fulgor infra terram sit: vt ex errantibus beneficæ stellæ, Iouis præsertim & Veneris, supra terram extent, Lunamque ipsam felici positu aspiciant. Proderit quoque stellæ Saturni amicus aspectus: nam præest ea plantis, atque à corruptione & vermiculatione semina tutatur. Sit denique Lunæ stella in eorum aliquo signorum, quæ Terrea nuncupantur ab astrologis, in Tauro scilicet, in Virgine, in Capricorno. Quanquam,

*Comput. Eccle.
sist. c. 12. et
13.*

P.

Tau-

Taurus duobus reliquis minùs creditur salutaris: quòd fixa stabiliq̃ue efficacitate posita semina rarefacit. Quare sub illo copiosa sementis facienda est, vt modicè metas. Fortunata demum habentur & Piscium totum signum, & postrema Sagittarij dimidia pars. Nonnulli laudant consitos hortos Luna obeunte Arietem ab eiusdem Arietis parte decima tertia vsque ad vigesimam sextam, Taurum ab octaua ad vigesimam primam, Cancrum à sexta & vigesima vsque ad Virginis decimam, septimam, Scorpionum à nona ad quartam vsque Sagittarij. Infelices hortorum consitiones fiunt silente Luna, vel eadem & Sole deficiente: item cum Luna erraticis à stellis aut retrogradis aut noxijs; priuatimque à stella Martis aspicitur; siue cum ipsæ noxiæ stellæ supra terram agunt. Alij denique vetant deponi semina, cum Luna est in Cancro à parte prima vsque ad tertiam decimam, in Virgine à decima septima ad vltimam, in Libra à tertiadecima ad sextam & vigesimam, in Capricorno à vigesima sexta vsque ad extremam, in Aquario à prima ad vigesimam secundam. Vsque adeo Genethliaci cum stellis errantibus discordi sententiarum vertigine aberrant. Vt, qui in flosculorum natalitia sorte è cælo ducenda opinionum caligine cæcutiunt, quantum in hominum libera conditione stellarum habenis frænanda hallucinentur, iudicemus. In tam dubia

bia fallacique longissimè affulgentium siderum. Floræ Lunam
consultentis
fabula.
luce caligantibus incertisque cultorum sententijs,
decreuit olim Flora prudenter maximam rerum
terrenarum arbitram & præsidem, Lunam adire
atque consulere; vt multa nocte nigrantem, nem-
pe ambiguan, necdum satis perspectam explora-
tamque veritatem in lunari lumine intueretur, op-
timumque tempestiui satus consilium deligeret.
Vno igitur Achate Zephyro, ardui laborem itine-
ris euentilante, florumque omnium tributarias de-
licias in cistellam bellè congestas præferente, imis
raptim è terris gradum facit ad cælum. Quà pro-
pero gressu anhelat cor, afflatur ver: quàm solum
premit pes, assurgit flos: pedis vestigium rosa est.
Iucundissimæ aduentu hospitæ ipsum didicit, ve-
luti lucis hortus, vernare cælum: latiore siquidem
lumine perfusa sidera floruerunt. Est in orbe
Reginæ noctilucæ via patentissima planæque re-
gia, signifero circulo subiecta, sed Solis itinere tum
in Aquilonem magis elata, tum in Austrum magis
deiecta, assiduique curulis cursus vestigio signata.
Hoc ingressa curriculum Flora Lunam habuit ob-
uiam in argenteo curru noctuabundam. Iam enim
Lunæ amica Nox, non sine Somnijs somnifica pa-
pauera spargentibus, citimo mundo incubabat.
Lunare vehiculum anteibat volaticus puer Hesper-
us, fronte splendida tenebrarum prænuntius: si-

quidem hæc cælestium flammæ extincta die,
interlucentium primam scintillam, Vesperum
nempe sidus præferebat. Currum trahebant sublu-
stri colore noctis albentes equi, volucris celeritate in
Olympico stadio victores. Adductis habenis rapi-
dissimam frænauit, Hespero etiam adnitente, inci-
tationem Luna, substititque in occursum Floræ:
ac perhumaniter arridens, Quæ potuit, inquit,
adeo premens & cogens causa inueniri, tuos ut
hortos, Flora, pulcherrimorum florum multico-
lore luce stellatos nostro, quod minùs tibi renidet,
cælo mutare volueris? Tum Flora, Meorum te
florum altricem, meam te moderatricem colere
potior & suauior est mihi cura, quàm floreum ne-
gotium insistere. Utque tutelæ tuæ, quàm culturæ
meæ, plus tribuere flores intelligas; en ipsi te me-
cum tributarij conueniunt & venerantur. Debeo
inquit illa, plurimum humanitati tuæ, cuius be-
neficio flores in cælo colligo, vnoque meum fide-
re sublustrem orbem stellulis nouis hortensibus il-
lustro. Gratam equidem hortensi rei polliceor
operam opemque meam. Istam nunc enimvero,
subiecit Flora, è tua non modò luce, sed voce
quoque atque oraculo ut exorarem, arduum mihi
huc iter fuit. Magna inter mites florum cultores,
& quidem ad huc sub iudice, lis est, quo videlicet
mensè, quam enstrui cursus tui die, quo cætera-
rum

rum cum tua stellarum congressu florei satus faciendi sint. Tuum iam est, quæ hortis è cælo præes, iudicium ferre: meum erit, quæ hortensem disciplinam trado, cæleste decretum euulgare. Hic exporrectæ dexteræ indice digito duodena inter astra fulgentem Libram & Scorpionem demonstrans Luna, Ab adulto, inquit, ' Septembri diem ac noctem æquissimis lancibus librante ad extremum, vsque Octobrem stellati Scorpij splendido aculeo morientem hortos feliciter conferes. Mei sideris adhuc adolescentis felices numeros observabis; si cum totum, quod ab octava die ad quintamdecimam intercedit intervallum, tum præcipuè duodecimam diem hortenfi deliges consitutæ. Cæterorum minuta nimis, necdum satis comperta mortalibus siderum observatio spinosis in animo curis, quàm suauibus in hortulo floribus serendis utilior est. Astra reliqua remotiora, ut hortos vix aspiciunt, ita non magnopere curant. Meam ergo stellam unam, terris citimam, & familiarissimam, atque adeo rerum spiritum uniuersa potissimum germina animantem attendere satis habeto. Iamque vale: salutarem enim cursum diutius interstingere publica mundi cura non patitur. Floreo denique comineatu inque sinum congesto, perque curram disperso recreata, laxatis decoram in fugam habenis, velociore volucrum pennis curru volubiliter auolauit. Flora verò exoptati compos

*Plin. l. 2. c. 9.
¶ 99.*

oraculi felici comite Zephyro dilectos ad hortos
facile redux satiuam tempestiuitatem caelesti re-
sponso monstratam, prosperoque deinde pericu-
lo comprobata vniuersis cultoribus promulga-
uit .



per. BOTTICELLI L. 1810. 1810.

C. 1810. 1810. 1810.

p.

1810.

Antequam præmolito soli strato semina committas, veteres ipsis fibras (si quæ, cum effoderes, te fortè latuerint) eximito, aridas inutilesque membranas, seu potius exuias bulbis detrahito: at vero Tulipis intimam tunicam, aduersus cælo terraque inuecta incommoda tanquam præmunientem interulam, ne subducito. Iam verò floriferæ radices, formosæ prolis delicatæ matres, ne abortient, mollissimè cubent. Igitur duum palmarum egesto (si quod fortè in arcis obduruit) denso crudoque solo; eoque, quod subiacet, breui bipalio, aut maiore trulla cautè, ne tutelarium laterculorum compago luxetur, pastinato; olitoriam terram cribro rariore succretam ea, quam exigunt ponendæ radices, altitudine substernes: tum leui manus trullæue ductu exæquabis. Vt autem in solo æqualiter substrato certas radicibus sedes, ac debita interordinia describas; sulcos imprimes cancellatos vel arundine pressè applicata, vel certè resticula in amussis intentæ modum adducta remissaque: singulos deinde bulbos, & quidem generis omnes eiusedem, si separatim serere mauis, in quaque decusse collocabis. Sin autem cuiipiam, lubeat areas transalpino more quadrangulas de vnoquoque florum genere distinctè conferere; is ad radicum deponendarum æqualia interval-
la citiùs ac certiùs præfinienda Gallicam cratem singulis areolis æqualem, & aptam, adeoque
dupli-

Radices ve
purgandæ.Vt inhuman-
dæ.

Satoria crates duplex.

duplicem triplicemue adhibeat, quæ sic fieri consuevit. In triangulum dedolati è materia aduersùs cariam curuationemque firmissima, præsertim, ex abiete buxoque, asserculi ita consertè iunguntur; vt singulorum bini anguli porrigantur in latera, vnus verò angulus promineat, spatijs quadratis interuacantibus, quæ loci laxitatem cuique radici debitam relinquant. Decussata ista crates depressæ, quemadmodum docui, æquatæque terræ eo situ superponitur, vt plana pars supina sit, extante angulo deorsum versotum eatenus apprimitur, quoad sui vestigium sulcatim imprimat. Vbi sese cancellatim sulci decussant, radices locantur; humoque, sicut mox dicam, superinducta obruuntur. Alio clathratum hoc instrumentum artificio compingitur è quadrangulis asserculis, quorum singulæ decusses affixis ligneis bullis tumidæ modico pressu ordinata bulborum cubilia præformant. Hoc igitur ordine arborum symmetriam æmulati flores decoro vtilique quincunce, in quancunque partem spectaueris, recti sunt, ac terræ succum æqualiter trahunt. Caterùm si miscellaneus, qui variam, inæqualemque ferè postulat altitudinem, perplacet satius; duplicem habeo monstrare viam, longiorem alteram, alteram breuiorem, vtrunque verò cultorum vestigio & consuetudine satis tritam & celebrem. Vt priorem insistas; in solo itidem coæquato, & arundine seu resticula cancellatim

tim signato bulbosas priùs radices, quæ debent altius infodi, depones: tum iuxta depositos bulbos defixis ad lineam tesseris, quæ superiores radices ab inferioribus iusto distineant interuallo, æquè minuti soli tantum supersternes, quantum minùs altè ponendi bulbi postulabunt; idemque solum decussatis sulculis præsignabis, & similiter conferes. Pari ratione tertium solum, siue soli tabulatum minimo spatio à summis laterculis distitum impones, ubi anemonas & bulbulos minore mensura demergendos interfères. Vt autem altera expeditiore via utaris; ad prædictam mensuram bipalmem exinanitas areolas recenti cribrataque humo vsque eò replebis, dum eadem pariter æquata, cancellatimque distincta palmi dimidio à summo laterculorum ambitu subsidat. Postea radices, prout exigent, ita distribues, ut earum alias in præparata mediocris altitudinis planitie sistas; alias vel scrobiculis manu ante excavatis, vel digitis assiduo soli repulsu viam pendentibus deprimas; excitatis denique terræ cumulis alias exaltes. Vbi ad præscriptum, & rite seueris; consimili humo positas radices sic operies, ut hæc areolarum oras non adæquet modò, sed paulò etiam cumulatior media extumescat: tum quia medius tumor vndique deuexus, deriuato percolatoque ad extremas puluinorum quasi colliquias pluuiali humore, sicciores tutioresque a putredine sedem radicibus

bus nondum solo hærentibus præbet : tum quia leuiter superingesta humus suo ipsa paulatim pondere, caducoque imbre depressa summis areolarum marginibus cœquabitur . Quòd si magis in areis ab ipso statim satum inoffensa æquabilisque planities delectat ; debet aggerata supra lateritias areolarum tutelas terra lignea regula radioue præradi , atque , ubi defecerit, semel aut iterum lacuna suppleri. Debent etiam summæ laterculorum oræ, si quæ pulvisculo aspergantur, peniculo detergi; ne per imbrem lutescant. Illud hîc habeo præterea præmonendum, aduenas Indiæ bulbos, quorum non pauci narcissini generis sunt, nostris in hortis florem non edituros, nisi parum altè adobruantur . Etenim, antequam transuehantur ad nos, in Batauiæ Galliæque aquilonares oras translati altiùs infodiuntur, ut a penetrabili frigore vindicentur, illic verò, dum solis calorem quærunt , vim floris fertilem in productius collum exhauriunt. Propterea frequenti comperit experimento est, florem tunc extitisse, cum, obruto bulborum ventre, collum extaret; quo sensim exarescente magis compactum bulbaceum corpus ad florem partem conualescit. Quare curandum est, ut parco in sole ipsa ceruix apricetur, dum exarescit ; ne totum bulbum diuturnior insolatio perurat. Hæc est nata cum hortorum cultu, ac peritorum usu colonorum ad nos usque transmissa, vetus ponendorum in areolis seminum consuetudo.

Alia

Alia est consitionis ratio recentior, quæ, citra laborem conuehendarum in cellam radicum, per æstiuos menses easdem simul effodit; detractisque adultis nepotulis simul infodit. Verùm id ego sationis genus (nisi hortorum postulet amplitudo) vtpote periculosum atque incommodum non vsurpauerim. Periculum imminet vel ab æstiuis imbribus, quibus insuccata semina reualefcente mox æstu frequenter ad tabitudinem inferuescunt; vel à residuo post imbres tridui quadriduiue nubilo, quod è plantis, quæ primæ florent, fibras elicit, redeunte deinde intempestiuo calore non sine frequenti plantarum ipsarum exitio perurendas. Neque verò par subeunt non eruta ac recens adobruta semina discrimen. Ab illis enim requieti soli densa soliditas æstiuui humoris calorisque penetrabilem noxam nonnihil excludit: ad hæc autem emotæ terræ laxa mollities pestem vtranque transmittit. Huc adde non leuem illam incommoditatem, quod, si qua inter effodiendum corrupta semina, offenduntur, in illo tumultuario satù apta substitui ægrè possunt. Quare incogitatæ consitura flos inordinata plerunque confusio est. Antequam testas conferas, tum ipsarum tum radicum deponendarum numerum subducito: singulas cuique testæ radices (nisi cuiuspiam amplitudo exigat plures) cum peculiari tessera destinato: ista, ne animo excidant, in albo, qua præscripsi ratione, descri-

Fistilium cō-
serendorum
ratio.

scribito. Testas autem ad satus accipiendos sic præparato. Imum foramen minutis potius glareis, quam testaceis fragmentis (vt vulgò solent) obstruito, Illi enim ob globosam figuram minùs inuicem coherentes conceptam aquam ex facili transfundunt: hæc autem planioribus corpusculis inter se apta modico terræ illapsu ita cœunt & coalescunt, vt superfluum humorem ægrè parceque transmittant. His aliqui excreta cribratæ terræ duorum, triumue digitorum alta in eundem vsum superaddunt. Quem ego morem non improbauerim, nisi periculum fuërit à formicis, quæ per imum foramen adrepentes inter excreti soli minutulos aridosque calculos libentissimè nidulantur. Quamobrem expediet excretorum loco glaream aggerare. Vbi crassiore materia ima fictilia constraueris, tum cribrarij puluisculi tantum ingerito, quantum substerni deponenda semina postulabunt. Vbi anemonas & ranunculos, molles nempe radículas, aut lectissimos bulbulos collocare velis; substratum solum, mollique manu depressum ab ipsis testarum oris ternos quaternosue digitos distet: sin autem maiusculi bulbi serendi sint, ad quinos senosue digitos subsidat. Ita mollissima constratas humo singulas testas vnica media radice conserito. Si quam pluribus destinaueris; senos illæ ab ambitu vasis, quaternos minimùm inter se digitos distent. Sic enim maternum terræ gremium lactentibus

tibus fibris complexæ; quamuis a satû minimæ; largiore tamen suctu paucos intra menses ad vberimum florum puerperium adolescent. Sed, ne plures in vnico vase radices permistæ confusæque discernentis cognitionem fallant, generis omnes eiusdem sint. Post singulos satus suam cuique testæ vel plumbeam, vel arundineam, vel furculaceam resleram, supra eiusdem testæ labrum nonnihil extantem a tergo defigito. Ita positas radículas humo itidem tenuissima cumulatim contegit; vt media humus paulò extumida consistere non patiatur aquam, sed molli vndique deuexitate diffundat. Nonnulli satores primùm testas humo cumulant, summis deinde digitis comprehensa semina vsque eò mergunt, dum ad primos articulos terra perueniat. Sed vulgaris ista satio non admodum placet: tum quia cæca ipsa collocatio nec præstituta seminibus loca, nec apta vel inrer se vel a summis fictilibus interualla exquisitè custodire potest: tum quia incauta sæpe digitorum depressio sobolescentes radices infringit; ac parentibus vtiliter hærentes, necdum a materno lacte remouendos fœtus cum vtrorumque pernicië, vel certè non sine magno vulnere auellit ac distrahit. Hæc autem fœta floribus vasa, si nondum abunde autumnus calores temperarit, loco subdiali quidem, non tamen aprico, tantisper hospita, dum folia exire cæperint, asseruato; ne radices ab humido terræ complexu,

Minutorum
seminum sa-
tus.

plexu, antequam comprehenderint, turgescences nimis caloribus in tabem sufferuefiant: sin æstus remiserit, solibus expositas in sedes, vbi tamen apricis areolis non officiant, ad ornatum apta serie digerito: eadem singulis binisue stratis æqualiter laterculis, nisi lapideæ bases iidem scabræ suppetant, superponito; ne, imo foramine humo subiecta præcluso, vbertim concepta, nec facile transfusa obrutas radices aqua corrumpat. Per eosdem autumnales dies minutis hiemalium vernorumque florum seminibus seminarium sic obserito. E tenerrima terræ farina palmi dimidium alta sub ipsas puluorum oras mollissimum cubile substernito: eam terram leui manu cœquato: illic suis singula notis sedibusque discretæ semina collocato modicè rara, vt in ostenso incremento feliciùs conualescant: præternui cribro terram dimidiatum digitum altam incernito: eandem radio, seu manu leuiter complanato: areolas, quæ hiberno soli ostentæ non sint, æstiuorum atque autumnalium florum vernæ sationi reseruato: minutiora semina æquè, vt iam monuimus, depressa spargito: grandiuscula in scrobiculos vnum alterumue digitum altos raris interuallis demittito, eodemque cribrati soli polline obruito: donec egerminent, superpositis pensilibus cratibus, aut ramusculorum umbraculis (si fuerit opus) æstum defendito: si quando non pluet, ne terra sitiat, præscripti hortensis Aqualis, vel fi-

L. 1. c. 5.

cti-

Etilis vel cuprei , angustius pertuso tubo siue scopu-
 la asperginem irrorato potius , quàm affundito : pro
 incremento terram identidem aggerato . ^{Henricus} Henricus
 Coruinus , experientissimus herbarius , antequam ^{Coruinus .}
 contumacis lentæque duritiæ semina solo commit-
 tat , aquam defundit in catinum : nitri modicum su-
 perfundit , ac distabescere finit : in eam nitratam ,
 aquam semina immittit : duodenas horas pro varia
 duritie plus minusue macerari & medicari patitur :
 exinde serit : eandem aquam inspergit , ut nitrum ex
 igneo terræ halitu concretum seminale contu-
 maciam ad vberem germinationem proritet . Bre-
 uiore alij via , salubrique vulnere præduræ gran-
 diorum seminum morositati medentur . Illis
 enim forcipe apprehensis , a tergo aduersaque oculo
 parte corium præacuto cultro dissecant , lima-
 ue deterunt ; aut eadem non satis matura , & pro-
 inde molliora , legunt , & rite conferunt . Ita hu-
 more terræ penitus peruadente intra paucos dies
 turgescunt , citumque germen emittunt . Si agri
 modus angustior laxam aream seminario negat ; fi-
 ctiles catillos eadem ferme ratione , qua testas su-
 prædictas parandas esse præcepimus , intra ipsos
 hortos præparato : ad eundem seminarij modum
 conferito : humoque subinde nascencia semina regi-
 to : per æstum , donec germen existat , à sole di-
 stineto : per siccitates aspergine tenuissima irrigato .
 Semina , quæ probabilem florem ediderint , præ-
 Q signa-

signata in hortos admittito : quæ de generauerint , reijcito : quæ nondum effloruerint , si perpetuis radicibus nituntur solo , ad floris experimentum intacta referuato : sin fibras quotannis deperdunt , vbi illæ exaruerint , curiosè refossa , cribroque , ne aliqua prætereantur , à solo discreta post æquinoctium autumnale rariùs disserito , nequaquam , nisi probata per florem tirocinium indole , ad patritiorum florum consortium admittenda . Placet altera septentrionalis industriæ consitura , frigidæ videlicet plagæ opportuna . Congestitij lætaminis quadrata moles excitatur : huic æqualis mensuræ figuræque ex asserculis compactilis , quinot senosue digitos altus margo imponitur : media capacitas de more minutim succreta humo repletur , quæ vsitato satū grauidata inusitata felicitate parit . Nam subditi fimi suffitu aduersùs abortiua frigora vaporatur , ipsique partus pinguißimi soli vberē nutricantur .

CAPVT II.

NVnc alia Floræ lex æquissima promulgetur. Sicut florum parens, & altrix terra est; ita colonus sator simul, ac tutor esto: hortensis enim familiæ infirma teneritudo non vbere solùm indiget, verùm etiam tutela. Prima igitur coloni cura sit, vt subinde nascentes malas herbulas floribus defendat. Quoniam vero inutilibus ac voluntarijs herbis assiduè subnascentibus areolæ, ac semitæ, atque adeo testæ ipsæ facilè siluescunt; ideo totus omni tempore hortus exherbandus est, præterquam tellure vel gelicidijs obdurata, vel imbribus madente. Concreta enim tenaxque durities, quamuis auulsis folijs, hoc est filijs, extrahi non patitur parentem radicem, mox ab iniuria incremento vastiore regerminaturam. Mador autem incommodè liberalis multum altricis terræ noxijs cum radicibus distrahendum agglutinat. Porro facili felicique opera herbæ eximentur ex humo aut hibernis frigoribus, aut æstiuis solibus soluta, aut etiam humida, non tamen madida. Sed custodiendum est, vt infra herbaceum capillamentum depresso digitis arreptum radicis caput, digitorum impulsu laxata in orbem humo, recto conatu educatur: sic enim scitè trahentem radix integra sequetur. Hic autem hortenses runcatores admonitos vo-

Modus exherbandi.

lo, tunc esse runcationi tempestivas herbas, cum illæ mediocriter adultæ manu eligi facillè possunt: perniciosè verò runcationem procrastinari, donec eadem altè lateque diffusæ alendis floribus paratum terræ vber emungant, inextricabili fibrarum nexu florea semina cancellent, irretiant, atque adeo strangulent, multiplicique lapsu solum complexæ contravellentem pertinaciter obnitantur, aut etiam (quod nocentissimum est) arefactis caducisque seminibus sese latius reseminant. In eam denique providi cultores curam incumbant, ut, quoad fieri possit, areolas ante interpurgent, quàm floreat; ne florum teneritudo runcantium fortuita offensione lædatur. Verùm quid profit nocentes herbas extirpare, nisi nocentiores bestias extermines? Hoc longioris orationis argumentum in proximam disputationem, bipartitò & secretiùs pertractandam, reservamus.

Nunc alia florum incommoda propulsemus. Sæpe fit, ut posita semina vel sponte sua super terram emergant, vel fortuitò detegantur. Ea, si nondum radices egerint, aliùs defodito: si fibras miserint, aggesta humo accumulato. Eodem aggerati soli remedio ijsdem seminibus consulito, ubi non satis altè depressa fuerint. Indicio autem, erunt inæ foliorum partes, siue extantes petioli lacteo candore notabiles, utpote maternis terræ vberibus proximi. Non placet contra gelicidia, plantis circumspergi aut comminutas paleas, aut finum, aut facillè vermiculantia cornuum ramenta,

Detestas radices operiendi.

Frigoris ar-
gendi.

ta,

ta, sordida nempe remedia. Nonnulli testas intra tectum, quod solem largiter admittat, tantisper, dum terra regeletur, continent. Alij floribus apricatione gaudentibus noxiam tecti opacitatem rati vel ad parietem ab aquilonio auersum frigore, ac meridiano tepori aduersum easdem admouent; vel nostratis plagæ mitius gelu nihil veriti nullo munimento defendunt. At verò septentrionales coloni aduersus sæuiora frigora hortenses puluinos arboreo musco ad palmarem altitudinem insternunt: quòd is æquè contra brumam, atque contra calorem tuendis floribus opportunus & beneficus est. Nec minùs eorundem solertia, Caloris, defendendi. colonorum nobilioris notæ serotinis floribus æstiuos cauet ardores. Nam, ne breuis æui flosculi ab æstu præmorianantur, è tenuissimis abiegnistabulis ad areolarum pretiosè consitarum commensum compactis & circumsectis, aut certè è lino textili vmbracula sic obtendit, vt inæqualium pedum fulcris innixa vel alligata deuexo varioque ad solis cursum oppositu solem arceant. Si per æsti- Irrigandi. uam hibernamue citra gelu siccitatem vel in fictilibus vel humi sitiant, quæ rigatione proficiunt, semina & radices; secunda post exortum hiemalem solem hora, eodem æstiuo iam occidente aut occaso irrigentur: ne vespertina per hiemem nocturno frigore congeliet, matutina per æstatem diurno æstu inferuescat aqua, vtraque verò bibu-

la semina perurat . Debet præterea nec nimia lento infusu propinari , ne plus æquo potæ atque inebriatæ plantæ marcescant ; nec largior vno impetu affundi , ne temere ingurgitatæ , non in omnes æquè partes transfuso madore , inæqualiter alantur : sed cupreo fictiliue aquario vase , minutis foraminibus pluuio , irrorari , vt paulatim perfusæ æqualiter bibant , & feliciter viuant . Quòd si consitum fictile ab diuturna humoris inopia siccissima squaleat siti ; tandiu in aqua demersum habeatur , donec vndique bibulum largiter immaduerit . Indicio erit penitus extinctæ sitis tum lætior plantarum viriditas , & florum velut ridibunda formositas , tum ex imo testarum foramine liquoris emissa satietas .

Summa terræ cutis , quæ crustulam duxerit , nunquam per hiemem ligneo ferreoue scalpello (quod inconsultè nonnulli faciunt) incidenda , nec laceranda est : vt affusus humor quò lentior & moderatior , eò innocentior & salubrior humum radicemque perfundat ac permeet . Eam ob causam ante hiberna frigora internascens inutilis herbula maturè vellicitur . Ita in gelicidijs minimè herbescencia , vasa & vulsione non indigebunt , quæ solum dimoueat , aditumque ad radices noxio frigori patefaciat . Irriguus autem humor è puteo , qui profundi haustus sit , quoad eius fieri poterit , hauriendus nequaquam est : quia nunquam incoquente sole rarefactus ac tenuatus , ideoque pertinaciter gelidus insuccatas radices

non

Terræ cutis
non scalpurienda .

Aquæ irriguæ
defectus .

non refouet ad alimentum, sed frigefacit ad exitium .
 Quare, nisi salubrioris aquæ suppetat facultas , ante-
 quam putealis affundatur, sub dio exponenda, aut e-
 tiam insolanda est, vt intepefcat. Maximè probabilis
 atque vtilissima riguis hortis haberi solet, tum quæ
 profluit ; quia cursu percussuque ipso extenuatur &
 incalescit: tum quæ cælo delapsa cisternis concipitur;
 quod ignis potissimùm atque aëris vitali halitu foeta
 hortensem mirificè auget fœcunditatem. Propter
 hanc elementorum beneficam temperiem censetur
 imbres agris maximè salutare. Aqua stagnans &
 pigra damnatur, vt quæ putri crassitudine ægerrimè
 penetrans, tetroque spiritu promptissimè nocens
 vermibus procreandis, quàm floribus alendis, præ-
 sentior est. Rigationis modum rigandarum stir-
 pium ætas & sanitas temperabit. Nouellæ tenera at-
 que humida ætatula, minimo etiam corpusculo, vt
 minùs sitiunt, sic parciùs bibunt. Confirmatis iam
 viribus adultæ, vtpote calidiores siccioresque, inno-
 centiùs, quàm viri, bibaculæ sunt: fontes enim,
 non dolia, exhauriunt. Quæ præterea consueue-
 re, liberaliter potari desiderant. At verò quas
 caries, aut senectus, rerum omnium morbus, in-
 festat, ne præmaturè corrumpas, cautè parçquæ
 adaquabis. Ex veteri denique admonitu floream
 hortis feracitatem tusa lotos & in aquam coniecta,
 aut fœnum græcum in aqua tritum medicata irri-
 gatione conciliabit. Si pluuius ventus magnis im-

*Constant. Po-
ge. de Agric. l.
12. c. 6.*

Vasorum inclinatio adevitandos imbres.

Caduci floris fultura.

Vitiosæ radicis curatio.

bribus terram alluat; testarum in latus acclinatarum ora, ab ipso vento auersa in oppositam plagam expedit obuertere: ne tum defossæ maternæ radices, tum prominuli florei partus in solo nimis madente naufragium faciant. Si floris cuiuspiam, qui præsertim inani scapo sit, statura procerior violento turbine euerberetur; furculi adminiculo statuminanda est; aut fictili tubo circunuallanda. Si radix intra testam condita decoloratis, aut marcentibus folijs ægrotare deprehendatur; testa in latus inclinata, Aqualis tubulo aqua superfundatur, donec, innocenter excauata proxima humo, radicis oculus atque adeo totum latus citra fibrarum iniuriam diluatur ac renudetur: corrupta pars ferro ad viuum recidatur: integra, dum affusus humor paulisper exiccetur, per semihoram detecta sit: tum, cera terebinthinæ resinæ admista obducto vulnere, arida & macra humo fossula repleatur. Si defossus bulbus de indicio eodem vitiosus esse intelligatur; terra, quæ circumfusa est, cautè subducta, ligneo cultello vitium viuo tenus abradatur: vitiatæ tunicæ detrahantur: macro itidem siccoque solo scrobiculus expleatur. Sin autem siue bulbi, siue radicis ima morbus infestet; penitus erui debent, & curari, & etiam terra modò præscripta obrui. Si circa folia floresque summum solum albedo, araneoso, aut roscido, nec non fungum olente mucore obducatur,

tur, quo tanquam ferro succisa germina cum radicibus contabescunt; existimandum est, illic aut corij relegmen, aut clauum, aut aliquid tale infuso vitio nondum in terram computruisse. Quare, viciata statim humo, quæ circum supraque est, citra radicum contactum & noxam egesta, recens innocens & macra sufficiatur. Sunt, & quidem insignes, hortorum cultores, qui flores florumque caules innocenter attrectari putent: eos verò, qui tactionem damnant, supersticiosè meticulosos vocitent. Si tamen res ad philosophicam trutinam expendatur, damnificam esse floribus contrectationem diffitendum non est. Flos enim, floreusque cauliculus dum contrectatur, mollissimi corporis quàm distenti, quàm contracti, quàm distorti naturalis constitutio violata luxatur; adeoque flos ipse læditur, vt sæpe gracilescens extabescat. Vsq̃ue adeo vita floris est esse intactum. Quanquam florei partus iam hominum voluptati, ornamentoque, nec non suæ ipsorum gloriæ adulti distrahi debent a materno radicum vbere, vel vngue vel potiùs ferro succisi; vt etiam à vulnere formosissimi breuem quidem, at gloriosam vitam uiuant inter gestantium complexus, inter odorantium oscula, inter plausus admirantium: vt in ipsa morte risu discolorare renidentes mortalitatem, exhilarent: vt iisdem expirantes legentibus odoratam animam mortalibus vitam inhalent: vt denique

Florum contrectatio cauenda.

Reciso vsurpanda.

nique iam enixæ radices diuturniore nutricum,
 officio liberatæ ad pulcherrimæ fœcunditatem,
 sobolis perennent. Flores autem sparsim decer-
 pere oportet, vt in singulis areolis æquè rare-
 scant; floridos quoque plerosque caules citra subnascen-
 tium florum vulnus paululum supra terram subse-
 care; vt ipsius proceritas caulis flori formam ex-
 augeat, & radici vberioris alimenti absumendi
 materiam subtrahat. Est, qui iam defitis bulbo-
 rum floribus folia solo tenus intondeat; vt, quan-
 do florei cirri defluerunt, abrado foliaceo capil-
 litio glabellus hortus minùs horridè caluescat, hoc
 est impubis atque imberbis exhausta in senectute
 iuuenescat. Istam equidem violentam caluitiem
 nobilium hortorum nulli suadeam: quòd atton-
 farum è vulnere plantarum vitalis ac genitalis vi-
 gor tenuissimus euanescit; radicesque vel enectas,
 vel ad alios fœtus relinquit effœtas. At verò,
 cum superuacaneus tantùm & crassior succus in-
 foliorum luxuriem abeat, hortum præstat capilla-
 tum habere, quàm caluum. Huc adde, quòd per
 germinis plagam frigoris calorisque penetrabilis
 inclementia proximam radicem non rarò vel ene-
 cat, vel emaciat. At enim rei rusticæ nobiles ma-
 gistris affirmatissimè docent floriferis bulbis af-
 fines capas, folijs detractis, magis fieri capitatas, &
 conualescere. Quid ergo detractio eadem tan-
 quam perniciosa damnetur in bulbis? Quia nimi-
 rum,

Folia post
 flores non
 detrahenda.

Plin. l. 19. c. 6.
 Constant. Po-
 gonat. Agric.
 l. 12. c. 31.
 Pallad. v. 2. 24.
 Februar.

rum, qui porrigi solet in folia, concoctus leuiter succus crassior & lentior ex angustis attonsi bulbi meatibus effluere non potest. Quare ad inferiora contractus bulbum ipsum & largè nutrit, & mirificè amplificat. Verùm, qui pulchrè pullulat in flores, humor, quia tenuior & purior est, vtpote magis concoctus, è spiramentis vulneris facilè interspirat & vanescit. Argumento sit delicatæ atque euanidæ tenuitatis florum vita breuissima. Huc accedit, quòd eodem humore superfluente, quo bulbus violentam in pinguedinem, seu potiùs in hydropa distenditur, genitalis calor, ac viuida vis in florem eruptura sic opprimitur ac restinguitur; vt vnà existat ex ignaua obesitate ingrata sterilitas. Parem scilicet natura legem plantis dixit atque animalibus, vt præpinguia minùs fœcunda sint. Fatendum igitur est crassitudinem bulbis faciente tonsura non magis foliorum comam, quam fertilitatem recidi. Quòd si narcissorum præcipuè foliorum incommodè diffusa magnitudo displicet, laxiorem in nodum molli-
Quæ cura
 iisdem folijs
 adhibenda.
 ter substringatur. Sic enim, succo ad ima leniter coacto, plenioris crassitudinis bulbacea capita fiunt. Cæterorum autem folia bulborum tum breuia, tum lata, tum fragilia, nodo videlicet inepta, quæ tamen non geniculatim seu gradatim adnata caules altè conuestiant, sed à radicibus humiliter assurgant, si Plinij consilio deflexa obruantur; ip-
 sa

l. 19. c. 5.

Vasorū post
flores custo-
dia.

Exemptio
bulborū no-
stratum.

sa succo in sese contracto capita excrescent. Eadem poteris arcolarum folia æstiuo sole siccata vel eximere, vt etiam sine floribus niteat simplex munditijs hortus; vel vtilius relinquere, vt obrutitas illa radices à calore solis excusent. Cæterum testæ, amissis floribus, ne vehementi sole ignescentes inclusa semina perurant, appetente iam æstate in subdialem locum, qui tamen non inoletur, transferantur, vbi emeritas radices mitior æstus paulatim atque innocenter arefaciat. Si ver extremum, aut æstas noua largis atque hiemalibus imbribus diffuat; ne radices iam enixas corumpentem humorem nimium fictilia vasa concipiant; aut humi (quemadmodum modò præscripti) reclinentur, aut intra porticum aliudue sub tectum aëri patentissimum cōportentur: in clauso enim adhuc humida semina mucescerent. Si bulbos sobolescere velis; vel altero, vel tertio quoque anno extrahes: sin ad vnicam florum vbertatem reseruare mauis singulis annis effodies. Hoc tamen consilium ad complures inferiùs percensendos duntaxat referes, non promiscuè ad vniuersos. Sunt enim nonnulli rariùs eruendi, quorum vnumquenque suis nominatim locis excipiemus. Possumus quoque cum experientissimis cultoribus & sentire prudenter, & feliciter periclitari; qui cum ad copiam, tum ad pulchritudinem florum plerosque rarissimè bulbos effodiunt. Sed illud quo-

quotannis custodiunt, ut adnatas soboles a matribus auellant; ne maternum illarum succum, in flores cæteroqui abiturum, in sui nutrimentum incrementumque prælibent. Igitur post octauum calendæ Iulias subducto solo adhærescens bulbaceæ matri bulborum pullities cautè deregitur, clementerque reuellitur: subtractæ iam effortæ recens ac fertilis terra sufficitur: eruta soboles opportuno in loco mox repangitur. Pari ferme ratione, si quando immortæ bulbiferæ matrici differendam, alioque mittendam sobolem subtrahere voles, sic facies. Sobolescentis bulbi situm, nisi memoria tenes, aut nisi præfixa tessera iam animo infixisti, memoriali codice, tanquam sibyllino volumine, consulto inuestigabis; illic terram usque adeo subduces, quoad imam parentem cum adiuncta posteritate retegas: tum altera manu matrem ipsam retinebis, altera, quos cupies, posteros leniter innocenterque reuelles; terram denique in effossum scrobiculum reuocabis. Quoniam verò æstiuus quæ caloribus, quæ imbribus obrutæ radices sæpe marcescunt; idcirco expedit palmum altam puluinis humum superingerere, quæ medio tumore in omnem partem æqualiter deuexo vtrunque seminibus defendat iniuriam, donec autumnus benefico tepori humorique excipiendo aggerata humo exoneratæ areolæ detumescant. Peregre allatos & Externorum. adhuc hospites loci cuiuspiam bulbos, si hospitale ami-

amicumque solum nacti fertili semel successu floruerint, loco mouere non expedit: quia nostro tum calo, tum solo nondum assueti translatione, sterilescent & pereunt. Commodum satisque diuturnum effodiendis bulbis bimestre spatium est, humo sicca per æstatem ab extremo Iunio in extremum vsque Augustum, cum folia & fibras æstiuam iam insolatio siccauit. Præcoces tamen bulbos, præsertim verò narcissos præmaturè præstat eruere: quòd Augusto mense nonnunquam pluuiæ nouellas illi citare radículas incipiunt. Solo à recenti pluuiæ madido cessandum; ne præconceptus humor effossas bulbosas radices corrumpat. Sic autem effodito. Ab extrema qualibet areolæ parte trulla seu manu leuiter demissa solum in semitas progerere incipito: proximos bulbos diligenter peruestigato: subducta circumfusa humo extrahito; vel certè lanceæ cuspidi non absimili, quod supra descripsimus, ferramento infra radices adacto humum paulatim suffodito, interque manus identidem caducos educito: caueto autem, ne incauta ferri manusue impressione vel parentes vel pullos faucies, aut seiungas: sic ad reliquos ordinata fossione progreditor, donec omnes effoderis. Antequam ad areolam aliam perscrutandam rimandamque transeas, priorem recognoscito ac retractato: solent enim minutiores præsertim bulbi cum ipsa terra subtracti conuiuentem latere.

scru-

scrutatorem , qui cum eadem regesti præposterè
 confuseque regerminant . Ad hæc egestum solum
 regerito ; ne naturæ artique inimica inanitas in la-
 cunosis areis lateritium sepimentum incommodè
 subsidere & collabi faciat . Seorsum conferen- Adnatorum .
 dos , qui leuiter matribus hæreant , adultos bulbu-
 los innocenter separato : si quis bulbus cariem vi- Erutorum, cu-
 tiumue aliud sentiat, exacuto in cultellum furculo را .
 bene purgato : sabulo vulnus inspergito : singulos
 vix erutos bulbos indecoro noxioque puluere sor-
 didos (tulipastamen excipio) præscripto peniculo
 detergito ; siccis radiculis liberato ; exterioribus tu-
 nicae quamuis aridis ne spoliato , nam illæ oppor-
 tunam vitio protegent nuditatem ; suas in classes
 distribuito ; sub dio ne relinquito , nam illos cum
 imber & ros , tum maximè sol corrumpit ; sed aut
 loco nonnihil calido , qui tamen soli obnoxius non
 sit , priùs per biduum asseruato , vt bene siccescant ;
 tum in siccae frigidæque cellæ pauimento deponi-
 to ; aut certè statim comportato intra rectum in- Reponendo-
 conclaue ijs asseruandis accommodatum , quod rum cella .
 nempe à sole auersum , Austro imperuium , Aqi-
 loni fenestratum salubriter inspiretur , in summa
 quod frigidum siccumque , muribus denique inac-
 cessum sit . Super cellæ huiusce pauimentum suos
 in ordines digesta , inscriptisque schedulis notata se-
 mina expandito : illic per dies quindenos aut vi-
 cenos aura frigida perfari & siccari finito ; deinde
 in

Quando, &
quemadmo-
dum anemo-
næ eximen-
da.

Ranunculi.

Plantæ im-
mortali um
radicum.

in arcas ad seminum discrimen locutatas, siue in
altas thecas papyraceis inuolucris præscriptisque
nominibus discreta recondito. Ego singula bul-
borum genera singulis pensilibus canistris, quæ ra-
ro textu salubrem semper auram admittant, vti-
lius inclusa distinxerim. Ad hunc eundem mo-
dum anemonas tum in areis, tum in fictilibus
positas erues & repones. Hoc tamen a bulbis
anemonæ discrepant, quòd illi rariùs erui possunt;
hæ (quicquid alij sentiant) quotannis debent: cum
diutius obrutæ vitio atque exitio, ut sæpe compe-
rimus, opportuniissimæ sint. Nisi ranunculum,
ob complusculos pediculos Polypum inter flores,
protinus à foliorum casu extrahas; vltro ipse more
ranarum supra solum resiliet, à sole plerunque pe-
riturus. Vt autem soboles parenti arctissimè im-
plicatas explices extricesque, in vmbra priùs affic-
cescere finito: vbi enim conserta cruscùla detu-
muerint, faciliùs atque innocentius extricabun-
tur. Nihil nimirum temerariæ festinationi tam
impeditum est, quod cauta cunctatio non expe-
diat. Hæc seruandorum florum ratio est, quorum
fibræ cum folijs æstate arescunt, & pereunt. Aliæ
verò plantæ, quæ radices æternas habent, sub ip-
sum ferendi tempus erutæ, aut protinus aut mox
obruui debent; dum tamen interim in supradicta
cella incolumes conseruentur. Sed iuxta salutaris,
ac formosa Pæonia vel subterraneo loco, vel intra
te-

testam superingesti soli cumulo custodiatur à sole.
 Eodem terræ frigido humidoque operimento quæ Bulbi teneri
carnosique :
 tenerrimè carnosæ sunt, velut fritillariæ siue mele-
 agrides, defendantur; ne infepulta rugas trahant,
 ac penitùs exarescant. Denique siluestria vel Lilia silue-
stria.
 montana lilia, simul ac defloruerunt, effodiantur,
 viridisque caulis cautè eximatur. Hæc enim radi-
 culis carent, dum vernant, quas, deperditis florib-
 us, agere incipiunt. Vsq̃ adeo quod in terris
 pulcherrimè floret, radicatum ac stabile sæpe non
 est.

Contra maiusculos hostes hortense bellum.

CAPVT III.

NOn in theatri tantùm, sed in hortensi
 quoque arena hominibus cum belluis bel-
 lum est. Adeo ab ipso theatro voluptatis
 optatissima pax exulat. Vtque minimè nos esse
 tutos, cum maximè securi sumus, admoneamur:
 ipsa sæpe hortos custodia infestat. Quis autem hoc
 iniuriæ credat? hortensem elegantiam & mundi-
 tiam ipsi corrumpunt in primis atque contami-
 nant domestici fidelissimique custodes, canis & fe-
 lis. Vterque videlicet ab acri bile inquires, atque Canis & felis
agilitas vnde,
 agile, ideoque venaticum & ludibundum animal,
 in tenera resolutaque humo vel subterraneam præ-
 dam,

L. I. c. 3.

dam, lacertulos & musculos facili fossione vestigans, vel belluinam pyrrhicam exultim ludens, concinnam soli æquabilitatem iniquat, vtilesque nonnunquam radices effodit. Quin etiam felis præposteram & posticam sementem faciens delicatos hortos odiosè stercoreat; sui que fœdum ac fœtidum indicium ipso, quo contegit, circumscalptæ cumulo terræ detegit. Quamobrem cautè colonus obseruet, ne qua id genus bestia per hortos recens consitos euagetur, prius quàm cælestibus aquis densatum fuerit ac solidatum solum. Per eos dies hortensem canem domi solutum, ne tabescat in vinculis; per eas noctes intra ipsos hortos catenatum contineat, latratu satis insidiatores proditurum: Domesticam felem à noxio excursu arctior custodia cohibeat. Externos quæ canes, quæ feles tum probè obseratum ostium, tum edita munimenta vel cæmentitia, vel saltem (vt ante dixi) spinea distineant. Multi, quibus hortuli modus non ita magnus, facilisque tuitio est, mollissima humo fartos puluinulos superiniectis asperant spinis, donec illi contra iniuriam obdurerint. Ego verò satius esse duxerim sepibus dumtaxat ac præstantissimas præacutis arundineis paxillis præfixis obsepire, ne cui noxæ obnoxie sint. Cæterarum siqua radicum eruta fuerit, suam in sedem, quam suffossa monstrabit fossula, reponatur;

tur; siqua vallecule defossa, siquis monticulus excitatus sit, leni trullificatione complanetur; siqua felis adobruit excrementa, ea procul trulla proiciantur, ne rursus excreturam eodem odor inuitet. Quanquam istis incommodis opportuni non erunt horti, quos præscripta modò munimenta tueantur. Sed grauior imminet radicibus à talpis muribusque, hoc est à clandestinis hostibus perniciies. Adeo vel humatas sepultasque florum parentes & perspicacitas, & cæcitas peruident, ut lædant. Ac talpæ quidem ad nocendum satis oculatæ, quòd inquietis ingratisque vnguibus hospitalem terram vellicant & lacerant; quòd hærentes nutriti optimæ innocentes radices longè lateque actis cuniculis oppugnant ac subruunt; quòd nocentissimis furibus, muribus volui dicere, occultas ad corrodenda semina vias aperiunt; iusto cæcitatibus supplicio, ut locuples author Stefimbrotus ait, ab ipsa terra damnatæ sunt. Sed cum seueram non reuocet animaduersio à cæca magis, quàm sint oculi, nocendi libidine; tum veteres, tum recentes coloni communem in hostem ultione multiplici conspirarunt. Sotionis antiquissimi scriptoris præsentissimum contra talpas remedium est, ut veratrum album & cynocrambes cortex contundantur, cribrentur, cum polenta & ouis ex vino & lacte subigantur, & plures in offulas coacta ipsarum foraminibus talparum inferantur. Facilio-

Talpæ cur
hortis noxiæ.

Apud Guidam
in voce
τυφλότις

ut insectan-
da.

Apud Consiat.
Paganat. de
Agric. l. 13.
c. 7.

*Apud eund. ib.
Pallad. l. 1.
iii, 35.*

ri quoque tormento cunicularium & cauaticum, hostem Græci debellabant, suffitu fumoque victores. Nucem, siue aliud quodcunque pari duritia pomum vtrunque perforatum enucleabant: nuclei loco paleas, cedriam, seu ceram, & sulphur includebant. In eundem usum vas angustum usurpabant; spiramentis exiguis, ne quâ interspirarent, præclusis, nucem intus accensam, seu quod aliud suffitionis instrumentum in aditu latiore sic aptabant, ut acceptum forinsecus afflatum intima penitus in latibula diffunderet; utque, oppletis tetro fumo cuniculis, talpæ protinus fugerent, vel necarentur. Contra bestiolas easdem proderant frequentes felium excubiæ, dum tamen satis duratum solum suffodientium seu ludicrum, seu fœda vestigia non ita faciliè admitteret. Ea gratia mustelas habebat nonnetmo mansuetas, quæ suis in latebris incautos grassatores iugularent. Erant, qui foramina ipsa succo siluestris cucumeris, & rubrica opplerent. Plerique in aditu pendentium setarum laqueos disponebant. Nonnulli circa talparum cubilia plures cauos aperiebant; ut quamuis orbi tenebriones immissam inimicam lucem sentirent, longèque diffugerent. Istæ in talpas veterum inermes pugnæ; hæc recentium ferrea expeditio rusticorum. Eorum aliqui bipalio, aut ligone, rastroue armati loca talpis infesta vigilanter obseruant. Ea plerunque sunt aræ, prata,

prata, hortique, ut quæ lumbricis pingui solo gaudentibus, iucundissimo nempe talparum pabulo, abundant. Vbi ergo terram in tumultus exaltari suspendique lento speculatu cognouerint, eò statim leuibus tacitisque vestigijs, ne strepitu territus terga vertat hostis, accurrunt; & bipalio, aut ligonis rastrive acuta parte cum ipsa terra subterraneum vastatorem effodiunt; aut certè retusa asurgentem humum validè contundunt, vnaque suffodientem bestiolam vel exanimant, vel obstupesciunt. Alij verò exarmatis manibus sic expugnant. Vbi excitatus cæspes emotæque terræ cumulus intumescit, effossum a talpa scrobem, remota vtrinque, terra detegunt; inde cuniculum plerunque ramosum ad cubile vsque latebramque bestiolæ, humo penitus egesta, vestigant atque aperiant. Verumenimvero, quia, quàm hebeti est visu, tam acuto est auditu talpa, fossionis etiam remotæ sonitum tenuissimum sub denso surdoque elemento liquidè exaudit; atque, antequam in angustias adigatur, nouas ad fugam vias vngue rostroque scalpens humum regerit in summum aggeratque. At, cum prope à præda venatorem esse ex emoto solo percipit, protinus diuque consistit; ne scalptura capturam pariat. Ea re callidi venatores vnâ sæpe alteramue horam immoti cessant, ut diuturna quiete absentiam simulent. Decepta demum longa cessatione

bestiola suum properè opus adurget, rostroque suffossam irrequietis pediculis terram eiecat in cumulum. Tunc enimvero insidiatores subita manuum impressione emoto mollique cum solo talpam extrahunt; arreptaque ipsius ceruice, aure, caudae, prædam, ne se mordicus vlciscatur, pedica impediunt; captiuamque in herile Capitolium referunt mercenarij triumphatores. Ipse præterea villosa holoserico mollior animalis huiusce villus, inter pellicarum vestium delicias vendibili mollitie ac nigritia expetitur, opima victoribus frequenti quæsticulo spolia repræsentat. Ita belluino bello lentè profligato rustici Fabij, fabis utique victitantes, agrestem nobis cunctando restitunt rem. Hic & placet, & decet laborioso parabile, permolesto iucundum attexere inuentum. Ollam fictilem, palmos binos, aut vnum & semis altam loco talpis obnoxio summa tenus humo, aut paulò inferiùs totam infode; viuam talpam in eandem ollam demitte. Illa, vbi diurnæ lucis intolerans neque latibulum fodere præ vasis duritie, neque præ altitudine ac læuore vlla ex parte potest euadere, tinnulo grunitu calamitatem dequeστα finitimas talpas ad commiserationem opemque penetralibus è cauis contrahit. Videas non sine risu totum subiinde agrum scaterre nigellistenebrarum fororibus, quæ, quò nota vocat querela, cæcitate duce perreptantes in lubricum

cum decipulum alia super aliam incidunt; atque identidem crescente cadentium stridore, cæcarum captiuarum atratus chorus tragicam intra olæ caueam dissona grunnit symphonia. Nec ante isti cæculi Homeri suorum Iliada malorum flebiliter canere desinunt, quàm penitus oculos invindicis mortis æterna nocte præcludant. Diceret canoros in funere cyncnos, nisi stridor & color obstaret. Vernis hæc mensibus tempestiua præsertim captura est; cum genialis annus ad societatem animantes extimulat; cum cæcus amor cæcos affeclas facile in præceps trahit. Quanquam ex facili talpæ totius quoque anni ventoso statu capiuntur, quo frequentius & cuniculos agunt, & humo egesta cumularaque se produnt. Quod si cæca feritas adeo nocet; quid faciet oculata? Quamobrem aduersus nocentissimè sæcunditatis mures implacabile bellum suscipiendum est; ne, sicut agrestes prædantur fruges, ita urbanos populentur flores; neue sicut olim Gyari Troadisque incolæ fugarunt, ita nunc hortorum colonos exterminent, ut impigro ipsi dente hortos colant. Si tanta ipsis furandi dulcedo est, ut apud Chalybas durissimum ferrum furtim arrodere suaue sit; quidni teneræ radices, sætæ floribus matres, furacissimam ingluuiem timeatis? Atque utinam, sicut in aurarijs fodinis istos auri voracissimos Crassi nepotulos iustissimi exactores tanquam reperunda-

Pū. l. 10. s. 61.

Id. l. 8. s. 19.

Id. l. 8. s. 17.

Id. ibid.

Mures vt
profigandi
De Agric. l. 13.
c. 4.
Pallad. l. 1.
m. 35.

rum reos exenterant, vt illustre furtum repetant; sic nobis liceret aluo dissecta corrosæ floriferæ radicis integrum furtum educere. Sed hæc vindicis auri prærogatiua est, vt nimis auida viscera dilaceret. Age igitur veteres nouasque machinas contra mures, hortorum lemures, adhibeamus. Quoniam verò murium alij vrbani, quos oculorum, auriumque, atque adeo totius corporis mensura liberalior, caudæ quoque longum syrma nobilitat; agrestes alij, quorum cum reliquum corpusculum, tum præsertim oculos, auresque, necnon caudæ appendiculam insigni breuitate distinxit curta rusticitas: ab vtrisque floriferæ radices defendendæ sunt; ab illis, quas domus; ab his, quas humus occultat. Domesticos mures, idest familiares fures, apud eundem Constantinum Cæsarem grauis author, & vltor Paxamus hisce supplicijs mactat, pœnis multat, terriculis fugat. Polentam semine siluestris cucumeris, helleboro nigro, & colocynthide, aut certè helleboro solo medicatam offert. Murium cauernulas quærneo cinere saturat, vt nocenter asperfos scabies occupet ac perimat. Ferream scobem fermento admiscet, qua deuorata dispereant. Adeo ferrum vel sine vulnere interficit. Eosdem perdit rubi radice cum butyro, pane, caseoque commista. Idem ex veteri vsu album helleborum, & cynocrambes corticem tufum cribratumque cum polenta,

lenta, & ouis, & lacte confundit ac subigit, eamque intritam in ipforum foramina immittit. Vbi moderatiùs punire libet, tithymalum conrusum cum polenta ex mulso propinat. Ita vel in tenebris ad furtum perspicaces excæcat, hoc est lepido miraculo è muribus talpas facit. At verò suis è latibulis relegat ac fugat, quos simul chalcantho, origano, apijs semine, ac melanthio, vel seorsum hæmatite lapide, aut viridi myrica suffumigat. Sed efficacius territat abigitque vniuersos, cum captum quempiam detracta capiti pelle dimittit: timent enim reliqui, ne sibi quoque cum charissima cuticula muris facies exuenda, & ridiculè recutita Marsyæ larua induenda sit. Horum contra mures medicamentorum pleraque docet Anatolij quoque, ac Tarentini de horreo liber. Illud præterea affirmatissimè scribit Anatolius, cui Didymus subscribit, si spissam amurcam in æream peluim infundas, atque medijs interdibus noctu constituas, omnes tum incolas tum accolas mures & conuenturos, & adhæsurus. Agrestium murium contactum radicibus defendes, si easdem, antequam obruas, Apuleij consilio felle bubulo contingas. Multò tamen præstat per caniculares dies cicutæ semen cum helleboro polentaque miscere, aut anguini cucumeris, vel hyoscyami, vel amygdalæ amaræ, atque helbori nigri æquas partes contusas ex oleo subigere,

*Apud Cœs.
Pogen. de Agr.
l. 13. c. 5.
Pallad. l. 1.
tit. 35.*

re, atque ita intritas in cauos murium indere : hæc enim esca ocysimum est vescentibus venenum. Qui verò vetustissimum in Bithynia ros periculum fecerunt, pro certo affirmant rosei nominis rhododaphne murium aditus tam nocenter occludi; ut ipsi mures, dum in exitu nituntur, ad morsis ijs, quæ obstant, miserè moriantur in rosis. Exitialibus hisce medicaminibus addit Palladius agrestis cucumeris & colocynthidis æquè noxiam suffusionem. Cæterum gnarus cum primis ac prudens naturæ Plinius vel herbaceis vel alijs parabilibus armis murinum bellum ita profligat.

l. 21. c. 27. Denticulatos hosce furunculos helenio herba, & nomine pulcherrima, & re alioqui saluberrima, contrita enecat. Chamæleone, siue ixia, addita aqua & oleo, eosdem contrahit ac simul examinat, nisi protinus aquam sorbeant. Simo itidem herba vel fugat, vel cauerna præclusa extinguit & sepelit. Decocto anguino siue erratico cucumere sparsa semina ab ipso liberat noxio contactu. Cinere mustelæ aut felis diluto, vel decoctarum aqua femine consperso musculos procul abigit. Adeo furti reos vindicis vel extincti solus odor externat atque exterminat. Vnum denique foricem castrat & emittit: ut vnus emasculatas complures in fugam vertat masculos musculos. Adeo brutæ quoque, omnisque grammaticæ indociles animantes odere neutrum genus. Sic antiquitas pro-

prolusit in mures; sic posteritas debellat. Muscipulas instruit multiformes. Inter has ea præstantissima habetur, quæ gemino artificio vtrinque captiosa est. Liceat hic citra curiositatis affectatæ *Muscipula* notam rem hac ætate notissimam particulatim describere, cuius artificium reliquis aduersus mures excogitatis machinis decet anteferri. Tabellis plerunque fagineis curiosè læuigatis in capsulæ seu domunculæ oblongæ modum compingitur facie quadrangula. Tabellarum altera pavimenti loco supposita ternas suffulcit erectas in parietes, & nonnihil prominet in gradum; altera lacunaris instar superposita modicè porrigitur in subgrundas. Ostiolum claudit cataraëta siue foris pendula, quæ geminos vtrinque ferreos annulos tenuissimis è ferro clathris insertans breui linæ de longiusculo vecte, ceu tollenone suspenditur. Vectis hic ab ea parte, qua cataraëta adnectitur, crassior paulatim ita gracilescit, vt in mucronem desinat. In media superiore tabella defixus eminet cuneus bifurcus, qui vectem ferro filo traiectum ideo intercipit; vt ille susque deque versatilis cataraëtam attollat ac deijciat. In eadem extrema tabella sub extremo vectis mucrone foramen ferream lineolæ ad retinaculum circunuolutam, nec non summa parte reduncam, ima hamatam; vt superior vncus extremo vecti cataraëtam attollenti leuiter hæreat, inf-

inferior hamus escam tenaciter teneat, quam ubi subrepens musculus avidè ac mordicus arripit, repente reducto superiore retinaculo cataraetam in suam deijcit ruinam; incautæque gulæ reus popinam sibi vertit in carcerem, mox, geniali ac ludibundo carnifice fele, ridiculum saluatim supplicium luiturus. Posticum decipulum quò simplicius, eò funestius est. Unica laxior a tergo affixa tabella capaci murini capitis humili foramine in orbem fenestratur. Satis intus insidijs patet non ita magnum angulare spatium, quod in obliquum statuta muscipulæ anterioris tabula relinquit. Ima foraminis ora ternis eminulis ferreis aculeis armatur. Extimus itidem ex ferro radius partim à summa tabella ad imam latè recurvatus affigitur, partim iisdem aculeis transuersus libero ductu protenditur, cuius apex paulum ultra foramen porrectus ferrea linea supraque infraque foramen reflexis apicibus tabellæ infixæ cancellatim includitur. Funiculus ligneum cuneolum radio adnectit; quo violenter ad summam vsque ferreæ lineæ curvaturam in nervi morem adducto, altera cunei extremitas tenui lino alligata summæ tabellæ imponitur, vncò supponitur altera eius simillimo, quem in priore muscipula descripsimus. Hic etiam inferiùs hamatus subdolam escam offert, qua vix dum avido dente contacta emotaque, cuneus repente lapsus ex vncò radium laxat: ille magno impetu

petu ruens interceptum lurconis caput & subiectis
 aculeis affigit, &, supra quàm auiditas cuperet, in-
 felici epulo sistit. Sed, quoniam prodigiosæ fœ-
 cunditatis bestiolas muscipulis fallere anceps ac len-
 tus ludus est, ipsa sub esculentis illecebris latentia,
 præsentissima venena in perniciem irritantur; in-
 quibus auripigmentum siue arsenicum, vtpote pa-
 rabile, vñtatum admodum est. Equidem vene-
 nata ista remedia ijs relinquo vsurpanda, qui non
 metuunt, ne gulosi prægustatores mures tum es-
 culenta tum proculeta contagioso contactu hali-
 tuque suos vlturi venenarios inficiant. Tutius ego
 medicamentum suaserim, vitrum modicè tustum,
 aut gypsum recens in farinam solutum, vtrunque
 verò cum caseo, siue cum alio quopiam muribus
 expetito cibo subactum, ac per infesta loca in pa-
 stillos digestum. Illud enim angulosis asperisque pul-
 uisculis mollissima viscera erodit, insanabilique do-
 lore lancinat; hoc celerrima concrezione lapide-
 scens præcluso spiritu strangulat; neutrum autem
 contacta cibaria venenat. Sed cur domesticas ve-
 natrices, feles indictas præterimus? Præ cæteris ^{Optima felis}
 probantur colore leucophææ, pallida fuscaque ^{forma.}
 varietate virgatæ, prædatricibus nimirum tigribus,
 vt forma, sic indole simillimæ, quæ à Syria origi-
 nem & nomen trahunt. Istas enim, vtpote calida ^{Carda. De rer.}
 regione propagatas, temperatior sanguis ad mansue-
 scendum dociles, ad venandum sedulas facit. Le-
 gendæ

gendæ sunt ore toruæ , pectore torosæ , pedibus amplæ , toto corpore grandiusculæ , hoc est leoninæ magnitudinis generosa breuiaria , vt sesquipedales hostes aggredi , ac frustillatim comminuerent ne pertimescant ; natura mares , vt viriliter vim audeant in mures ; arte semimares , ne foris amicas sequioris sexus feles , quàm domi infensos musculos , auidius confectentur ; docilitate cicures dominisque tractabiles , non efferæ atque vncinatis vnguibus sanguinariæ mimæ ; assuetudine in ipsis procul excretis sordibus mundæ , non in medijs ædium munditijs spurcificæ ; educatione vigilaces , non solidum diem noctemque stertentes ; fidelibus excubijs totam domum perlustrantes , non latentis sub cinere igniculi sessiles custodes , Vestalis nempe superstitionis hæredes ; parco denique vilique cibatu ita famem tolerantes , vt hostilibus rapinis emeritæ vescantur , non herilibus damnis inexplébiles ventres immeritæ distendant . Sin autem iuuat lepido faciliq̃ miraculo furacem murem transformare in vindicem felem , sic facito . De nos duodenosue maiusculos mures viuos capito ; captos in amplum , atque ab esculentis prorsus vacuum vas , seu hôteile seu ligneum , includito ; idem vas , ne quod pateat effugium , probè operculato ; vnum tamen exiguum relinquito spiramentum , vnde , quid intus rerum agatur , arbitreris . Et rabi-
di quidem fame stimulante captiui mutuo se mor-
su

su absument. Tu verò subinde quot supersint explorato; vbi vnum reliquum esse compereris victorem, & consanguineæ carnis Thyesten, continuò per ædes liberum emittito. Is enim murina efferatus carnificina nihil tale suspicantes cognatos mures ad vnum omnes fele felicior, quia fallacior, breui iugulabit ac perdet. Adeo fames degenerat in furorem. Ita vltimo supplicio multatis domesticis latrunculis, ipsum iterum capito atque occidito carnificem; ne, qui generi suo non pepercit, in rem tuam escariam insaturabili voracitate grassetur. Post tragicam Thyestæ carniuori fabulam ab vno musculo cum plausu datam, nascentis è dentium fatu armatæ multitudinis, mutuis sese vulneribus concidentis, cruenta spectacula ferro concolor murina natio instaurabit; si scobem æris Cyprij cum fallaci pulcra deuorabit. Mox enim in rabiem acta è satis dentibus extitisse videbitur, velut olim armis pugnans fabulosa terræ filia iuuentus; quia sese morsibus inuicem lacesabit. Denique, vt vniuersi domestici mures domi naufragium faciant, oris angusti turgidique ventris vas oblongum & peramplum aqua ita oppleto, vt à summo labro palmum circiter distet; aquæ summam partem fluitante acere, siue supernatante gluma integito; triticeam farinam, caseique frustula vel scobem inspergito. Tum verò mures odore pellekti, ac solidam aquæ superficiem

ciem rati prono impetu saltuque in escam ferentur : sed incautis exitiali syncopa caseus vertetur in casum , liquido elemento grauia non suspendente vestigia . Ades iam animo genialis hortorum colone , & aure facili risuque liberali lepidissimam rusticorum murium capturam accipe . Circunuoluta membrana, quam Pergamenam appellant, plurimos turbinetur in cucullos circumplicatæ partis oræ conglutinentur, vel consuantur; pars verò ad hiatum eminentior pro murini capitis magnitudine in orbem æqualiter attondeatur. Hi cuculli, demissis ad inum casei nucisue iuglandis frustulis, summisque lateribus intrinsecus visco circumlitis, in scrobiculos paulò laxiores, propter murium foramina, sparsim effossos, sereno cæli, arido terræ statu ore tenuis defodiantur . Fiet enim, vt escaria illecebra decepti vaguli mures tota capita induant in cucullos; ac tenacissimè adhærente visco, dum cæco ingressu perreptant, virgarum ictibus debilitati à vestigatoribus, nullo negotio capiantur chartacei monocerotes, sine vulnere capite diminuti . Iam verò tempus est, quamuis pusillos, agrestes hostes arcu petere ac ballista . Et hic sanè arcus arcuatæ pedicæ, qua ficedulæ falluntur, non absimilis tum maximè vulgatus est, tum minimè operosus . Vt autem maioris operæ ballistas conficias, virgas duriusculas in complures arcus recuruato; lineum neruum singulis prætendito; graciles arundines duode-

Ballista in
mures .

duodenos quindenosue digitos longas in geminam
cuspidem ordine opposito bifurcam exacuito: supra
cuspidem alteram ad quinque digitorum interual-
lum arundinis vtrinque perforata crassitudine ita
funiculum traicito, vt alterum laxius foramen fu-
niculi nodum extremum intra inanitatem ipsius
arundinis admittat, ex angustiori altero funiculus
totus propendeat. Ad hæc laxioris arundinis, quæ
gracilem priorem cum funiculo capiat, palmare
internodium sub ipsis nodis præcidito, vt summa
pateat pars, imam genicularis cartilago tenui ligno
inarefcens penitus occludat: ab ipso statim genicu-
lo binas è regione fenestellas musculus peruias ape-
rito: supra istorum foraminum alterum à summo
arundinis ore quaternorum interuallo digitorum
transuersam crenam altè imprimito, inferendum
intenti arcus neruum excepturam: in laxiorem
arundinem eundem gracilem calamum sic demit-
tito, vt traiecta funiculo pars imo sit propior inter-
nodio, ipse verò funiculus ex ore summo laxæ arun-
dinis cum gracili calamo simul emineat: arcum
gracili præfigito: neruum crenæ inferito: funicu-
lum elato intentoque arcu eò vsque adducito, do-
nec ima calami culpis ad fenestrati foraminis, quod
ille obstruebat, summam partem reuocetur: fu-
niculo ipsi, vbi foraminis initium attingit, herba-
ceam tæniam adalligato: eandem ante medium
foramen recto obiectaculo ductam sub imum latæ

arundinis nodum reflectito: muscipulam hanc sic aptato, vt modicè prono depaſtoque in terram, cum herbeo vinculo arundineo nodo, quà liberum eſt ab herbulæ mōra foramen, agreſtis muſculi cauernulæ continuetur: ne quis autem hinc atque hinc exitus pateat, vtrunque latus aggerata humo ſaxu- liſque congeſtitijs obſtruatur. Ita muſculus in egreſ- ſum obnitens, extrinſecùs obiectæ herbulæ reti- naculo præroſo, in ſuum caput iam arundinis cauo inſertum cuſpidem biſulcam arcu premente rui- turam laxat; ſibiſque, dum maximè conſulit, mini- mè cautus vitæ ſilum cum herbula recidit.





Ne principis horti funestissimo exemplo hortis omnibus execrabilis anguis in herba subdolè lateat; sicut olim in pomo, ita nunc in flore crudeliter niteat; cum floriferis radicibus sese importunus defodiat, calida in latebra hibernaturus; cum germen horrendus erumpat, tepido sub cælo vernaturus: vramus galbanum, cerui capræque cornua, caprinæ quoque ungulas & pilos, iuniperum, radices lilij, styracem, nasturtium, & rutam ex veteri; at ex recenti consuetudine corium veteresque calceos, ranas quoque luridas rubetasque fugaturos, & quicquid odoris grauitate dispellit, accendamus: tribulum herbam ex aqua tritam immittamus in latibulum: inimicissimam serpenti fraxinum, si locus ferat, asseramus: amicissimam hederam, & saluam distineamus. Ne rei hortensi etiam improbulæ auiculæ, dum sese sicco puluereoque à longa serenitate solo perfundentes plumam penasque emundant, atque (vt Ephesius Heraclitus ait) dum puluere lauantur, suffossis vbique fossulis hortorum plana subuertant, neue teneros florum thallos defringant: allium sponte nascens in aruis, quod Alum vocant, ne regerminet, incoctum, sicut prisca solebant, in hortis exponamus; vt quæcunque deuorauerint aues, continuò stupentes & consopitæ manu capi facilè possint. Ad earundem stuporem capturamque lappæ semina ingeramus: herbæ quinquefolio simillimæ, quam à foliorum

Remedia in
serpentes, &
rubetas.

Consiant. Pog.
De Agric. l. 13
c. 8.
Pallad. l. 1. sit.
35.
Plin. l. 8. c. 32.
l. 28. c. 10.
l. 24. c. 8.
l. 12. c. 17.
l. 20. c. 13.
l. 16. c. 13. 34.

In auiculas.

Apud Colum. l.
8. c. 4.

Plin. l. 19. c. 6

Io. Bapt. Porta
Mag. natural.
l. 15. c. 8.

Apul.

numero heptaphyllon, nouoque vocabulo tormen-
tillam nominant, valido vino incoctæ frustula cum
esculentis feminibus per hiemis præsertim frigora
niuesque obijciamus: cum hordei granis pultem
ex hordeacea farina, hyoscyami feminibus, & felle
bubulo temperatam apponamus: hordeum itidem
cum hyoscyami feminibus & muscarijs fungis in
pulticulam permistum offeramus: triticum, aliud-
ue auius expetitur semen cum aqua seu vino
stillatio, cum quorum alterutro prius aut simul
nigrum helleborum inferbuerit, inferuefactum
assiccaturumque spargamus: auesque obstupefactas
aceto rostris affuso, si libuerit, excitemus: easdem
(quod rustici nostrates solent) ingrato sulphuris
suffimento abigamus; vel prisco nouoque more
mortuarum auium mobile terriculum suspenda-
mus, vt viuæ metuant, ne sibi quoque ipsis pen-
dulo supplicio vacillandum, hoc est sine vita vo-
litandum sit.

Contra minutos hostes machine.

CAPVT IV.

HUc recidit humani fastigium dominatus,
vt præstantissimum hominum genus
cum belluinis Pygmæis, & quidem anci-
piti infelicique nonnunquam exitu, belligerare ne-
cesse habeat. Hinc, tanquam cum Gigantibus de-
præ-

præliaturi, pro pulcherrima charissimaque florum
natione contra vermiculos operosas naturæ artisque
machinas expeditimus. Adeo quodcunque mon-
strum, quamvis exiguum, ad iniuriam magnum
est. Te verò manet in primis cruca, te limax,
inexplebiles florum parasiti, par sceleri supplicium;
vt vnde innoxia apes delibant vitale mel, vos feri-
fures lethale fel degustetis. Et erucam quidem aui- In erucas.
do morfu folia floresque absumentem, subterraneo
ingressu hærens radicibus solum subuertentem,
venenato contactu plantas adurentem sic arcebat
antiquitas. Spargenda semina herbæ, quæ sedum Colum. l. 10. c. 3
appellatur, succo, vel ipsarum erucarum sangui- Pallad. l. 1. tit. 35.
ne madefaciebat: frequentius tamen, utpote pa-
ratius remedium, adhibebat puluerem, qui supra
cameras inuenitur, vel etiam fuliginem, quæ su-
pra focos tectis inhæret. Pridie igitur, quàm satio
fieret, alterutrum cum seminibus commiscebat, &
aqua conspergebat, vt succum tota nocte combi-
berent; sic macerata postero die ferebat, ac plan-
tarum incolumitatem percommodè tuebatur. Sin Plin. l. 19. c. 10.
erucæ natæ iam essent, decocti absynthij, sedi, aut Colum. ibidem.
marrubij succum inspergebat: palo imponebat in Pallad. ibid.
hortis equæ iam fœtæ, aut etiam asinæ caluariam:
fluviales cancos pluribus in locis intra hortos vel
suspendebat, vel clavis configebat: scillæ bulbis aut
suspensis, aut confitis minutas hæc pestes auerte-
bat: sanguineis virgis ea tangebatur, quæ nollet ob-

noxia erucis esse. Cæterum locuples inter Græcos author Anatolius bestiolas easdem fugat vitigineo cinere aqua triduana insuccato, plantisque hortensibus asperso; vel bitumine, ac sulphure, aut etiam fungis sub nucis arbore nascentibus suffumigat; uel ficulnei cineris lixiuio semina præmacerat; vel alterius horti captis erucis, & aqua cum anetho decoctis refrigeratisque hortos inspergit: sed attentè cauet, ne aqua illa malefica faciem manusue contingat; vel certè vrinam bubulam, & amurcam pari mensura mistas feruefacit, atque, ubi mox refrixerint, medicato imbrey germina omnia irrorat; vel tandem vespertilionis simum, atque alij fusticulos per vniuersa horti spatia comburens erucas latè diffuso nidore præfocat. Virides erucæ sunt, quas cum Hesychio doctissimo grammatico, atque cum Vlyssæ Aldourando Græcas Theophrasti præfocurides esse conijcimus, hoc est porricidas, nec non florea pulchritudinis parricidas. Dira hæc animalia ita veteres coloni Diophanis consilio insectabantur. Veruecis recens occisi ventriculum suis adhuc sordibus plenum eo in loco, qui bestiolis istis maximè scateret, humo leuiter obruebant. Post biduum ibi animalia hæc aliaque gregarim coacta reperiabantur, quæ vel aliò deportabant, vel eo ipso in loco, ne rursus erumperent, altissimè defodiebant. Hoc bis vel tertio cum fecissent, nocentium bestiolarum genus

*l. 2. de Insect.
a. 9.*

Pallad. ibid.

nus omne pessundabant . Verùm de veterum tãan multis vnum posteritas in primis probat , vsurpat- Colum. l. 11.
que remedium ; manu videlicet erucas colligit , vel c. 3.
matutinis horis hortenses frutices succutit : vt , dum adhuc nocturno frigore torpent , facilè decussæ protritæque frigida penitùs morte torpescant . Poteris quoque galbanum , aut caprarum vngulas , aut cornu ceruinum à secundo statu auersus incendere , vt abigas ; vel florum cæspites ac thyrsos intortis paleis coronare , quibus , velut obiectis laqueis , subrepentès erucas implices , atque à cæpta via reuoces . Debes præterea , quæ poteris inuestigare , folia in sese conuoluta , atque intus araneosa lanugine obducta comburere , quippe quæ erucarum ouà concludunt , verno Martij mensis tepore , noxios fortis exclusura . Si consitum fictile ex humo perforata , ex ambesi folij florisue accisis reliquijs verminare , atque erucis infestari animaduertimus , pigeatque intestinum hostem non sine radicis incommodo curiosè peruenari ; in amplum vas , quod frigida oppletum sit , ipsum fictile quaternos infra aquam digitos demergimus , atque ad quartam horæ partem insuccari sinimus . Mox infusi humoris intolerantes vermiculi plerunque emergunt ; quibus occisis vas educimus , conceptam aquam paulatim transmissurum . Illud autem periculo ipso exploratissimum est , circumluente humore non modò radices non lædi , verùm etiam

In limaces, &
cochleas.

Pallad. ibid.

l. 1. cap. 4.

In lûbricos.

l. 1. c. 6.

eodem dilapso emotam suspensamque ab intimo
crucarum reptatu atque cuniculis humum salubri-
ter densari, & foramina conniuere. Aduersùs li-
maces & cochleas olim vel amurca recens, vel ex
cameris petita fuligo spargebatur; nunc ipsas, vbi
vel humida nox, vel antelucanus ros, vel austrinus
dies, vel amicum substillum ad pabulum euocat,
lentus nostrorum colonorum specularatus vestigat,
ac deprehensas opprimit, siue (quemadmodum
præmonui) delitescentes quæ limaces, quæ crucas
relicta per vestigia indagat, humumque cautè scal-
pit ac rimatur, vt citra plantarum iniuriam no-
centissimas bestiolas intercipiat. Neque enim
tanti putatur esse (quanquam est, qui dissentiat)
obductam terræ cuticulam interseindere, fibram-
que aliquam intercideret; vt vulnusculis istis nocen-
tiorum bestiolarum interitus redimendus non sit.
Huc adde, sub tellure summa plerunque defossas
leui atque innoxia fossione refodi: nec posse radi-
cibus confitas areolas, quemadmodum fictilibus
medemur, circumfusi humoris alluuie ab infestis-
simis vermiculis liberari. Ne lumbrici, sordida
terræ intestina, excitato egestoque solo nitidissimis
in hortis turpiter existant, neue æquissimas areas
tere brent ac subruant, aut infelici complexu radi-
ces enecent & putrefaciant; humum fuge (vt priùs
docui) humidam, stercorosam, ac pinguem,
vermium feraciorem, quàm florum: mediocrem ve-
rò

rò elige, cuius è cribraria farina perraros vermiculos (siqui tamen fuerint) & angustum incerniculum, antequam transmittantur, & fortè transmissos cauta incernentis manus excernet. Siquos autem largior pluvia procreauerit; pluuiò cæli statu non-nihil extantes, humentique auræ obuios penitus extrahes atque maſtabis. Nonnulli ante ſationem exitiali lumbricis vulgari lixiuia ſolum inſuccant.

*Phyſſ. Aldour.
De inſect. l. 6.
c. 6.*

Sed iſtam arborum conſitoribus medicinam relin-quimus, ſorum cultoribus minimè neceſſariam, vt qui cribro manuque hortenſi vermiculationi feliciter medentur. Ne quod tamen è validiſſimis tormentis intactum indiſtumque prætereatur; ſalſa omnia atque odorata ſic odit fugitque inſulſum hoc ſœdumque animal, vt ad ipſorum contactum contrahatur ac pereat. Aqua etiam can-nabinis folijs ac ſeminibus incoctis medicata ſi ter-ræ affundatur, lumbricos ad ſuperficiem euocat, ſiue odoris illecebra obuios, ſiue odio fugitiuos. Sed nihil æquè fugat, ac viuæ calcis inſuſu efferueſcens aqua. Hac ergo ex hortenſibus ſemitis (neque enim expedit areolas floribus obſitas præferui-do liquore contingere) reptantia monſtra non ſi-ne riſu ita exterminabis. In lumbrici foramen re-cens immiſſa macerataque calce efferueſcentem, & venenatam aquam per infundibulum transfundes. Statim ille liquidam peſtem odoratus per aliud, & quidem diſſitum, foramen euadet. Ita reliquos
mea-

Id. ibid.

In vermiculos bifurcas caudæ.

meatus si potentissimo liquore perfuderis, totum latè hortensium viarum solum citra sumptuosam artificum operam opere vermiculato ridiculè distinguetur. Vt è confita fictilis humo abditum & penetralem lumbricum elicias; in dehiscens foramen furculum immittito, leuique percussu idem vasis latus aliquandiu tundito: mox alia ex parte lumbricum erepere videbis. Terrestris ascarides, idest subterraneæ pestes, ac breuius alterum quàm candidi, quàm lutei, quàm nigri coloris lumbricorum genus, quòd subsectis fibris plantas enecant, prioribus lumbricis nocentiores sunt. Omnium verò vermium, vt maximus, ita nocentissimus est cucurbitarius vermis, qui cucurbitarum semen arrodit, nomenque surripit; vt nostrate vocabulo latinis auribus peregrino Zuccarola nominetur. Vtri que occulto malo sic medere. Vbi plantam demisso capite languidam, amisso virore pallidam ægrotare animaduueris; humo ad radices vsque cautè curiosè effossa, edacem morbi causam, ne illic vltra læuiat, alioque serpat, extingue. Vt vermiculos, quos à cauda bifurca Forficulas appellamus, simul plurimos excipias, humi furculum offigito; hircinum cornu, vel suillam ungulam, vel arundinis laxum internodium suo supernè tantum nodo distinctum præclusumque, nonnihil à solo sublime imposito: vermes enim latebricolæ in eam sese confertim latebram conglobabunt.

Iam

Iamverò cunicularim ducta circumfossura suspensis, ^{In formicas.}
 frequentique morfu exesis seminibus perniciosissimas formicas (vt Theocritus ait) numeroque modo- ^{In Syracusan.}
 que carentes quis qua potentia in singulis agminibus exterminet vniuersas? Ipse bellicosus Imperator Constantinus Pogonatus, terra marique victor, post Arabes Sarracenos debellatos formicinum bellum suscipere, tanquam principes Myrmidonas expugnaturus, sibi censuit gloriosum. Igitur ex Bithyni Diophanis rusticæ rei consultissimi consilio hisce præceptis posteros colonos veluti conductos milites armat in istas exiguas quidem, pugnacissimas tamen leuis armaturæ bestiolas. Si captas, inquit, formicas ^{De agricult. l. 13. c. 10.}
 aliquot vsseris, reliquas fugabis. Quanquam ego ignem, belli terrorem maximum, atque adeo vnum renascentis hydræ domitorem, ad fœcundiores hydra formicas penitus fugandas profligandasque inualidum esse frequenti periculo comperi; quippe qui torre ac face non semel armatus quò plures perurerem, eò pluribus solum scatere cernerem. Quamobrem ideo contempto igne cæterarum generosissimas Romanas esse formicas existimaui, quòd popularem suam Scæuolam æmulentur. Præcipere pergit Imperator: Formicas è cauernulis exturbabis, si cochlearum vacuas testas ^{Pallad. ibid.}
 cum styrace vltas cominutasque ipsarum agmini aspergas. Peræquè abiges, si contusi origani sulphurisque puluisculo foramina oppleas. Si formicam

cam è gregalibus vnam sustuleris, reliquæ vltro latebram relinquent; Græculæ fortasse: nostrates enim adeo meticulosæ non sunt, vt vnus exitio vertantur in fugam; nec adeo modestæ, vt loco decedere, & concedere dominis velint. Si cedria exteriores cauos circunleueris, hortenses areolas formicæ non ingredientur. Si Cyrenaicum succum, siue laser oleo dilutum ipsis affuderis, omnes ad vnam interimes. Si radicem siluestris cucumeris, aut silurum, præcipuè Alexandrinum, lento vapore succenderis, inimica suffitione mactabis. A floriferis verò fruticibus arbusculisque audaculas prohibebis, si trunculos alba terra rubricauit circunscripseris; si lupinis amaris in aqua tritis aut incoctis, vel felle taurino & pice cum amurca temperatis, vel certè confusa pice cum rubrica, vel permisto lasere cum aceto illeueris; aut si postremum hoc medicamentum in foramina ipsa conderis; si præterea caudicibus siluestre origanum, Pli. l. 17 c. 28. circunposueris; si albam lanam circundederis; si coracinum piscem de arbore suspenderis, quo iuxta in vnum locum congregantur. Atqui si densa hedera caudices obligaueris, post paulò formicas, imò & scarabæos hederacea sub vmbra torpidos, supplicioque opportunos inuenies. Ita magnus contra formicas militat Imperator, cui prisci sapientes hæcæ superpetias ferunt. Limbo marino, aut cinere formicarum foramina obturant; efficacissima

sima heliotropij herba , aut rubrica & cinere in
 aceto intritis formicas ipsas enecant ; aquam diluto
 latere crudo iisdem ingratam affundunt . Si for- Pallad. l. 1.
tit. 35.
 men habent in horto , cor noctuæ admouent ; si
 foris irrepunt , totum hortense spatium cineris aut
 cretæ candore denotant . Ne floriferas in arbuscu- Pli. l. 17. c. 26.
Pallad. maro.
tit. 10.
 las conscendant , rubrica & pice liquida imos cau-
 dices perungunt , quibus alij butyrum admiscunt Colum. l. de
arbor. c. 14.
 vel vnica perfundunt amurca ; lupino trito cum
 oleo fracibusue radices oblinunt ; vel bitumen cum
 oleo incoquunt , eoque truncos tangunt : succum Pallad. octob.
tit. 11.
 portulacæ cum aceti dimidia parte permistum ,
 aut vini sæcem , peculiare ceraso remedium ad flo-
 riferos caudices medicandos traduci posse osten-
 dunt . Aetas nostra semelo osse , siue quo alio ef-
 culento illicio sæpius in vnum coactas toties fallit ,
 donec omnes aqua vel igne perdat . Cum præterea
 sollicito excursu recursuque it nigrum campis ag-
 men , & multiiuga scaturigine ebullit , è ramalibus
 stipulisue parabili face occupat , iteratoque aliquo-
 ties supplicio tandem conficit vniuersas : penetra-
 les ipsarum cauos origano minutatim detricto im-
 plet : sulphure suffumigat : tithymali cuiuscunque
 decocto vtiliter inspergit : papaueris lacryma ace- Petr. Bellon.
l. De neglect.
susp. cul. c. 10.
 to diluta perfundit , aut florum stylos inungit :
 sulphuris selibram terreno in vase ad ignem lique-
 facit ; adiicit salis factitij ex sæce vini concreta ,
 quam Tartarum vocant , aut salis cinerum qua-
 dran-

drantem vel trientem, hoc est ternas vncias aut quaternas; diu peragitans bene commiscet, donec ea mixtura subrubeat; tum ab igne subtrahit, et supra tabulam aqua madentem defundit; ubi iam induruerit; minutim conterit; ipsique in vitreum vas coniectæ, quantum aquæ fontanæ sat est, affundit, eamque patitur aquam colorari; hoc denique veneno floriferarum stipites arbuscularum circumlini, aut ipsarum formicarum agmina conspergit; importunasque bestiolas vel interitu vel fuga exterminat. Curiosa quoque minutaque demolitione latibula & nidificia subruit, atque oua cum matribus vel protinus exurit, vel procul exportat. Noua denique forma fictile vas excogitauit, medio foramine supraque infraque peruium, in extremo autem ambitu canaliculatum. Intra hoc mediam ferit arbusculam; oppletoque aqua orbiculato canali, tanquam militari fossa, formicinas distinet aggressiones. Sed argillaceum hoc propugnaculum (pace recentis industriæ dixerim) mihi non probatur. Quænam enim ista calliditas est, ut hostem arceas, liberam plantarum adolescentiam coctili carcere, & figulari compede impedire? hortensis æquoris inoffensam speciem testaceis offendiculis asperare? cuniculis oppugnantes bestiolas extimo munimento distinere? Quare positos in areolis flores præscripta satis remedia defendent: quos autem in testulis collocaueris, ipsarum in pedibus, aut
sup;

Benedict. Curt.
de Hort. l. 14.
c. 5.

suppositis basibus excauari canaliculi abunde præmunient, in quos, velut in elices siue sulcos aquarios, aqua vel pluuia vel irrigua confluet, minutulis animalculis oceanus insuperabilis. Si volatilis hortorum pestis, locustæ in flores inuolent, hortatore Democrito, amaro lupino, aut siluestri cucumere in muria seruefacto conspergantur: è vestigio enim morientur. Complures captæ vrantur: statim enim reliquæ à nidore vertiginosæ & caducae partim occident, partim demissis alis venatorem expectabunt; vel, hic si deerit, à sole corrumpentur. Confecto ex iisdem liquamine, & quodam veluti garo effossi scrobes madesiant: breuile enim in scrobibus somno sepultæ, funeri videlicet proludentes reperientur. Suspendiosi vespertiliones de celsissimis loci arboribus pendeant: & illo tericulo fugatæ minutæ harpyiæ procul auolabunt. Absynthio, aut porro, aut centaurea in aqua tritis plantæ contingantur: & contactu edacissimæ bestiolæ abstinebunt. Denique matutinus indagator colonus nocturno adhuc frigore pigras ac torpidas inuadat: & citra veterum arma & machinas in exarmatis manibus volucris de hoste victoriam positam esse fatebitur. Cantharides non hominum modò igneum, sed florum etiam edax venenum (si Pamphilum audiamus) vel galbano cum veteri bubulo fimo, vel siluestris cucumeris radice suffitas fugabimus. Quamquam recentium

In locustas.

Confrant. Pag. l. 13. c. 1.

Pallad. l. 1. tit. 35.

In cantharides.

Apud Confr. Pagon. l. 13. c. 16.

T

rusti-

In scorpiones.

Id. l. 13. c. 19.
Plin. l. 20. c. 23.

In virides pulices.

Callad. l. 1. tit. 35.

rusticorum experimento docemur, ne fugatae redire ad iniuriam possint, callide comprehensas vtilius interimiri. Sub hortensibus testis defluente earundem humore concreti, iuxta floribus indecori, atque cultoribus periculosi scorpiones saepe stabulantur. Humidis opacisque locis gaudentes igne persequere: vnius exusti nidore ceteros exturba: latibula sulphure, galbano, asinique vngula, vel vnico serpyllo, serpentibus etiam atque scolopendris infesto, suffumiga: ipsos praeterea scorpiones alligata imis fictilibus nuce auellana e Plutarchi monitu distine; ex recenti vero usu ad parinam frigida oppletam allice, ut perdas: aut identidem testas loco dimoue, ut latitantes proteras. Virides pulices, qui roseti teneros asparagos, & virentes rosarum alabaistros confertim obsident, nocentique actu arefaciunt, atque adeo perurunt, acre acetum hyoscyami succo admistum, pulicosis olim oleribus praescriptum remedium, enecabit. Eandem operam praestabunt sinapis, & rhododaphnes semina, si conferuescant, & cum refrixerint, affundantur. Sunt, qui doceant, floris odoratissimi parricidas olei graecolentis illitu, quod a saxo nomen habens Petrelaeum siue Petroleum vocant, velut iusto supplicio esse multandos. Aliqui sabulonis, aut cineris iniectu deiiciunt ac dissipant. Alij tandem summa mollitie animalcula leui digitorum pressu frictuque grauius oppri-

primunt & elidunt. Fœdi vermiculi seu blattæ bulbosâ radice formosis lilijs quâ satiuis, quâ siluestribus, quâ nostratibus, quâ externis degeneri partu innascuntur. Hæ rubent ab ortu: sed postquam folia floresque cum scapis erosere, nigrescunt; ac semesum liliacæ plantæ cadaver terra ventris proluvie inficiunt, depastosque caules turpi facie relinquunt. Id ne fiat, supposito plantis linteolo recentes bestiolas decute; atque, ne adolecendo conualescant, extingue nascentes. Hisce potissimis armis (nec enim omnia possumus, nec probamus omnes) maiorum minorumque gentium incommodas hortis belluinas nationes singillatim vel vlciscimur, vel depellimus: generatim verò atque vniuersè omnia reptantia monstra sic insectamur, & proturbamus. Opium Cyrenaicum, siue laser, melanthion, galbanum, hyssopum, pyrethrum, peucedanum, sulphur, cerui cornu, & capræ vngulam vnâ contundimus: asperriamo aceto perfundimus: in pilulas conglobata succendimus, cruciabilemque fumum excitamus. Omnes itidem repentes humi bestias galbano, sandaracha, & butyro, siue adipe caprino suffitas procul à floribus amouemus. Inter odorata vnum styracem adhuc inuenimus, cuius deusti odore acerrimo vniuersa ferme animalia, quæ vocamus ab incisuris Insecta, vaporemus ad fugam. Ne suam ipsi calamitatem, infestas nempe bestio-

In blattas
bulbaceorum
liliorum.

In omne ge-
nus bestiolas.

Consiant. pag.
de Agricult. l.
13. c. 8.

Id. ibid. c. 9.

Card. de rerū
variet. l. 7. c. 30.

Pallad. l. 1. tit. 35.

Id. ibid.

Consulat. Pog.

Agric. l. 5. c. 48.

et l. 10. c. 39.

Idem De Agr.

l. 3. c. 16.

Id. ibid.

las horti prognerent, deponenda semina in testudinis corio siccamus; aut mentam olitorio more interferimus. Ne floriferis satis arbusculisque hortensis vlla bestia noxæ possit esse, ex Democriti præscripto caneros fluuiatiles complures, vel marinos, quos paguros nominant, decem non minùs intra fictile valculum in aquam coniectos tegimus, atque sub dio statuimus; vt decem diebus sole vaporentur: ea deinde aqua, quæcunque illæsa volumus, aspergimus; atque octauo quoque die aspersionem iteramus, dum, quæ seuimus, adoleuerint. At verò si Africani consilio paulò ante sationem sedi succo, quemadmodum tradidi, semina madesiant; non modò aduersùs infestas bestiolas medicamentum, verùm etiam ad præstantissimos flores producendos valetudinem combibent. Perinde salutaris deponendis seminibus erit aut pridie immista, quæ focis hæret, fuligo, aut portulacæ aqua sic affusa, tota vt nocte sorbeatur. Nonnulli contusa cupressi folia, siccum alij & concisum, siue etiam elimatum cerui cornu, aut elephantis dentem cum seminijs commiscunt: alij medicata prædictorum infusu ossium aqua semina irrorant, vt noxijs animantibus nullis obnoxiam sementem faciant. Proderit etiam aqua & amurca eadem semina macerare. Genialis medicus Apuleius, vt minùs ægrorent, vino ferenda præmunit. Vsq; adeo, quæ aqua lactantur, medicinæ

cinæ nomine vinum sitiunt. Inuenio etiam à quibusdam vrina veteri, & canino fimo vnà confusis affusisque contra noxam quancunque semina defendi. Eadem hyenæ pelle si contegantur, post *colom. l. 2. c. 9.* aliquot dies metuendæ feræ odore penitus imbuta noxias hortis animantes deterrebunt. Solent præterea, quæ dimidiata luna seruntur, illæsa seruari. Vt omnem præterea floribus nocentium bestia-*cardan. ibid.* rum defendamus ac propulsemus iniuriam; aceti, fellistaurini, decocturæ anguinei cucumis, hellebori albi, colocynthidis, & lupinorum amarissimo sapore; aut sulphuris, chalcanti, florum & foliorum vtriusque sambuci, coriandri, rutæ, cornuum, & vngularum grauissimo odore; aut demum ignis intolerando contactu absterremus. Duplici antiquitas præsidio (vtrunque posteritas *id. ibid.* oblita est) pice videlicet ab aëris, amurca ab animantium noxa omnia tutabarur. Adeo, nisi nos antiquæ simplicitatis puderet, parabilis atque obuia rerum tutela esset.

Lex floris propagandi.

CAPVT V.

F Auete linguis, imò & manibus fauete impigri coloni, prouida faultrice vestra, hor-
torumque magna moderatrice Flora,

T 3 ter-

Flures indu-
stria duplici
propagandi

Qui reservadi
ad semen.

tertiam legem, emolumento principem, sic ferente. Qui floreas opes natio scenore fructuosas non amplificas, ab hortensi cultura tanquam profanus, nempe ignavus exesto. Quoniam verò domi forisque opportunitas est horti locupletandi: propterea duplex in propagatore industria requiritur, ut flores domesticos augeat, externosque conquirit. Quamobrem non omnes indiscriminatim ac temere flores tuis in hortis demetes; sed ex lectissimo quoque genere nonnullos, qui magnitudine ac foliorum densitate speciosissimi primò existant, ad semen reservabis. Prior enim ille partus adhuc integris nondum effortæ plantæ viribus effusus cum vegetior sit, generosius luxuriabit in semen. Quin etiam proderit seminalibus folliculis onustos bulborum, scâpos decacuminare, simul ne bulbi complurium educatione seminum fatiscant, simul ut pauciora liberaliùs educata semina colonorum votis fecunditate respondeant. Et seminum quidem plurima bulbis rotunda, & nigra; pauca plana, & rubida, ut lilijs non paucis, & meleagridi siue fritillariæ; utraque autem folliculis inuoluta; aliqua oblonga, & fulca, nec non siliquis inclusa, ut acaciæ, Indicæ arbusculæ; multa longiuscula, rubella, atque in lanuginem conglobata, ut cuilibet anemonæ. Ea omnia iam aridis cum folliculis, aut siliquis, aut certè cum lanuginosis pappis vixdum hialce-

re incipientibus colligantur, priusquàm spontè
 caduca, aut vento decussa temere dissipentur.
 Conducit autem ea legere interdiu, cum pluuius
 aut irroratus mador efficaci sole siccatus est. Per-
 magni quoque interest hortensis rei optimorum Quo semine
ferendi.
 seminum habere delectum. Præstant, quæ pro- Colum. l. 2. c. 9.
 pter magnitudinem ac pondus in imo subsederint:
 quia vis maior, & succus densior inest ad vberem
 germinationem. Ad hæc indubitato fecundita- Constant. 'Pog.
Agric. l. 2. c. 14
Varro in rust.
l. 1. c. 40.
 tis argumento plena & solida seligantur: at verò
 tanquam infœcunda & inutilia reijciantur, quæ
 senio sint exueta & leuiora, contusa & rugosa,
 emaciata & languida, permista & propter simi-
 litudinem adulterina. Altera est, & ea quidem E bulbis ut
multiplicâdi.
 comperidiaria propagatio; cum bulbus aut radix
 in cohærentes bulbulos aut radículas extuberat,
 quæ celerius, quàm lecta de bulbis aut radicibus
 minuta semina, in idoneam ferendis floribus matu-
 ritatem adolefcunt. Quanquam illud à seminum,
 satum iucundissimum emolumentum provenit, ut
 floris moram coloris formæque non rarò degene-
 rantis mirabili nouitate compensent. Luxuriant au-
 tem numerosam in sobolem bulbi & radices, quæ
 post alterum tertiumue (vti iam docui) à satum annum
 refodiuntur. Sed intelligant nimis auidi sobolis co-
 loni adnascantium sætuum copiam florum officere
 formositati: primo enim in partu exhausta mater
 facilè abortat in altero. Quare quem plusculum

laboris non deterret, singulis hic annis, quæ id exigunt, effodiat infodiatque semina; ut parcius enixa viuidæ pulchritudinis plenissimo flore colorentur. Quod si bulbus frequenti etiam inter homines infelicitate quàm nobilis, tam sterilis est; cum probè maceratæ resolutæque pinguedinis solo, ad nucleos siue spicas eliciendas efficacissimo, cõmittito; aut imam sessilis partis coronam, vnde fruticant fibræ, vngue leuiter incidito, minimasque decidito particulas: ne vulnus noxæ sit, macro aridoque puluisculo insperso medicinam facito. Quot enim vulnera feceris, in totidem fœtus vigor genitalis erumpet. A mollioris tamen ingenij bulbis violentam hanc fœcunditatem exigere, abstineto; ne, antequam pariant, vitæ faciant abortum. Cæterùm cui cordi est hortensem quotannis fundum præstantissimorum florum accessione ditare, is debet florida tempestate nominatissimos alienos hortos frequens adire: quos in suis desiderari animaduertit insignes flores, aut gratuito accipiendos, aut pretio aliorumue seminum merce permutandos cum domino pacisci: ferreo tubo, vel imbricata pala siue extractorio imbrice, quem supra descripsi, dum adhuc illi vigent ac vernant, transducere, aut saltem denotare; ut, vbi penitus aruerint, certa manu eruat. Multiformes excogitari notæ possunt: nos vsitatas & parabiles, idest arundineas, furculaceas, & plumbeas

In alienis
hortis ut eli-
gendi, & præ-
signandi.

L.II.5.

beas tum in colono instituendo; tum in hortensi suppellectile numeranda præmonstrauimus. Sin autem suspicio est, incertæ fidei promissorem impositam placito flori notam ad simillimi vultus vulgarem plantam translaturum, tibi que vassè impositurum; poteris è Belgio in Galliam transfusa callida cautione sic obsignare. E crassiore alearum, aliaue illiusmodi papyro latum circiter digitum amplas tesserulas facies. Easdem medias per geminum foramen acu factum inducto lineo filo sic traijces, vt in eandem partem vtrunque fili caput promineat. A tergo, vbi filum papyro adheret, liquefactam miniatulam Hispanam ceram adiunges, & confestim sigillo consignabis: tum vtrunque lini caput vtraque manu comprehendes; ac, tessellæ signatura extante, imum floris caulem citra noxiam incisionem innodabis: quod supererit filum, sub ipsum nodum succides, ne, vinculo enodato, supposititiæ plantæ per dolum adalligari tesserula possit. Cauebis autem, ne demutilato caule summum florem, aut media folia demas; vt obice illo supernè clausum nulla fraus alligatum extrahat signum. Quòd si demesso flore thyrsi cacumen præcideris; eundem cum folijs aliquot substringes, quæ connexæ tesserulæ lapsum exitumque remorentur. Denique, ne electè notata in hortis improuidè obliteres in animo, in hortensis rei rationarium codicem, hoc est in album me-

morie

E longinquis
ut accersedi.

moriar delectorum florum genera, numerum, situs, notasque impositas referes. Ita, cum tempestiuitas aduenerit, pactas radices sincere atque integras fide certa effodies. Vnas tulipas, si libeat, licet (quod transalpini aliqui coloni solent) adhuc florentes eruere: dummodo statim sicco sabulo in frigida cella substrato bulbos obruas, ipso etiam in sabulum prono germine. Fiet enim, ut, quæ floribus, quæ folijs sensim assiccatis, solidas, succique plenas, atque incolumes bulbosas radices inuenias. Quoniam verò terræ omnes ferre omnia non possunt, debemus hoc etiam hortis, ut suauissimo florum commercio, tanquam floreo nexu, diffusæ non minùs moribus, quàm regionibus gentes arctissimè coniungantur. Igitur ubi peregrini floris fama florere externum quempiam colonum cognoueris, inita per ingenui officij promissique plenas litteras amicitia, pretiosas horti longinque merces pari permutatione, pretioque mercaberis. Quòd si displicet remota ista, semper cæca & sæpe fallax mercatura; exiguum patere, dum aliorum curiosa festinatione colonorum translatum in proximis hortos aduenam florem in tuos oculata fide, minimoque labore ac sumptu admittas. Curabis præterea, cum, soluto remotoque tristi niuium stipario, infinita, eaque versicolore florum multitudine frequentari cernuntur solitariae camporum, ac montium scenæ, ut, qui generis aut formæ nouitate

uitate spectabiles emineant flores, tuos in hortos
ferreo tubo transducti ex agresti vita in floreæ vr-
banitatis conuietum euocentur. Fit enim sæpe,
vt, sicut hominum, sic florum pulchrè degenerante
genitura, ex agro ciuitate donanda egregia indoles
existat. Sed & illud custodiendum est, vt salubrius,
aut æquè bonum, aut certè non admodum dete-
rior in solum hortensia semina transferantur; ne
nocentium reorum instar in oram pestilentem da-
mnata & relegata vel præmorianantur, vel emacien-
tur: ea enim præpostera mutatio imbecillo cui-
que facili morbum creat, vel interitum: atqui
semen est aliquid imbecillum. Verùm enimvero
bulbos si quis peregre mittat, in capsulas aut pyxi-
des debet condere, vt in frigido siccoque strato
melius ijdem perennent: arboreum muscum al-
terna serie subternere, ne commistio vel simili-
tudo allucinantem colonum decipiat: vnum-
quodque genus præscripto nomine numeroque
distinguere, loco discludere, aut etiam papyraceo
inuolucro penitus separare, ne conclusi bulbi ve-
ctione agitati atque inter se collisi & confundantur,
& corrumpantur: in arculas aut pyxides satis refer-
tas superpositum muscum infarcire: tum easdem
probè operculatas crassiore lino diligenter circun-
ligare, nodoquenectere: nodum ipsum, ne is do-
lo malo dissolui possit, miniarula cera Hispana
perlutum obsignare: frontesque capsularum vel py-
xidum

Theophrasti. De
caus. plant. l. 3.
c. 6.

Constant. Pog.
Agri. l. 2. c. 46.

Vt procul
mittendi.

xidum illi, cui res destinatur, inscribere: aquis tandem tum pluuijs, tum obuijs impenetrabili cerato linteo insuere; extimamque inscriptionem intimæ geminam adijcere. Sunt qui prudenter astuti, vt quorundam alienas exteras merces explorantium, optimasque captantium hamatos vngues viscataque manus impunè ludant euadantque immunes, inclusos bulbos non per adiuncta nomina, sed per certas numerorum notas, aliasque per arbitrarias formas distinguunt, quas cum ipsis nominibus coniungit explanatque data seorsum interpres epistola. Si bulbi longiùs missi aut accersiti vel itineris diuturnitate, vel quo alio incommodo situm contraxerint, exuctoque succo peraruerint; vitiosis omnibus tunicis denudentur: fiet enim non rarò, vt intimus saltem nucleus incorruptus ab interitu vindicetur. Supradictam pyxidum tutelam cautionemque desiderant longinquas in oras mittendæ floriferæ radices, quas tamen pro musco emporeticis siue inutilibus chartis obuoluere abunde est. Verùm anemonas, in-
graciles lingulas ocellosque tenuiter porrectas stupa, vel gossipio molliter prætegi, deinde etiam chartulis inuolui conuenit. Viui radices siue plantas radice aliqua fibratas diu peregrinaturas illitus melle muscus ad medium vsque conuestiat: mellis enim illitu perennat humor, peregrinantibus plantis dulce viaticum. Quòd si viæ mora octo die-

dierum spatio breuior futura sit; muscus frigidus, madefactus satis illas præstabit incolumes. Nonnihil dissimilis ratio est in præmuniendis taleis siue furculis transmigraturis. Nam vel illos in melle Cardan. de subtil. l. 8. submergimus: quia mellis humor neque pinguis, neque corruptioni obnoxius; sed tenuis, dulcis, ac temperatus teneris germinibus à materno lacte auulsis vicaria suauitate alendis tuendisque accommodatus est: vel figuralem cretam ex melle subactam in Calabri limonij mali formam & magnitudinem conglobamus. In huiusmodi argillaceo globulo quatuor aut quinque furculorum imas crassioresque partes defigimus: extantia cacumina, ipsamque argillam musco inuoluimus: in capsulas aut pyxides, musco alio (si opus sit) vndique densato, includimus. Pari præsidio delicatissimarum indolis plantas contra itinerum incommoda tutamur. Nonnunquam etiam furculorum extrema succosis malis vtrinque infigimus: in pyxide componimus: insuccatam denique aqua spongiam imponimus: atque ita floriferæ soboli exiguo ligneo vehiculo peregre transferendæ vitalis commectus, nempe humor in sicco non deerit. Illud autem cauemus, ne minuta semina, quæ quàm siccissima mitti debent, cum furculis, aut radicibus humida integumenta poscentibus componamus. Quare bulbis, alijsue siccam vecturam amantibus radiculis bene chartulis conclusa, suisque nomini-

bus

bus discreta adiungimus: aut certè cautiùs in pyxidiculas seorsum recondimus. Vt enim hominum, sic seminum tenera indoles à pernicioso consortio periclitatur.

Narcissorum cultura.

CAPVT VI.

ENucleata florei cultus disciplina postulat, vt propria communibus præcepta subijciantur. Neque verò plantarum omnium satus singulos persequi est animus, sed earum duntaxat, quæ nostratibus, & præcipuè Romanis, hoc est nobilissimis in hortis curiosius coluntur. Satis enim habui ex infinita florum silua lectissimos cultissimosque seligere pertractandos. Interim ad aliorum culturam præcepta generatim tradita conducent. Narcissus, nimium sibi placentibus fabula salutaris, siue ingenio, siue artis manigonio in plura speciosè genera degenerauit, quæ tum frequenti scriptorum descriptione, tum quotidiana cultorum obseruatione iam vulgatissima percensuimus. Duos ex immani numero narcissos, eosque plebeia in hortis notæ ad medicos vsus recepit antiquitas, calice alterum purpureo, alterum luteo, candidis folijs vtrunque. Et priorem quidem ab inspersa per oras calicis pur-

*Discor. l. 4. c.
155.
Plin. l. 21 c. 5.
c. 19.*

purpura purpureum, posteriorem fabulosa mutatione inclytum à medio croceo flore albis folijs coronato croceum, siue luteum appellarunt. Narcissorum plerique macro, soluto, ruderato, arenoso, atque aprico lætantur loco. Id satis ipsi colonos admonent, dum voluntarij fabuletis, & montibus innascuntur. Bonum tamen requirit solum, qui foliosior efflorescit. Pingui penitus abstinendum: quia sessilem bulbi verticem ex facili corrumpit. Hæc autem folioso conueniunt cum simplici narcisso, ut sole gaudeat uterque, velut ad ostentandam etiamnum in flore manentem pristinam venustatem: ut ad quinos senosue digitos defodiatur: ut palmaribus interuallis, præcipue luteus, collocetur. Est præterea, qui affirmet, narcissinum bulbum in flores non exiturum, nisi raro, nempe tertio quoque anno refodiatur, aut disraretur, cum videlicet adnatæ numero foliolis exugitur. Simplici flore narcissi, qui semen foli reddunt, leuissimæ varietatis inutiles lucro frustra feruntur. Narcissum, cui nitidus candor, aut languidè luteus pallor toto non solum flore, verum etiam calice diffusus argenteæ, siue sulphureæ pateræ Italicum nomen inscripsit, summæ apricitatis, mediæque macritudinis solo infodiet, quale est, quo nullus æquè atque hic bulbus gaudet, olitorium. Depressionis, atque à cæteris bulbis interualli modus erit, quem in alijs vsurpandum

Narciss. plerique.

Dioscor. & Plin. ibid.
Is. Bapt. Porta. Villa 1. 9. c. 13.

Narcissus totus candidus, totusque sulphureus flore simplici.

Narcissus fo-
liosior .

pandum esse narcissis paulò ante monuimus .
Nonnulli sunt densissima serie foliosi narcissi , ve-
lut Byzantino vulgatiore maior, qui albida inter fo-
lia luteo calice sinuoso à monstratoris cognomento
Boncori cordatum nomen nostratibus in hortis re-
fert ; velut etiam planè candidus , qui nitidam ar-
genteo nomine pateram, non vino, sed florè plenam
oculis propinat . Hi quàm pulchrè flòrescunt , tam
ægrè dehiſcunt: in florem enim turgentis membra-
næ inuolucro hibernis quæ nebulis , quæ frigoribus
flaccescente, atque in rugas contracto, flos, antequam
oriatur, aboritur . Quamobrem obstetrice hac arte
floreo fœtui opem feres . Extremo Ianuario bulbos
serus adobrues: cum illi turgidos flore scapos impel-
lent , vesperi bene operculatos à nocturnis pruinis
nebulisque vindicabis: mane (si dies tepeat, & insole-
tur) operculo remoto apricari patieris. Proderit etiam
interdum thecam ipsam duriusculam , & dehiſcere
contumacem leuiter citra conclusi floris iniuriam
incidere , viamque partui vulnere aperire ; ne is
tanquam in vteri membranacei angustiis præfoce-
tur . Ipsos verò bulbos quotannis tempestiuè eru-
tos in siccissima cella custodies : quia in humidio-
re thallos citarent , vimque genitalem omnem,
flori etiam reseruandam , in folia profunderent .
Et hi reliquam culturam superioribus debitam de-
siderant . Ampli floris & calicis iunceis narcissis
congruit mediocris olerum terra , & loci positio
mo-

Narcissus
iuncifolius .
maior .

modicè aprica. Amant iidem quaternis subesse digitis, ac totidem inter se aut paulò pluribus abesse. Superioribus minor iuncidus tum odoratus luteus, tum albus, tum folijs reflexis pallidus narcissus in fictilibus, quàm in areolis, lætior provenit: locum exigit soli obnoxium, solum, quod infra supraque est, olitorium & bonum: idem tamen digitalis crassitudinis macriore humo proximè circumtegi vult, ut minimè in sobolem exhaustus profusè luxuriat in florem, utque à pingui humore sæpe manans vitium deuitet: frequentem verò, ac tempestiuam, quoad folia exaruerint, amat irrigationem. Hac ergo cultura compertum habemus, tum simplici, tum pleno flore, iuncea-que folio Hispani narcissi bulbos mirè crassiores fieri, ac fecundiores. Si rotundus est bulbus, terni digiti depressioni dantur, interuallo totidem aut saltem bini. At oblongus digitali, aut paulò maiore altitudine defoditur, ne solis appetens incommodam in longitudinem excrescat. Est etiam qui supposita, cum is conferitur, testula longulum faciliè rotundet. Rarenter, ac circumactò minimùm triennio eruitur adnatam ad fœturam segregandam, siue etiam ad vetus effœtumque solum recenti fertilique commutandum. Supra quatuor sexue dies inobrutus esse non debet: quia pusilli corporis & roboris bulbus à vitali matris amplexu diutius diffitus æstiuis præsertim calori-

Narcissus iuncifolius minor luteus, albus, & pallidus folijs reflexis.

Narcissus iu-
cifolius autū-
nalis albus.

Viridis.

Pseudonar-
cissus iunci-
folius.

Pseudonarcif-
sus Hispanus.

bus emaciatur. Semine satus narcissus hic in bulbulis floribus fecundissimos proficit. Duplex denique in iuncea folij narcissus, eoque potissimum qui foliosior floret, cura atque opera impendenda est: altera, ut florem cito legas; cum exiguo corpori par, nempe imbecilla bulbuli vis citra interitus discrimen flori diu alendo non sit: altera, ut, postquam idem narcissus defloruit, obstitum illo vas sub tectum referas, pluuiæque subducas; ne per bibulum scapum infusus humor totum bulbulum permeet, ac putrefaciat. Eiusdem à iuncea folio nominis Narcissus albus autumnalis amat locum à sole summotum, terram leuem & raram; trium altitudine digitorum demergitur; duorum intercapedine dissociatur: perrarò effoditur: aggesto per æstatem solo ab æstu defenditur: vbi remisit calor, eodem exoneratur. Languidi odoris flore viridi stellatoque, per autumnum ante folia, itidem iuncea emergente sub similis priori, crassiore tamen ac proceriore caule ternos quaternosue flores efferens dispar narcissus humo gaudet mediocri, & parum aprica: in tres digitos demittitur, parique spatio disiungitur: vix vnquam exeritur. Similis cultura, quæ superiori luteo Hispano narcissus adhibetur, bulbulo similem educat iuncea folio pseudonarcissum. Siluestris narcissus Dodonæi, siue pseudonarcissus Hispanus maior & minor Clusij, qui simplici senum foliorum textura stellatus velut

lut in tubam tubulato fimbriatoque calice grandioris tubæ sibi appellationem vendicat, seu flauescat, seu palleat, siue albescat, mediocre solum, ac satis insolatum situm, nec non quaternos in depressionem digitos, in interuallum verò palmi dimidium requirit. Qui foliola densitate stipatus minùs expressa tubam promit imagine, quique consimili facie narcissus Roseus maior appellatur, imò (vt quidam existimant) à proximè superiore pseudo-narcisso non distinguitur, eodem cultu lætantur: iamque in florem turgente membranæ vagina, ab aqua pluuiatili, quàm maximè poterit, abstinendi sunt; ne largiùs insuccati, ac plus æquo tumefacti dirumpantur, enormiterque fatiscant. Idcirco mobili præstat eisdem fictili, quàm stabili areolæ, committere. Parem ferme culturam quærit minutulus pleno flore pseudonarcissus. Peculiare tamen hoc poscit, vt minùs altè, tres nempe digitos loco magis humecto deponatur, & rarò aut nunquam eruatur; quia nostro cælo non admodum gaudet, crebraque translatione vexatus maligno respondet euentu. Non dispar debetur cultus geminis pari breuitate narcissis, nempe siluestri Stellato, & Roseo minori. Narcissus quoque, cui singularis, & conspicua, Narcissus incomparabilis. magnitudo nomen dedit Incomparabilis, in terræ delectu cæteris comparatur: olitoria enim contentus est. Modicè apricari satis habet; quia diu-

Narcissus lō-
ga ceruice.

turno sole flaccescit. Vult à summo solo quaternis digitis, ab affitis bulbis palmi dimidio propter sobolis numerositatem distare. Is autem narcissus, qui virentis ceruiculæ deflexa & rigida longitudine prolixum cameli collum in similem flosculum, atque in flosculi nomen contraxit; quique ab aurea calicis corona coronario nomine decentius insignitur, quærit humum pinguiissimam, quæ tamen bulbi verticem, vnde fibrarum capillitium fruticat, non attingat; ne vitiet, neue corrumpat: id quod in cæteris quoque bulbaceis radicibus consimile solum postulantibus custodiendum est. Amat idem narcissus auersum à sole locum; quòd incalescente iam anno serotinus floret, ac, veluti candidum hortorum sidus, clarior in opaco nitet. Potest ad palmi dimidium demergi. Quanquam sæpius vtiliusque breuiore quatuor digitorum mensura deponitur; quia foliosiores & plures ab vno caule sic flores trudit. Eodem digitorum totidem, aut paulò laxiore interuallo ab alijs plantis commodè distinetur. Par adhibetur cultura Narbonensi, & Anglico narcisso, cæterisque, qui serò vernant. Solent Indici narcissi, antequam nostro tum cælo tum solo assuescant, ad intimum vsque nucleum lenta macie tenuari ac tabescere. Horum plerique, quòd hospitari nesciunt, pauentque nouitatem, penitus intereunt. Nonnulli sensim

Narcissi Indici.

repa-

reparatis tunicis viribusque non sine spe florei par-
tus in molem pristinam turgescunt, & reuiu-
sunt. Verum, vt in exteris hortis longinqui
hospites incolumes perennent, atque ad florem
& sobolem vsque proficiant, ferè sabulosa humo
excipiendi sunt. Virginienſis narcissus vult intra
terrenum vas in olerum solo duum digitorum
altitudine deponi, mediocriter apricari, nun-
quam refodi, nisi ad sobolem seiungendam. Apud
nos non ſementat. Affinis lilio narcissus Indorum
è rubro croceus, duodecim ante annos Iacobei nar-
cissi nomine ad Romanos Farnesiorum hortos mis-
sus, diu sterilis & inglorius in folia tantum eger-
minauit. Sed noua iam industria, seu potiùs in-
iuria colitur & iuuatur. Etenim bulbosa ma-
ter macerrimo in solo ad binos ternosue digitos
mergitur: vt eadem alimentum incrementum-
que capiat, felicique sobole se propaget, ad
mensẽ vsque Nouembrem eatenus irrigatio-
ne atque insolatione fouetur, quoad primis fo-
lia frigoribus exaruerint. Tunc enim obsita
hoc bulbo testa in locum subducitur imbribus qui-
dem & gelicidijs inaccessum, sed tamen aëri per-
uium, placidoque spiritu perflabilem. Hic ad me-
dium vsque Maium paulatim inarescere ac sicire si-
nitur. Eo demum tempore superposita bulbo hu-
mus diligenter scalpitur atque egeritur, donec
mater cum sobole denudetur: tum eidem matri

Narcissus Vir-
ginienſis flo-
re purpura-
ſcente.

Narcissus In-
dicus è rubro
croceus, flo-
re liliaceo.

adnati bulbuli seorsum ferendi subtrahuntur , radicibus , quæ semper terræ inhærent , immotis intactisque ; ipsa verò superiniecto solo , quod modò subductum fuerat , operitur . Principiò potest fiticulosum fictile fontanam in aquam demitti , donec bene penitus humescat : in solem deinde pluuiamque producit , atque , cum res poposce-rit , irrigatur . Quanquam alijs colonis annua mon-straui experientia , nullis ab intacto incultoque bulbo blanditijs prouocatum florem faciliùs existi-

Narcissus Indicus liliaceo colore saturo , et diluto colore purpurascens .

Narcissus Indicus flore liliaceo Sphæricus .

Narcissus Indicus gemino latiore folio , flore puniceo

stere . Indicus uterque liliaceus narcissus , tum saturo , tum diluto colore purpurascens , in olerum raro arenosoque nonnihil solo ad binos ternosue digitos depressus , & apricus prosperè solet efflorescere . Quòd radicibus nititur immortalibus , nisi sobolis auellendæ causâ , nunquam eruitur . Nostris in hortis nondum exit in semen . Sphæricæ hortensis artifex numerofo flore , narcissus Indicus communem Indiæ narcissis culturam , quærit . Nimius illi humor omni cura defendendus est ; ne calor , quo maximè gaudet , aut extinguatur , aut refrigescat . Indicum , seu Suer-tium narcissum gemino latiore folio , & flore puniceo sic tutò feliciterque seres . Bulbum amplo fictili cautiùs concredes : macra & sabulosa humo adobrues , ne pinguioris habitudinis præcrassa & squamea bulbacea cutis cum terrestis pinguedinis præferuido humore tabem combibat : in tres digi-

tos

ros pones: in aprico statues. Quoniam verò squamosus hic bulbus nimio inter squamas humori vitioque concipiendi est opportunus; à folijs Maio mense, aut paulò priùs amissis, quod circumstat, solum inarescere fines: tum eundem bulbum, si terreno vase incluseris, in locum ab imbribus quidem tutum, at solibus expositum recipies. Sin hortensi areolæ commiseris, arida recenti terra aggesta pluuiialibus ab aquis, atque ab æstiuis feruoribus vnà corrumpentibus vindicabis. Ineunte Septembri, cum germinationis tempestiuitas appetit, ab areola sublato, quod in cumulum tumebat, solo, fictili autem in apricum producto, profusissima semel irrigatione siticulosum bulbum recreabis, vt ad germen incitetur. Hæc Tranquilli Romauli, experientissimi cultoris, industria florem quotannis elicit. Inexploratum adhuc est, vtrum semine satus colorem variet. Illud autem compertum habemus, auulsis depactisque in terram squamis similem in sobolem eum facillè propagari. Cauebis denique, ne vnquam eundem effodias: quia narcissis Indicis vniuersis antiquissimum hoc est, vt insigniter lædantur effossi.

Tranquillus
Romaulus

*Croci , Colchici , Corona imperialis , ac
Tuliparum cultura .*

C A P V T VII.

*Crocum fil-
uestre .*

Colchicum .

*Corona im-
perialis .*

Siluestri croco tum verno , tum autumnali so-
lum conuenit citra vermes pingue , ac mo-
dicè insolata positio . Sationi dantur in alti-
tudinem digiti tres , totidemque in interuallum .
Eodem quoquouersus interposito spatio , & paulò
altiore quatuor ferè digitorum mensura Colchi-
cum serēs bono in solo , & satis aprico . Vastæ ro-
tunditatis bulbus , cuius aurei flores in orbem nu-
tantes Imperialis coronæ splendidum nomen re-
tulere , mediocriter macro apricoque olitorio solo
ad quinque digitorum altitudinem , & palmari
interuallo infodiendus est . Quoniam verò idem ,
tenerrima nudaque carne cum sit , incommode
abest à terræ gremio ; transmoueri non debet ,
præterquam si satis adulta subtrahi postulet fœtura .
Septembri mensē eruitur , & referitur . Nulla à satu-
seminis vicissitudo prouenit coloris . Obserua-
tum est , ab eodem hoc bulbo præfagiri & præ-
monstrari temporum vices . Vbi enim is caulem
trudit , desisse frigora significat : erutus quoque ,
siccoque in loco sepositus , vbi fibras mittit , immi-
nentes pluuias , frigidiorēque tempestatē præ-
nuntiat . Illud etiam habeo longo compertum pe-
riculo

riculo affirmare, flores hosce maternam plantam
pronis velut gratum in obsequium verticibus co-
ronantes transalpina inter frigora, quàm in Roma-
na temperie, florentis auri numerosiore ambitu
splendescere. Tulipæ familiari eximia pulchritu-^{Tulipæ.}
dinis arrogantia cæterorum florum odere confor-
tium. Ternos digitos in depressionem exigunt,
in distantiam quinos. Mediocritate lætantur solis,
& soli: huius, ut bulbi tutiores; illius, ut flores diu-
turniores sint: ne scilicet huius pinguedo teneros
vitiet; illius feruor serotinos adurat: ne denique
necesse sit obtentis velut castrensibus velis cum
cælo & sole pugnare. Tutissima ratio est, quæ cum
totum bulbaceum corpus, tum in primis auersam,
quæ fibris fruticat, sedem ieiuno infodit solo; le-
ue deinde, ac validum ternos circiter digitos altum
superiniicit. Experimento didicimus in ea simo-
sa terra, quæ superiore anno in anemonarum ali-
tura feruidioris pinguedinis vber nonnihil emun-
xerit, tulipas & mirificè adolescere, & magnificè
efflorescere. Quin etiam amœnissimi flores hi
maximè lætantur alunturque ad amœnitatem inso-
litam eo terræ flore ac polline, quem è decliui lo-
co delabens aqua delibat, ac deuolutum in imo si-
stit. Læctissimarum præcipuè, pulcherrimisque
coloribus distinctarum bulbi grandiores à folio-
rum iactura quotannis erui statim debent; ne diu-
tius obruti decrescant, aut mirabili latebrarum,
amore

amore descendentes pessum eant, aut etiam tunicis, velut in calcis concretionem, obdurescentibus lapidescant, aut demum æstiuis quàm pluuijs, quàm calidibus sufferuefacti exputrescant. Quæ simplici probabilique colore vernant minùs nobilium tuliparum bulbosæ radices, continenti biennio humatæ utiliter interquiescunt; dum tamen, ubi folia euanuerint, aggerata quaternos in digitos humus æstiuas propulset iniurias. Priore autem anno illæ pariunt, altero partum amplificanc; tertio, nisi educantur, fœtus adhuc inualidi noua minutula prole supersœtant, exhaustique attenuantur: quinetiam complusculis simul inuoluti membranis ab incluso superfluo humore sæpe tabescunt; id quod exinde malignus florum prouentus ostendit. Quam nonnemo laudat atque vsurpat lateritij pauimentum moram, ne depositæ tulipæ sese altius demittant, à summa humo interstitio palmari substratam, & superuacaneam puto, quia vix in palmi dimidium solent hi bulbi descendere, neque nobiliores tulipæ quotannis refodiendæ in altiores latebras abeunt: & præterea noxiam, quia interuallis, quæ lateres angustè distinent, paulatim densata humo expletis obturatisque pluuiatilem humorem transmittens via sic præcluditur, ut eo largiter concepto mollissima hæc bulborum natio plerunque marcescat. Si tuliparum bulbis extra terræ gremium quàm maximè consultum
velis

velis; eosdem cohærente cum sobole, cum vniuersis membraneis inuolucris, atque adeo cum ipsis aridis fibris, concretoque cum solo erues: tum aperto, non tamen aprico loco per quatrduum, vt siccescant, expones: in sicca denique frigidaque cella papyro inuolutos habebis: cum tempus referendi fuerit, adhærescente humo, extimis exuuijs, fibrisque detractis, iidem bulbi cum adnatis nucleis incolumes integrique reperientur; quos, si vixdum erutos improvidus cultor tute laribus ijs sordibus liberasset, faciliè durior instar calcis concretio corrupisset. Cauendum verò est, ne nobilissimi generis matri adhærens pusillus hæres exteriore arida membrana denudetur; quia nudulus noxam ex facili contraheret. Quoniam præterea frequenter est, vt appendix illa neruosa & candida, quæ bulbulos gignit, emergens in apricum, summoque solo natans rubescat ac vitietur; diligenter aggesto solo adobruui debet, vt felicius fœtificent. Et quanquam solent inanestunicarum exuiæ inueniri, exhaustis matribus, quæ tam profuso sese partu euiscerarunt; nonnullo tamen interdum residuo succo concreti, & posthumi bulbuli inter membranaceas veluti secundas delitescunt, cautè discernendi. Iam verò seminis optimi feraces tulipæ seligendæ sunt. Id è serotinis, quàm è præcocius, vtilius, quippe magis varians, colligitur. Solent in hunc vsu præferri tum candidæ, nigris, aut violaceis, aut cæruleis vnguibus infuscatæ: tum coccinæ, vnguibus

bus ex cæruleo in violaceum inclinatis, alboque circulo coronatis rariores. Vtraque enim florem genus discoloribus maculis decenter aspersum seminabit. Verum si quis versicoloris picturæ rariore gloria flos inter cæteros excellat, in semen abire permittendus non est, sed maturè legendus; ne bulbacea mater exhausta vel decrescat, vel præmoriatur. Adde, quòd ab istiusmodi flore, in quo vngues internigrare minimè solent, inutile semen existit, in unius nempe coloris flores sæpius degenerans. Folliculo sponte sua iam dehiscente semen legitur: ubi primoribus imbribus September immaduit; intra fictile in olerum bono minutoque solo dimidiatum altè digitum de more deponitur. Nisi circumactò bienni spatio prognati bulbuli non effodiuntur: grandiusculi à minusculis segregati in seminarij pulvinis, aut certè in fictilibus referuntur. Ita consiti quarto demum quintoue anno flores non paucos decoris maculis conspicuos dabunt. Compertum verò est, in pingui solo seminibus satas tulipas eodem in bulbos adultas velle nutriri. Persicæ tulipæ pusillus bulbus breui duum digitorum mensura mergitur, trium interuallo seiungitur. Omnibus annis refoditur; alioqui sese altè illatebrat. Nequicquam semine feritur, quia colorem non variat. Reliquam culturam exigit cæteris parem.

Fri-

*Fritillariæ, Iridum, Liliorum, Orchis, atque
Ornithogali cultura.*



CAPVT VIII.

Fritillariæ, non palato, sed oculis gratæ Me-
leagrides, soli pinguitudine, situs opacitate
ac frigore, nec non tempestiua per æstiuos
feruores irrigatione delectantur. Fictilibus ma-
lunt, quàm areolis, infodi; vt ab intempestate cæli
tuta in loca subducantur. Digitorum trium demis-
sionem, ac totidem intercapedinem amant. In
floribus legendis quàm minimum cauliculorum
decerpatur: quia nocentissimum id bulbis est.
Hosce sæpius refodi non patitur paruitas & nu-
ditas. Septembri mense (vbi res poscet) eruen-
tur, si tamen annus refrixerit; continuoque satù re-
condentur. Nisi statim referi possint, diu saltem in-
obruiti ne sint: quia parentis altricisque telluris exu-
les mœrore senioque rugati perniciosè exarescunt.
Semine sati florum colore à parentibus non dege-
nerant. Irides, quarum bulbosa radix, mediocri so-
lo ternos in digitos; quarum durata in tuber, siue (vt
vulgò dicitur) tuberosa, macro siccoque mergun-
tur in binos. Illæ quaternis digitis; hæ palmari
spatio disterrinantur. Illæ solem ferme fugiunt;
hæ quærunt. Bulbosæ demum, itidemque tube-
rosæ tertio quoque anno sub extremum Iulium
men-

*Iris bulbosa,
ac tuberosa.*

Iris prima
Clusij, &
Persica.

Lilia Silue-
stria.

Orchis.

mensẽm eruuntur, Septembri referendæ. Iridẽm Clusij priorem, alteramque Persicam in olerum temperato solo, & aprico loco tres altẽ digitos depones: crassas bulbi radices bene diuaricabis: ne quam incautẽ reuellas perfringasue, custodies; quia grauissimæ id noxæ est: palmaribus interstijijs separabis: è terræ sinu non educes, nisi vt prolem subducas: vtranque operam Septembri mense præstabis: è semine nequaquam degenerante discolorẽs vices non expectabis. Siluestribus, siue montanis, atque adeo peregrinis lilijs, quibus martagonum nomen ætas recentior imposuit, amica est olerum subpinguis leuisque terra; solibus parum ostenta, & frigida, non tamen humori nimis opportuna positio, palmaris denique tum descensio, tum distantia. Bulbi, nisi ad seiungendos fectus, emouendi refodiendique non sunt. Tempestiuẽ transponuntur, cum prope iam defloruere: tunc enim veteres fibras amiserunt. Ipse quoque humi positæ bulbacæ squamulæ tandem adolescunt, & rotundantur in bulbulos. Semen iacitur citra spem varietatis. Aestiuus feruor frigore gaudentibus exitialis est. Hic ergo ipsis aggesta humo, aut quo alio diligenter obice defendetur. Veruntamen hæ frigidioris Germaniæ peculiare & vernaculæ plantæ nostrorum ægrè ferunt hortorum teporem; intimamque ægritudinem parco flore significant. Orchis, & Satyrium in humidis atque opacis ad

ad quinos digitos deponuntur. Vulgare ornithogalum narcissi culturam desiderat: Peregrinum, quod & Indicum vocant, Romæ in pretio habetur, ac studiosè colitur. Solem amat è patria solis oriundus; nostratis plagæ frigora pertimescit. Ea re in fictili intra bonum & validum solum Hispani odorati iunceo folio narcissi ritu custoditur, ad binos digitos Septembri mense defossum. Ab asperrimæ hiemis intemperie subtectum ac tutum locum reuocatur. Frequenter effodi non vult. Si quando tamen effosso fuerit opus, id fiet dilapso iam flore, maturoque iam semine: statim enim recentes agere fibras incipit.

Hyacinthorum cultura.

CAPVT IX.

HYACINTHUS vtpote genere multiplex, colore varius, florum vbertate diuersus, præcox, tempestiuus, serotinus, debet hortis infodi numerosus; vt in species renideat vniuersas. Huc adde, cohærentibus eundem spicis, quæ nisi bimæ trimæue copiosè non efflorescunt, adeo sobolescere; vt ad florum segetem plerunque sterile scat. Quare feri plurimus debet, vt nonnullus vberimè floreat. Apricissimum

*Hyacinthus
quilibet.*

Cæruleus polyanthes.

num locum plerique hyacinthi quærunt. Hyacinthinos bulbos à bulbosis alijs radicibus vtilibus segregatos inter palmaria spatia disponemus, itidemque palmari altitudine deponemus. Hæc tamen ijs conuenit bulbis altitudo, qui iusta magnitudine sunt, quique scapos multo flore conuestiunt. Cæteri pro corporis mole ad senos, quater nos, binos etiam digitos descendunt. Vniuersi verò, nisi fatiscant in sobolem, intra quadriennium non effodientur; quòd extra terræ gremium sterilitatis, & corruptionis discrimen subeunt. Sic autem rectè seritur in primis & simplici & multiplici flore cæruleo polyanthes. Solum gracile, non ita leue, nec vbertate nimia defatigatum effectumue, sed satis robustum, imò etiam antea rude immotumque, quamuis exile, mirabili prouentu bulbo substernitur, & circumfunditur. Vtiliter deinde bonum & pinguius superingeritur; ut illud nimiam foeturam tabemue prohibeat, hoc temperatæ pinguedinis instillatione abundè nutriat ad floream fertilitatem. Quoniam verò senio, partuque fatigatur humus; iunior identidem, & vegetior substituetur; adhærescens matri soboles non annicula, sed bima subtrahetur; quia materno feliciùs vberè adolefcet, ac tertio demum anno fertilem in ventrem rotundata numerofo flore luxuriabit. Hyacinthus præterea candido flore præcox, quia priore post sationem anno minutifimos

Albus brumalis.

fimos bulbulos sessili per ambitum vertici hæren-
 tes denticulata serie prodigiosè ferax profundit ;
 circumacto biennio cum adultiore sobole eruen-
 dus est. Cæterùm bulbosas hyacinthorum radi- Albus serotinus, subru-
 ces, qui singulis in scapis plurimi serò candicant, bens, & viola-
 qui diluto colore subrubent, quique secundùm ceus caule
 violaceos flores longas foliorum tæniolas porri- foliato.
 gunt, macriore humo circumteges; quaternos in di-
 gitos tantummodo demittes: vbi folia exaruerint,
 quotannis refodies, ne dulci teneraque carne de-
 licati ab imo vertice fibris comante vitium capiant,
 vermiculentur & computrescant. Herbeo viro- Subulridis.
 re florentem hyacinthum ab assiduo sole salubriter
 distinebis, ne diuturno calore perustus viror in tri-
 stiore palloris colorem cinerescat. Racemosus Racemosus,
 hyacinthus macra humo, aprico positu, quinos se-
 nosue digitos alta depressione lætatur. Debetur Botryodes
 hyacintho botryodi inodoro, Belgico, Hispano se- inodorus,
 rotino, atque obsoleto bonum solum & parum apri- Belgicus, Hi-
 cum, trium digitorum altitudo, par aut digito ma- spanus sero-
 ius interuallum. Stellatis Peruanis hyacinthis olerum tinus, & ob-
 subpinguis & robusta humus, necnon à sole nonni- foletus.
 hil auersa positio commoda est, vt caulis desiderio
 sideris procerior ac decentior excitetur. Quoniam
 autem bulbi oppidò capitati sunt, nucleosque gran-
 diusculos procreant; palmo laxiora per interualla di-
 sponuntur: quaternis digitis subsidere satis habent:
 Iulij mensis exitu effodiuntur. Spurius ille hyacin- Botryodes
 thus, quem Byzantij cultores suauī vocabulo Mu- odoratus,

scari appellant, loco eximiè pingui modiceque aprico, inter palmaria interordinia, in palmi dimidium depressus ponitur. Perrarò idem eximitur, cum videlicet suæ ipse numero sobolis opprimitur; quòd æternis humum radicibus complexus à matre simul vitalique profectu incommodè auellitur. Neque verò statim, atque ipsum effoderis, radices adhuc succosas carnosasque extorquebis, ne viuida vis è vulneribus expiret; sed aridas tandem atque emortuas subtrahes innocenter. Quanquam refodere Septembri mense præstiterit, eodemque mox detractis fibris attonsum inhumare: quia, si diutius absit à terra, noxam ex facili capit. Proderit etiam quotannis, cum prima exire folia incipiunt, intactis tenuis radicibus veteri effœtaque terra subducta, recentem fertilemque sufficere. Hyacinthum in lugubris cupressi conum turbinati festiua imitatione cupressinum, mediocris apricitatis peramantem, & propter ramosum siluosumque florem ab aliorum consortio florum palmari diuortio segregem, quatuor altè digitos demersum olitoria subpinguis humus vtiliter excipiet, nec, nisi reuoluto triennio, amouendæ sobolis ergo remitter in lucem. Hyacinthus, seu potiùs asphodelus tuberosa radice Indicus polyanthes, odore iucundissimo, bonum, leue, robustumque solum, apricissimum locum, liberalem tota æstate irrigationem postulat. In fictili, quàm in areola, euentu lætiore respondet, quòd in huius laxitate nimium fœtifi-

Cupressinus.

Tuberosus
candidus :

tificat: in illius angustijs parciùs propagata tuberculorum posteritate, vegetos conatus effundit in florem, ac tempestatum iniurias gestatorio declinat hortulo. Solitarius, aut sociatus palmaris latitudinis cubile desiderat: in tres quatuorue digitos deponitur: ingruente iam frigore in contactum quidem, at perflatilem locum recipitur: quotannis decrescente Martij mensis luna eruitur: peregre mittendus, etiam dimissis folijs, tutò effoditur: adultior, & facilis reuelli soboles abiungitur: prolixum fibrarum capillamentum ad arbitrium strictim summatimue attondetur: idem tuber præscripta ratione referitur: fibrarum coma excitato terræ cumulo circumfunditur. Semen, quod floris colorem non variat, nostratis more seminis hyacinthini differitur. Vt autem nostrorum mirè degeneret hyacinthorum color & numerus, hac arte semen leges, hac infodies. Ex eo bulbo, cuius vires nulla soboles adnata delibet, plurimis conuestitum floribus primigenium caulem referuabis: altero tertioque loco genitos succides: vbi flores prope iam euanuerint, caule decacuminato, summos ac plerosque amouebis: tres quatuorue imos relinques, in quos vigor omnis vberimè confluat: à maturitate iam fatiscentes folliculos, & nigella seminum grana præmonstrantes colliges: in Septembrem, vel Octobrem vsque proximum opportuna in cella repones: alterutro è prædictis mense in altis & peramplis fictilibus, bona olitoria humo repletis, semen rarissimè differes; quippe toto bien-

Hyacinthini
seminis dele-
ctus, & satio.

nio, donec in grandiusculos bulbos adoleuerit, transfoueri non postulat: cum opus fuerit, irrigabis: à frigore in aprico, ab æstu in opaco tutaberis: ab amissis folijs, curabis, vt semper humus non nihil humeat, ne perparum succosi recentes bulbuli arido in solo penitus exusti exarescant: pinguem anno exacto humum superingeres, vt, quæ subiacet, ob diuturnam alituram exhausta pinguioris accessione reualescat: elapso biennio erutos bulbos, cum ad iuglandis magnitudinem excreuisse solent, in seminarij puluinis inter laxiora interualla paulò altiùs mox inhumabis, ne tenera paruitas diu inobruta lædatur. E primi rudimento floris, quem tertius à satù annus plerunque citare solet, specimen indolis capere non satis licet: id autem annus insequens palàm faciet. Proximum deinde triennium ostendet, ad quem florum numerum singulis in scapis eniti fecunditas possit. Quos igitur bulbos intra id tempus bellè copioseque florere animaduueris, retinebis; degeneres exterminabis. Neque enim vberior in posterum prouentus, aut flos numerosior sperandus est.

Cyclamini, & floris Indici è violaceo nigricantis cultura.

C A P V T X.

Cyclaminus. **V** Traque cyclaminus, tum verna, tum autumnalis intra testas ampliores inhumari vult, vt vberior floreat, vtque tutior perennet. Leui quoque, non tamen effecto, sed pingui solo
au-

auctior extuberat in ventrem, & pulchrior capillatur in florem. Binos altè digitos deponitur; ne altiùs obrutus tuberis oculus, dum lucis desiderio nimis assurgit, vim floris procreatricem longum absumat in incrementum. Flos, & folium hiberno frigore infestatur. Autumnalis in vmbra sublustri, dubioque sole floridior nitet: ipso enim adhuc feruido anni tempore satis caloris habet etiam in opaco ad florum citandam vberem paritutam. Verna loco gaudet apriciore: quia extrema vernare incipit hieme, cum sol adhuc remotior plantas languidè fouet, ac leuiter ad florem partum extimulat. Tunc autem transponenda solum est, vbi iam adultior alimentum ac feracitatem, vltra non ducit à terra, & fictilis angustijs compressa strangulatur. Argumento erit foliorum siluula densior, ipsoque fictili diffusior. Illud extrahenti cautè custodiendum est, vt, quæ concreuit adhæsitque fibrarum capillamento humus, ne decuriatur, neue excidat. Alioqui enim creberrimæ capillaceæ fibræ nouo satù explicari non possent; impexæ verò confusæque ex facili putrescerent, ipsumque tuber corrumpere. Ad hæc circum fibras inarefacta eadem vetusta humus ab recentis circumfusa & contigua vligine sensim humescit, elicitque vires alendo tuberi pares; quod, cum suapte natura humidum sit, magis vliginosam recentiore terram non sine contagionis periculo contingeret.

tinget. Vnum tuber multiplicem familiam dabit cum in frusta concisum, tum seminatum. Incisione & vulnere sic propagatur. Vbi iam arida folia dimisit (fibras enim æternas habet) diligenter effoditur, atque ita interciditur, vt sectilium partium cuique sui relinquantur illæsi oculi: tum frigido siccoque eo vsque habetur in loco, dum siccata vulnera crustulam ducant, & cicatricibus occalescant. Cicatricoso deinde lateri fatis exucto atque exiccato cera commistæ terebinthinæ resinæ lentore tenacior illinitur, & facilè adiungitur, quæ pridem humenti non adhæsisset. In fictili demum vase tempestiuè reponitur, obliquata in latus cicatrice, ne insidens humor officiat: obducto præterea vulnere ieiuna & sicca humus admouetur, & secundum hanc bonum solum aggeritur: aqua, nisi germinare incipienti, non affunditur; vt saucium tuber quò seriùs, eò minore periculo humefcat. Iacto semine sic feliciter sobolescit. Absumptis iam folijs, cum, pediculo in spiras conuolutum, sessilis folliculus dehiscit, maturum legitur semen, atque in tempus idoneum referuatur. Cyclaminum vernum vere, autumnale autumnino in pingui ac bene macerato solo digitum alto satum obruitur. Sole in primis, atque humore proficit. Vtrunque toto triennio immotum intactumque adolescere finitur. Mutat facilè colorem, sæpius albo in rubrum, rubro rariùs in album

bum degenerante. Indici floris è violaceo nigri-
cantis tuber terreno in vase ad binos ternosue digi-
tos depressum, & mediocri solo adobrutum læ-
tius prouenit, sole gaudet, frigore contristatur.

Flos Indicus
è violaceo
fuscus.

Anemones cultura.

CAPVT XI.

ANemone latifolia, utpote existere, flore-
re, ac sobolescere contumacior, quam
quæ tenui folio est, maturius, nempe
triduo ante plenam Septembris lunam seritur.
At verò tenuiore folio anemones, hieme præflo-
rentis, ac præmaturè deflorescentis, aut sæpe etiam
à frigore abortiuæ sationem Octobri mense tem-
pestiuam in primis esse, diuturna docuit experientia.
Quin etiam violacea, atque albo rubroque pi-
cturata, quippe quæ vernare præfestinant, No-
uembri mense vtilius inhumantur; ut clemen-
tiore veris tempestate seriùs quidem, at pul-
chriùs efflorescant. Vtranque tum tenui, tum
lato folio anemonen ad radicis diligentiolem tute-
lam, ad vberiorelem & lobolis & florum prouentum,
in fictilibus deponimus: cribrariæ quoque olerum
terræ præscripta superiùs ratione committimus.
Ea tamen in primis placet ponendæ anemones for-
ma, quam Tranquillus Romaulus, Romanæ amœ-

Anemones
lato ac tenui
folio serendæ
tempus.

Locus.

Terra.

Modus.
Tranquillus
Romaulus.

X 4 nitatis

nitatis cultor & propagator eximius, felicissimè usurpat. Is enim vetustissimum simum, qui penitus in terram abierit, pinguem, leuem, ac probè maceratam, nec malè olentem, nec igneo halitu vaporantem prætenui cribro succernit substernitque in fictilibus: ipsas insuper radices ad crassitudinem duum digitorum macra tenuique humo circumtegit: cribrarium denique eiusdem generis simum superingerit; vt & contigui soli frigida macritudo stercorarium, nempe humidum calorem ex facili corrumpentem à turgescendentibus radicibus distineat ac temperet, & remotioris fimi maximè alibilis pinguitudo radicum auiditatem per exporrectas fibras expleat & fecundet. Illa denique anemonen feliciter educabit, & liberaliter amplificabit humus, quam (sicut in tuliparum cultura, præmonui) pluuiæ in procliuè decurrens, vtpote leuiorem mollioremque, deuexerit. Neque verò vna eademque radicum omnium debet esse collocatio & situs. Nam quæ ab omni vitio innoxia sunt, supinis oculis pronoque ventre statuuntur; quòd magnam terreni humoris vim cælesti calore extenuati elatique integris viribus validè trahant, ac pulchrè concoquant in absolutum sui alimentum incrementumque, atque adeo in tuberculorum florumque sobolem numerosam. Lingula autem, summa parte oculata, non directò deorsum, neque in latera, sed latiore in partem, quæ

quæ tamen oculum deorsum non inuertat, leuiter inclinatæ collocantur. Etenim, si, qua sunt parte latiores, humi nonnihil pronæ insideant, plus è terra vitalis genitalisque succi recto itinere transfusi exugunt & combibunt: ex quo fit, vt ad vitam fœcunditatemque & enutriantur, & conualescant. Is autem succus calida vi euectus, nisi radicum latus offenderet moras, magna sui parte per tenuissimos terræ meatus inutilis euanesceret. Cur igitur (dicat aliquis) non præstiterit anemonarum lingu-
las æqualiter humi fufas iacentesque deponere, vt quò largiùs, eò fœcundiùs humescant? Equidem istam esse aio eiusmodi radicibus incommodam & noxiam posituram: quia vbertim haustum humidum nutrimentum in floream luxuriam digeri satis effundique non potest ex oculis in transuersum iacentibus, qui supinum exigunt situm, vt sursum versum amore solis adnitentia germina feliciter profundant. Quamobrem vt homines, sic plantæ, ipso, quod non perficiunt, alimonio necantur. Quòd si subsectarum radicum ima pars defecto vitio cicatricosa sit; non debet omnino recta, sed quadantenus obliqua deponi. Etenim vulnere læsa, atque etiam semimortua vitalem vim non habet ad vberem terræ humorem concoquendum, qui, cum semper in sublime feratur, à sole vaporatus, ijs præsertim, quæ habitu sunt imbecil-

lo

lo maloque, corruptionis origo est. At verò humi acclivis non corrumpitur portio vulnerata: quia plurimus, qui rectà sustollitur, vapor inoffenso transitu per soli spiramenta transmittitur; parcius autem, quique ab infirma ægrotaque radice in alituram fœturamque digeri possit, sensim atque innocenter eidem sese insinuat. Mirificè quoque conualescet & proficiet anemone, siue ætate, siue morbo imbecilla, si fictilium cretæ costili contigua inhumetur. Quæ iustum cepit incrementum, in palmari seritur interuallo, & in quaternos digitos demittitur: quia, summo paulatim solo subsidente, in trium digitorum congruentem altitudinem decrescit altior demissio. Minusculæ radices minore altitudinis interuallique mensura disponuntur. Solem omnes quærunt, præcipuè hibernum, quo flores ad partus incallescunt. Spatiosum quoque cubile, apertamque loci positionem, & liberum cælum postulant: quòd hæ complurium dissimiles plantarum & multis in latitudinem fibris capillantur, & humilem foliorum siluam latissimè spargunt. Quòd si præfocantibus loci angustijs in sublime nitentia, atque officiente opacitate solem quærentia, folia valde sustollant; emaciatos, abortiuos, rarosque flosculos dabunt: procerissimos verò cauliculos mordentia frigora succident, euerberantia flamina proster-
nent;

nent; quibus cauliculis breui arescentibus, radices ipsæ notabilem noxam concipient. Quanquam Tuam: etum. autem frigidas hiemes non reformidant anemonæ; siquando tamen bruma præter morem niualis & prægelida sæuiat, non ab re fuerit in locum ab aquilonio frigore auersum, vniue solistepori patientem consita vasa tantisper recipere, dum glaciale rigorem clementior aura regelauerit. Rigatio. Rigatio ministrabitur eo, quem superius tradidi, more; cum tellus minimè nigrabit, sed solutior puluerabitur. Horæ rigandi matutina hieme, vespertina vere. Cæterum, etsi mobilium testarum Locus in areolis. tutioribus in puluinis molles anemonarum plerunque radiculae deponuntur, non rarò tamen, quæ præsertim robustiore sunt habitu, bulbis insertæ sic digeruntur; vt illi medias, extremas hæ areas atque angulos occupent, ne foliosiore bulborum nemore obruantur: aut certè per angustiores hortorum oras, & veluti fascias, quæ cæteras ambiunt ac definiunt areolas, sic seorsum tribuuntur; vt cuiusque generis singulae, binæ, ternæ, aut quaternæ, alia discoloris floris radice distinctæ, colorati discriminis ordinata serie interiorem hortensem amœnitatem elegantissimè coronent. Diuturno autem experimento comperimus, anemonas humida hieme in fœtilibus, sicca in areolis meliùs provenire: quia superfluentem pluuiæ hiemis humorem fœtilia faciliè transmittunt, atque intra rectum subdu-

satio crebrior
noxia

Sterilitas
emendanda

subducta, seu tantum acclinata nimium imbrem declinant; areolæ verò per sicca etiam frigora propter laxiorem profundioreque humum satis hument. In areolis positæ anemonæ olitoriam itidem terram, exiliorem tamen minusque minutam, quàm in fœtilibus humatæ, desiderant. Ad binos digitos demerguntur; palmari spatio distantur. Præcipitis impetu imbris nudatæ iterum ac diligenter adobruuntur. Quoniam verò radices eadem frigoris humorisque temperiem requirunt; idcirco definentibus areolas laterculis proximæ & prope contiguæ vtiliter asseruntur. Placet nonnemi fugacis quæ nominis, quæ floris anemonas, quippe quæ ventum sonant, ac vento facile distantur, toto anno vernare. Idcirco radices illarum quotquot mensibus obruit, folijsque fibrisque postmodum arefactis, eruit: arque, ut annuæ tempestiuitatis constantes vices custodiat, quo mense radicem vnamquaque semel seuerit, eodem semper in posterum referit. Verum authore me nemo istud assiduum ver à delicatis radicibus extorqueat: quod præpostero, atque intempestiuo satù sæpe abortiuntur; ac sæpius etiam, suas violari leges indignante natura, non pariunt, sed pereunt. Solent minutim confertimque ocellatæ radices, eius præsertim anemonas, quæ Persicæ arboris flori concolor subrubet, aut quæ sordido pallore albicat, in densissimam foliorum

rum siluulam, sine floribus inamœnam euireſcere. Sic nimirum ſperata mortalibus felicitas ipſo frequenter flore fraudatur. Quærenti quid ſit, cur folia pro floribus exeant, hanc habeo ſubijciendam cauſam, quòd illiuſmodi radicum oculi ſpiſſa, genitura indiſtincti conglobatique nequeunt fertili terræ complexu commodè foueri, purioremque ſuccum exugere, quem efferant in flores. Quare, quæ craſſiori alimento congruat, fulca foliorum viriditate ſilueſcunt. Sic igitur hæc radices ad bonam florum frugem reuocato. Confer tos oculos deiungito, vt efficacem ſinguli fundendis floribus tenuem humorem trahant. Serriſſimè ſerito, vt, qui ſolis accèſſu iam probè concoctus attenuatus eſt, terræ ſuccus ſeſe faciliùs in radices inſinuet, atque inde in flores egerminet. Illud autem in ea, quæ lato eſt folio, anemona, peculiare ac mirabile monſtrum sæpe viſitur, vt ex eadem radice flores tum folioſi, tum ſimplici foliorum orbe degeneres exiſtant. Abortus iſtius origo eſt ipſa radix multorum incommodè fertilis oculorum. Genitalis enim ſuccus & vigor, dum in plures latè oculos diſſipatur, in ſingulis parcus & inualidus frequenter in abortiuum & mancum germen euaneſcit. Qui verò numeroſa foliorum ſerie confertiſſimos fundit oculus flores, hic & plus elicit humoris, & ea tenacitate pollet, quæ vim incluſam, floris feracem, aliò

Abortus im-
pediendus.

Luxuries co-
ercenda .

Exemptio, &
custodia .

aliò distrahi non patiatur . Quamobrem idem & circumligante pediculum filo præsignandus , & à cæteris deinde ad optimam sationem deiungendus est . Hieme præproperæ degeneri plerunque abortu orientur anemonæ . Quare , si quæ macie tenuatæ exuctæque appareant , solo tenus amputabuntur ; vt retardata fœcunditas tempestiuos absolutosque in partus vegetior erumpat . Neque verò expedit in floream fœturam exhauriri delassarique radices : sed ultra duodenos fœtus attondenda luxuries est . Flores forficulis vtiliùs succiduntur , quàm vngue demetantur : quia ipse demetendi nisus radicem solo leuiter hærentem sæpe reuellit , aut luxat . Quotannis , aut altero quoque ad summum anno distrahendæ sobolis ergo emeritæ radices refodiuntur : aggeratò interim solo ab æstiuis feruoribus , pluuijsque vindicantur ; eoque post imbres autumnii primores subducto exonerantur . Quanquam æstatis caloribus imbribusque defendendis cumulatim aggeratum solum areolis quidem peropportunum , at fictilibus prope irritum munimentum est . In angustiora enim atque extantia fictilia nimius & calor , & humor se penetrant . Vnum ergo potissimum tutamentum est recessus . Quapropter , vbi consitæ iam testæ defloruerunt , in locum recipiantur solis radijs , humorique pluuio subductum , animabili tamen ac spirabili elemento peruium apertumque , & salubri aura perflabilem .

lem. Id enim temporis ab æstiuo ardore quàm folijs exuctis exultisque, quàm subeunte ad eadem folia humido alimento, in parentum sinus refuso repulsoque, radices quàm maximè humescentes interuiscere atque interire periclitantur. Quas efodi non placet, Septembri mense superiniecta, digitum alta pinguior humus refouebit. Extremo Iunio cum concreto & cohærente solo fibrisque refossæ sicca in cella reponuntur: diebus octo ex- Diuisio. ætis tempestiuè repurgantur, adnatæque soboles, utpote à recenti terræ complexu tenerrimæ, faciliùs diuiduntur, quàm cum arefactæ penitùs obduruerunt. Ad hæc teneriorum vulnus contra vitium, tabemque occallescit; aridarum plaga neque callum, neque cicatricem ducit. Dislociabiles apè concinneque culter intercidet. Ista verò cura & procuratio anticipata atque præpropæra vixdum erutis noceret. Ex humentibus quippe terræ latebris in lucem caloremque remissæ rugarent; rugisque nouo deinde fatu distentis, aquoso tabificoque humore turgescerent. Neque verò plures in partes comminui radicem vllam expedit, nisi facilè diuidua sit. Illud ergo custodiendum est, ut nati circum vetulam parentem oculi, qui vix hæreant, detrahantur; intacti maneant, qui tenaciùs copulentur, ne magno vulnere diuulsi vitium exitiumque concipiant. Solet etiam anemones ima radix, ubi Caries eradenda. satis adoleuit atque consenuit, exedi carie, situque mar-

marcescere. Senile hoc vitium impacto talitro exploretur. Etenim, si ex sonitu exesa, lacunosa, & vacua radixprehendatur, ad viuum vsque sic ferro morbus eradendus est, vt caua radicis æquentur; ne lacunæ humore oppletæ reliquam vitient integritatem. Quod enim sinceri superest circa repurgatum foramen, effœta & ferme exhausta genitali facultate, prius putrescit obrutum, quàm comprehendat: aut certè minutulis editis folijs, vel ad florem partum omnino sterilefcit, vel abortat. At verò, si putre cauum æquali vulnere ad viuum præsecatur, integra pars reliqua rite confita in bene compactos flores, numerosasque radículas geminæ fœcunditatis miraculo luxuriabit. Nec inutile fuerit præfectas ipsas reliquias, rectè deterfas, cum eiusdem notæ radicibus conferendas referuare. Nam fieri poterit, vt resectis viribus aliquæ ad florum fœturam vberriam reualefcant. Postquam verò salubriter vulnerata radix inaruit; terebinthina resina ceraque commistis debent aduersus corruptionem illini humoris noxij bibulæ cicatrices. Verùm si qua radicum ita vitiosa fuerit, vt æqualiter rescari sine magno integrarum partium, adnatorumque oculorum vulnere ac detrimento nequeat; cariosum foramen curiosè cultro expurgetur: arefactæ iam radicis lacuna prædicto resinatæ ceræ medicamento saturetur: in gracili tandem solo eadem conferatur. Parem soli gracilitatem

tem ob eam ipsam causam quærunt radices, quæ,
 licet incorruptæ sint, senio tamen laborant. Di-
 scolor & planè admirabilis anemonarum varietas
 iacto semine comparatur. Semen optimum in-
 ter anemonas latifolias, quæ foliosior floret, ple-
 runque dabit. Ex ijs verò, quæ tenui folio sunt,
 simplici flore vernantes solæ feliciterque semen-
 tant: earum enim semen in flores nonnunquam
 degenerat colore varios, folijsque multiplices.
 Geminam ex eiusmodi satu anemonen insignitè
 conspicuam nuper suscepit Ioannes Baptista Mar-
 telletus, qui Ianiculi montem cognomento Au-
 reum cultissimis hortis nitidiorem facit. Altera
 oriunda è pallido flosculo rubris maculis guttato
 palæa pallorem suavi rubore virgarum circumfu-
 sis explicat in folijs, eundemque densa surrigit in-
 coma. Candidam alteram purpureis vnguibus bi-
 colorem, duplicique laciniolo apice tum xeram-
 pelino humilius, tum subrubente celsius cristatam
 mater peperit filia quidem concolor, at simplici
 foliorum ornatu ignobilis. Meridianis horis tem-
 pestiuè legetur, dehiscente iam lanuginoso globulo,
 siccissimum semen cum exiguo cauliculi, vt me-
 lius maturescat. Rectè spargitur vel Augusto
 mense, vbi iam Leonem lustravit sol; hoc enim
 anticipato satū intra octo menses properus plerun-
 que flos indolem præmonstrabit: vel certè duo-
 decima Septembris luna, nempe ea die, quæ tri-

Semen tem-
 pestiuè colli-
 gendum & ie-
 rendum:

Io. Baptista
 Martelletus.

duo plenilunium antecedit. Sic autem deponitur. Præpinguis, leuis, maceratique soli cribraria farina in fictili catino substernitur. Super eadem lanuginosi seminis congeries tenuiter lateque explicata digeritur; aut certè vtiliùs eadem ante sationem cum prætenui solo in alucolo, vel in patina confunditur & permiscetur, donec, inuicem discretis penitusque cum terra confusis minutis seminibus, vnus & vnicolor terræ acruus appareat: ea deinde mistura rarissimè differitur. Eiusdem generis solum supercernitur cultri crassitudine. Binæ, ternæue matutini solis horæ, dum exeat in herbulam semen, indulgentur. Aquulæ præterea minutum ac lene stillicidium identidem irroratur, ne leuiter obruta sementis guttis grandioribus denudetur. Hæc autem vsque adeo ministrabitur irrigatio, quoad singulis è seminij terna folia exierint; quibus pro incremento humus eadem angustissimo incerniculo transmissa inspergetur, donec digitali radices altitudine obruantur. Cæterùm, ne hibernis algoribus nocturnisque gelicidijs inflata & fermentescens terra summo tenus solo depressas, & raris breuibisque fibris inhærentes radículas suspendat, ac regerat in apertum, eiectasque disperdat, ipsis consitum vas apricissimo loco, qui gelida tepeat hieme, statuatur. Vbi folia inaruerint, à pluuia & sole intra frigidam porticum reuocabitur. Nec ante medium Septembrem eadem radiculæ

diculæ refodientur, ne solis halitu exuētæ ac retorridæ dispereant. Mox adultiores separatim humi deponentur; minusculæ in catillis humabuntur. Sic tum probabili flore eligendæ, tum degeneri reijciendæ internoscuntur:

Ranunculi cultura.

CAPVT XII.

Ranunculus Byzantius, siue Asiaticus, radice in grumulos coagmentata veluti multipes (hic enim præcipuè in hortis colitur) antequam terram subeat, natære vult, donec per solidas quatuor & viginti horas frigida insuccatus & præmollitus ad facile germen intumescat: ut in humore terraque viuax rana in florem transiisse, nec tamen indolem nomenque amisisse videatur. Septembri mensē ante plenam lunam triduo intercedente conferitur. Ex hominis resoluti fimo concreta humo præpingui humidaque nutritur. Summa tellure lætatur in binos digitos demittendus, angusto interuallo in quaternos ternosue disponendus. Diuersi generis floribus inso-ciabilis solitario satū deponitur: affitos enim igneo frequenter veneno exurit & enecat. Primò expetit solem, qui florem ardentissimè coloret; deinde vmbra, quæ diutius eundem tucatur. Ea

Ranunculus
radiculis in
grumū acer-
uatis.

re commodiùs in fictili deponitur . Siquando irriguam aquam in sicco sitiât , adaquandus : siquando familiari ranis inconstantia exiliât , aggesto solo tegendus est . Vt primùm folia caulesque inaruerunt , effodi statim debet ; quòd æstiuus tum imbribus humoris auidus profilit è terra , tum feruoribus retorrescit & corrumpitur . Huius persimiles aceruatis in grumum radiculis , at simplici flore dispares ranunculos in olerum terra pinguiore à sole nonnihil auersos ita obrues , vt eadem binis digitis altè superueniat , quaternis intercedat : quotannis erues , ac superioris instar custodies : vt citra spem foliosi floris colore degenerent , semine feres . Qui rutæ folio virescit , foliosoque flore flauescit ranunculus , quærit vas fictile , bonam olerum terram , apricam positionem , digitorum insatu duum altitudinem , trium intercapedinem . Radice molli nudaque cum sit , diu inobrutus noxæ obnoxius est . Septembri mense eruitur , & , sobole subtracta , reſeritur . Quare vbi foliorum vires exaruit , frigidum in locum recipitur , ac Sextilis mensis imbribus , ne nouas citet fibras , subducitur : aut certè vtiliùs amissis folijs statim effossus , iterumque consitus in auerso ab æstiuæ sideris radijs angulo delitescit ; vt æstatis imbres , fibrarum illices , in eundem bellè depositum innocent , atque adeo salubriter incidant . Non absimilem cultum desiderat nemorensis fibrata radice , albaque

Flauus multiplex folio rutæ .

Fibratus florere pleno candido .

que flore multiplici Ranunculus. Terra enim pariter olitoria humectaue, vase fictili, duum digitorum depressione, post amissa demum folia subdiali opacitate lætatur: mediocri verò apricatione contentus est, nec extrahi vult, nisi ad sobolem fecernendam, ineunte autumnò, statimque adobruui postulat, disferetis passisque capillaceis fibris; quemadmodum Iridem Clusij priorem serendam esse monstraui-mus, & Pæoniam deponendam pluribus trademus. Glomerato quoque flore globosus exigit in bona Globosus, riguaque olerum terra, & positu mediocriter apri-co, nullo testæ vel areolæ discrimine, minutum fibrarum capillitium diffundi: radicis oculum in-digiti altitudinem demitti, vt is deinde conspicuus à terra extet: nunquam refodi, nisi cum fœtus numerosior à matre fuerit separandus: extrema hieme simul effodi, simul inhumari. Tuberosus Tuberosus, in quaternos digitos deprimendus, & palmi di-midio interuacante distinendus: eiusdem soli bo-nitate, solis mediocritate, assiduoque terræ lati-bulo gaudet, præterquam si adultiorem à paren-te prolem abiungere opus sit. In hanc opportu-nitatem exitu Augusti refoßum tuber illico recon-datur.

Asphodeli, Pæonia, Lilij conuallium,

& Luca Indica

cultura.

CAPVT XIII.

Asphodelus.

Asphodelo tres alrè digitos deponendo, palmarique mensura sejungendo attribuunt solum pingue; humectumque, ac modicè apricum: alternis quoque annis eximunt, quò adnatam sobolem subducant. Ex opacis montibus siluisque accita medicatissima Pæonia sublustrem opacitatem aniat. In olerum pinguiore humidoque solo defoditur, ipsius radice oculis ternos tantum in digitos depressis; triumque circiter palmorum, quoquouerfus interstitio relicto. Translatione non gaudet, præterquam tertio quoque anno, cum subterranea radicosorum oculorum sobole, conspicuoque ramosorum foliorum nemore partes in omnes nimia diffunditur. Si quando igitur eam refodi transferrique oporteat, Nouembri extremo id fiat: quia, cum fibras nondum egerit nouellas, exempta non læditur. Citra vulnus fracturamue diligenter eruta plures in plantas sic diuiditur, sic diuisa repangitur. Quoniam præcrassa radice crura multiplici dubioque flexu implicat; intra magnam aquæ vim perbene priùs agitur ac diluitur

Pæonia.

Plin. l. 15 c. 4.

et l. 27. c. 10.

luitur, vt, hærentis terræ deterfis sordibus, deprehensi facile nexus extricentur, aptiorque secturæ locus dispiciatur. Ad hæc ipsum radice caput in oculos ternos quaternosue, aut etiam singulos cultro conciditur: in excauato scrobe medius congesti soli turbinatus cumulus excitatur: eidem radix ita imponitur, vt oculi ternos in digitos subsidant, crura verò per excitati monticuli ambitum bellè diuaricentur; quia, si mutuo implexu inter se contingerent, minus è terra pabuli haurirent, faciliq; negotio corrumperentur. Admoto demum solo eadem circumregitur; vtque illud arctius hæreat, etiam irrigatione iuuatur. Fortè diuulsi balani depangi debent; quia iustam sobolescent in radicem. Lilia conuallium geniculatis internodijs confertè contexteq; colligata & cohærentia in ipso satu non extricamus atque distrahimus: sed à materno cæspite oculis confertissima, & radicum nexu ferè inextricabili catenata cultro discindimus: mense Nouembri, aut etiam Decembri non amplius tres digitos obruta in pinguibus vmbrosisq; statuimus, ne videlicet patrias conualles mutasse videantur: irriguam siticulosis aquam ministramus: vix vnquam loco mouemus; quia in angusto spatiosè vberimeq; florent. Summam prædictis mensibus per annos singulose fœtam humum caute scalpendo subducimus, recentem aggeramus; quia numeroso fœtu densissimè propagata profiliunt. Luca Indica

Lilium conuallium.

Luca .

ad nostratis oleris altricem, validam humum libentissimè diuertit: nostra frigora tolerat: apricitate etiam lætatur: infœcunda seminis adnatis oculis sese propagat, vt arundo; similique cultu sata digitali solo tegitur, subinde altioris aggestu soli, prout exiget vsus, obruenda. Ea propter quatuor à summo scrobe digitos primò depacta distabit. Vernæ temperies hæredibus à matre vulsis prosperè transponendis tempestiua est. In fictilibus positi maturius adolefcunt, seruanturque curatiùs. Modico per ætatem tum sole, tum humore proficiunt. Possunt autem iam satis adulti è fictilibus in hortenses puluinos cum suo cæspite differri. Sed matrem ac sobolem areolis inhumatas transmouere non expedit.

Trachelij Americani, Lychnidis Byzantinæ, aliarumque consimilium herbarum cultura.

CAPVT XIV.

Trachelium
Americanu.

Americanum indolis mollissimæ trachelium declinandæ multiplici noxæ idoneam testam desiderat. In olerum bono, bene macerato, & nequaquam verminante solo proficit: ab erucis enim & limacibus ob teneritudinem auidè appetitur. Frigoris tolerans tepido cautiùs loco hiemare debet. Caloris peramans irriguam aquam sicire non debet. Annua translatione peren-

perennat: quia densius sobolescent, nisi sæpe rare-
 fiat ac differatur, ipsum sese opprimit & marcescit.
 Februario mense, aut primo vere tutò transponi-
 tur, & sobole feritur; cum scilicet, hiberno frigo-
 re coërcita florea luxurie, maxima incrementa,
 viresque cepit materna radix; adnatique pulli, ma-
 tris vberè saginati, complexuque defensi validè
 conualuerunt. Auulsi oculi passis, ut vberius ali-
 mentum trahant, fibris in binos digitos, siue sum-
 mo virore tenus demerguntur: illico irrigantur, ut
 solum adhærescat; & proferuntur in solem. Id
 enim plantæ genus opaco auersoque à radijs lo-
 co facilè putrescit. Sed, ne delicatum flosculorum
 ver ab æstu præmaturè deflorescat, à diuturna in-
 solatione auertatur. Semen auiti coloris in flore te-
 nax citra spem iacitur varietatis. Eodem propemo-
 dum cultu *Lychnis Byzantina* testæ committitur. *Lychnis By-
 zantina.*
 Hoc autem distat, quòd resecta radice portione
 ternis quaternisue minimùm fibris crinita propa-
 gatur: cum Americani *Trachelij* fœtus à matre si-
 ne vulnere separetur. Terram pinguem, tempe-
 stiuiam irrigationem, tepida & ab *Aquilone* auer-
 sa quærit hibernacula. Editiore in loco vegeta-
 viriditate iuuenescit, ac diu viuit; in imo pallida
 senescit, breuique interit. Vbi florum pila pro-
 pe iam globata ex toto est, à sole distinetur; ut
 floreat fructus & voluptas diuturnior sit. Cum
 sitit, irrigatur. Plures in plantas dispersita ita dif-
 fertur.

Fibratæ plan-
tæ.

fertur. Ineunte vere ocelli cum radicis particula
seiuunguntur, atque ad virentis vsque germinis ini-
tium inhumantur. Cæterùm, vt felicissimè sobo-
les proueniat, nouellus oculus cum exigua ma-
terni corporis portione, quamuis non fibrata, re-
uellitur: dimidio germinis defosso, vulsuræ plaga
vasis lateri applicatur: inuulneratæ parti solum bel-
lè apprimitur. Ita radix celeriter comprehendit,
ac speciosam in plantam feliciter adolescit. Auricu-
la vrsi, atque Lichen siue Hepatica multiformi
genere conspicuæ, aliæque huiusmodi fibratæ ge-
lidissimi Septentrionis plantæ bono licet in solo
apud nos minùs incommodè hospitentur, vitales
tamen non sunt; quia frigoris peramantes nostro
tepore tristantur & contabescunt. Nostrates ve-
rò, quarum pleræque semine conferuntur, per
æstum florentes herbæ pinguibus, riguis, apricisque
delectantur.

Caryophyllorum cultura.

CAPVT XV.

Caryophylli
satio duplex.

Caryophyllus vernaculus & semine & sur-
culo feritur. Ad optimam fœcturam bini
circiter flores è magno numero in se-
men exire permittuntur. Maturitatis indicium est
hiatus aridi folliculi, & seminis nigritia. Imum in
vnoquoque folliculo fœcunditate præstat: id enim,
pro-

propiore alimento liberaliter hausto , generosiùs
 maiorem foliosi floris numerum procreabit. Ex al-
 bi caryophylli semine multiplex varietas prouenire
 solet . Inter maculosos fuscis maculis distinctus vti-
 liter sementat ad progignendos insolita decentium
 macularum varietate perpicuos . Denique saturo
 colore fuluus pulchrè varieque degenerem , atque
 adeo candidam frequenter prolem seminat. <sup>Serendi tem-
pus.</sup> Semen-
 tem autem non Octobri mense , sed collecto
 statim semine facies , vt intra annum florem legas .
 Vt autem prodigiosè foliosis ac peramplis floribus
 abundes, quartadecima luna caryophyllum, Zephy-
 ro aspirante, seminabis. Quòd si genitalis & felix au-
 ra prædictam proximi mensis diem non sospitet, sa-
 tio erit procrastinanda , dum fertilis ventulus in-
 cidat in alterius mensis similem diem . Semen-
 fictili catino, præpingui minutimque succreta terra
 instrato, committes: in digiti dimidium demittes: lo-
 co per æstatem mediocriter aprico statues , qui ter-
 nis tantùm matutinis horis inoletur: crebrò irriga-
 bis. Ita intra dies octo primulam viriditatem cita-
 bit . Vbi quaterna foliola emiserit , diuturnum ^{Educatio.}
 promouebis in solem : vt frequenti humus irri-
 gatione semper humeat , curabis: exitu Octobris
 teneras plantas differes . Ita proxima flos æstate
 properabit . Idem præterea caryophyllus auul-
 sione felicissimè conseritur . Auulsi enim ab ra-
 dice pulluli , siue ramuli, vetustam partem aliquam
 è ma-

Propagatio
per surculos .

è matris corpore referentes, & rite depaſti, licet à
 materno colore vultuque non degenerent, nec
 æquè, ac ſemine conſiti, floreæ ſegete luxurient;
 hæreditariæ tamen pulchritudinis certiffima lau-
 de probabilis varietatis incerta decora rependunt.
 Quarto nonas Octobris, caryophyllorum ſurcu-
 los, tanquam certò comprehenſuros, depangere,
 muliercularum cultura eſt: hordei verò ſemina,
 tanquam alienas fibras inſito humore citatura,
 ſubſternere ſuperuacanea liberalitas. Feliciter pan-
 guntur à menſe Februario ad medium uſque Mar-
 tium, nempe ſub ipſum germinandi tempus. Deca-
 cuminatis folijs ſummatim attonſi, ſictilium la-
 teribus contiguo compreſſoque ſatu applicati,
 atque ita depreſſi, vt oculi emineant, fidelius com-
 prehendant. Non eſt, cur ima pars intorqueatur;
 aut bini ponendæ ſobolis extremi vetuſtique cum
 intercepto internodio articuli cultro diſſindantur.
 ſed vtiliùs vltimum geniculum circulatim medium
 diſſecatur, aridæque foliorum exſuiæ detrahun-
 tur. Terra congruit nonnihil effœta. Situs requi-
 ritur apertus, nec tamen apricus ad vicanos tri-
 cenosue dies, atque uſque eò, dum media fo-
 liola incipiant adoleſcere: tunc enim apricatio
 affidua indulgetur. Vtque inter diuturni ſolis
 incendia illæxæ tenellæ plantæ proficiant, fre-
 quens humor affunditur. Ita eadem exitu ſe-
 liciore, quàm ſi Octobri menſe poſitæ fuiſſent,
 ino-

inoleſcent , ac florem inducent . Eximiæ indo- Cura.
 lis caryophyllum naſtus ita curabis . Vbi annus
 algere incipit , totum caſpitem è prono fictili leui-
 ter concuſſo demiſſum eximes : tum implicitas ter-
 ræ fibras extremas in duum digitorum craſſitudi-
 nem circuncides ; cauebiſque diligenter , ne cohæ-
 rentis glebæ pila comminuatur , neue intercida-
 t. Glareolis deinde rite obſtructo fictilis imo forami-
 ne , vnum alterumue digitum altam mediocrem
 terram ſubſternes : ad quaternos quinoſue digitos
 bubulum aut vaccinum ſanguinem ſuperfundes :
 trium digitorum exile ſolum adiunges : circumton-
 ſum denique caſpitem impones , humoque pingui
 reliquam inanitatem explebis : in ſolem proferes :
 vt uſus veniet , adequabis . Verùm , ſæuiente iam
 brumali algore , in vaſe peramplo gallinaceum aut
 columbinum ſimum aqua bene macerabis : eo me-
 dicato liquore conſitum fictile rigabis . Ita , licet ſub
 huius cæli clementia caryophyllus hiberno frigore
 non admodum infeſtetur , magna tamen eidem
 hoc fiet cultu vigoris & ſecunditatis acceſſio , vt
 folioſiores vegetioresque flores eliciantur . Exacta
 iam hieme vulgarem aquam affundes , vbi deuexior
 dies deferbuit ; ne cum irriguo per æſtum efferue-
 ſcente humore radix pariter inferueſcat . Vt affiduo Flores conti-
 nuatio .
 grandiorique caryophyllo vernet annus , complures
 eodem tempore calyces dehiſcere non patieris ; ſed ,
 ſummis & primoribus relictis , detergebis adnatos .

Vt

Ut hibernis floribus abundes, æstiuæ, dum caly-
 culos inducunt, germina præcerpes: sic enim no-
 ua, quæ trudentur, seram maturitatem ad hiemem
 usque retardabunt. Quin etiam frigidioris oræ
 coloni consitas testas aut lætamine munitas, aut in
 loca tuta receptas ab iniuria gelantis anni asserunt:
 ubi verò tepidiore tempestate conferenauit, in-
 apricum reuocant: ubi nubilauit, aquis cælestibus
 exponunt. Ne pinguioris terræ lætitia, vberiorif-
 que pabuli sagina tam lautè cultos dirumpat flores;
 cum satis turgidos calyces intra biduum oscitatu-
 ros animaduertes, lineo filo bis terue circumducto
 medios religabis: ac denticulatum osculum leuibus
 æqualibusque incisuris librario scalpello factis la-
 xabis; videbisque ad voluptarium prodigium pro-
 fuisse vulnera, ut è calycum singulorum tubulis
 totidem quasi florea nemora exitisse videantur.

Alligatura, & incisio. Translatio. Illud autem in primis custodiendum est, ut hæc
 sæpius planta deplantetur, putrique senio amputa-
 to transponatur. Translatione enim mirificè pro-
 ficat & perennat: diutius relicta & reses folio silue-
 scit, flore minuitur, odore degenerat. Debent
 Puratio. ad hæc, ubi defloruerunt, nuduli cauliculi plerique
 imo tenus geniculo succidi, paucis admodum re-
 lictis, qui geniculatim & subinde floreat; dum
 attonsi & recaluastrati ramuli noua germinantium
 Locusticius foliorum iuuentute repubescunt. Eadem vilius
 planta inter fictilis angustias alitur, quàm in area
 paten-

patientiore: quòd in hac aut largioris alimenti nimia satietate disrupti calyces enormiter hiascunt, aut nescio quo loci tædio flores macescunt. Solis, *Insolatio.* quem vnice amat, largior copia facienda est; nisi tamen æstiuus floribus vernet. Tunc enim vel tecto, vel inumbrante velo, vel subducto radijs loco ferui dior apricitas defendi debet: ne florea seges, verficolori amœnitati nata, yehementi ardore præusta miserè flauescat.

*Granadilla cultura.**CAPVT XVI.*

Occidentalis Indiæ miraculum, occidentis Dei cruciatibus floridum, Granadilla nostrorum olerum pingui glebæ sic insueuit; vt inexpugnabili propagatione iam vbique luxuriet. Tres altè digitos toto corpore prostrata delitescere vult; quia ex omnibus geniculis geniculata radix emittit. Solis atque humoris appetentissima est. Feliciùs pangitur radix iunior; quia vernat vberiùs. Quam latiùs proserpere nolumus, in fictili serimus. Ne per imum foramen clandestinum exitum inueniat, neue per posticum fugitiua subiectum se penetraret in solum; obstitam tectam super laterculum statuimus: an captiua surreptitiam libertatem attentet, identidem exploramus:

mus: foras eminentem, iamque deprehensam feruili more demutilamus. Ne vasis angustiore ergastulo elisa spatium quærat apertius; iam adultiorem diffusio remque plures partimur in plantas, separatim ac dispersim inhumandas. Emicanti iam germini è cancellatis funiculis, vel arundineo virgeoue textu scansilis ansa præbenda est. Nisi enim diuini funeris efferendi pulchrè ambitiosa hæc planta adminiculum habeat, quo in excelsum euadat; breui parcoque germinatu veluti pudibunda sterilefcit, humique latè procumbere, longèque prosperere dedignatur.

Gelsiminorum cultura.

C A P V T X V I I.

*Gelsiminum
agreste.*

S Va est & agresti candidi floris gelsimino digna patritijs cultoribus, digna cultricibus curis amœnitas, ipso, quamuis fero, tum virore tum odore amabilis, nec inutilis. Vt enim fileam topiarias hortorum scenas hoc sequaci lentoque frutice speciosè textiles; siquis præterea velit eximium voluptatis fructum è vulgari flore colligere, virgas recentes, læues, teretes, digitum crassas, & bene fibratas vere, siue etiam autumnò fictilibus infodiat: duobus digitis, nec amplius, è terra emi-

eminere passus supra imam gemmam recidat: insiluulam prope bipalmem iam adultos ramulos circuntondeat: regerminantem luxuriam frequenti cæsura coërceat. Proueniet enim, vt pila confilis densissimam viriditatem ferè densioris floris odorato candore formosè conuestiens cum splendidas ædium, tum lautas conuiuiorum delicias exhilaret. Eadem planta pingui solo pabulanda est, ac liberaliter adaquanda, assiduo etiam in sole habenda; ne in materiam frondemque penitus absumatur. Mediocre quærit apricationem siluarum gelsiminum flauum atque inodorum: reliquam culturam superiori similem desiderat. Hispani seu Laletani gelsimini, quod à Catalonia ^{Hispanum simplex:} vernaculum nomen obtinuit, nulla satio felicior, quàm insitio. Siluestris igitur nouellas, nitidas, minimè scabras nodosæque, mediocre digitum crassas, & frequentibus fibris comosissimas plantas mediæ magnitudinis fictilibus de more committito. Et quanquam sunt, qui vix dum translatum siluestre gelsiminum inferant; tu tamen annuo spatio cautius alescere & conualescere finito; aut, si liber, autumnno transponito, vt semestri quiete satis virium recipiat, atque insitione magistra celerius feritatem dediscat. Mense Martio luna decedente inferito. Illud autem antiquissimum tibi sit, vt siluatici stylum quàm proximè inum nodum supernè præcidas. Ita enim insitus surculus faciliùs

lius coalescet: quia omne virentis alimentum, quod quasi quædam anima per medullam trunci, veluti per fistulam, naturali spiritu trahitur in summum, in ipsa nodorum densitate diutius hærens atque consistens augetur, nec angusto meatu contineri facilis complures per oculos vehementissimas in materias exuberat. Quare vberiori succo proximum insitum citissime inolescere necesse est, si præsertim, subinde coercita deterfaque siluestrium germinum luxurie, in vnum adoptivum furculum fertilis humor transcurrere atque confluere cogatur. Vbi quintam gemmam truserint germinæ, decacuminanda sunt, densiore ut ramulorum siluula, plus florum inductura, fruticentur. Alternis minimùm annis ineunte vere solidus cæspes debet eximi è testa, idemque ad binos digitos cultro circumsectus pinguiore humo adiecta suum in vas restitui. Quotannis primo itidem vere ipso tenuis insitionis capite id fruticis angustè deputatur. Nam, si virgæ sic præcidantur, ut vnus alterue oculus relinquatur, rara paucis ex oculis flagella pullulabunt, maligno fœnore vernatura. Sin autem caput infici strictiùs attondeatur; germinatu densissimo utiliùs capillabitur, & perennabit. Non possum hìc eos in re florea satis callentes existimare putatores, qui fruticem altiùs vulnerare metuentes sic amputant, ut citra imam gemmam ramorum aliquid extare patiantur; quod aliquandiu, dum

dum viret , noua in germina abiturum alimen-
tum inutiliter auertit in sese ; vbi verò exaruit , vi-
ridissimam plantæ iuuentutem intermisto senio
inhonestat . Crebras idem frutex amat irrigatio-
nes . Orientem solem spectare mauult , quàm oc-
cidentem : alioqui florum sterilis foliorum infelici
feracitate luxuriabit . Aestiuis mensibus , ac Iunio
potissimùm Iulioque non incommodè inoculatur .
Atque hoc sanè cultu fictilibus rite conceditur , &
curatur . Sed elegantius multò virentia hortensium
parietum aulæ opere topiario prætexit , & nume-
rosis grandibusque floribus iucundiùs distinguit .
Hunc in vsum siluestris gelsimini pleniores plantæ
humi panguntur , quæ spatiosa in area largioribus
satiatæ alimentis insitiuo è surculo productissimas
citant virgas , prædicto putationis tempore parciùs
amputandas , vt in propaginem submittantur .
Propagationum autem duo maximè genera sunt
in vsu : vnum , quo editæ à matre virgæ sulcis man-
dantur : alterum , quo mater ipsa prostermitur , at-
que in plures plantas per suas virgas diuiditur . Sic
igitur à matre virgæ deprimuntur in terram . Ap-
petente vere secundùm matrem scrobes fiunt : in
eosdem virgæ proximè maternum caudicem mo-
dicè contortæ , vt radices faciliùs citent , atque ar-
cuatim recuruatæ demittuntur : quaternis circiter
adobrutis gemmis sic retorquentur , & supra ter-
ram eriguntur , vt , cacuminibus defectis , vna , aut

ut maximè altera gemma relinquatur . Ita recentes propagines quà radicis , quà telluris , geminarum nempe matrum vberè tutelaque pinguius ac feliciter enutritæ ingens robur & vires capiunt : quin etiam inhumatæ renascuntur ex sese ; quæque modò filiæ fuerant , fiunt repentinè matres . Circumacto anno actis iam radicibus à materna stirpe amputantur , & , quò libuerit , differuntur , suis iam viribus parituræ . Hæc tamen flori ferendo minùs vtilis experimur : tum quia parçè florent , tum quia ocysimè euanescent , utpote fibrarum penuria laborantes , gracilique corpore imbecillæ . Quare utilior est propagatio , qua (sicut in vite fieri consuevit) ipsa sternitur mater , ut propagata soboles vberiore alimento vegetior assurgat ; cum scilicet iuxta imum fruticem ita , ne radicem lædamus , curiosè fodimus : ita in excavatam sulcum leniter prostratam matrem supplantamus , ne radicem eandem abrumparamus : cum deinde ex eo sulco veluti ramosas fossas deducimus , per quas , uti quæque virga postulauerit , nonnihil intorta propagetur ; atque (ut paulò priùs docui) humo propagines operimus , & ad vnā alteramue extantem gemmam præcidimus . Vbi radicibus emissis virgæ comprehenderit , transferuntur . Quanquam hæ quoque minùs fertiles viuacesque sunt , quàm quæ siluatici gelsimini robustis radicibus adoptiuæ inhærent . Satiū hæc peristromata orienti meliùs , quàm meridiāno ,

diano, vel occidenti soli aduertuntur; vt primæ lucis flos matutino candore fimiles amico frutici flosculos appingat. Humor eidem irriguus vbertim affunditur: niues & gelicidia cauentur. Quapropter hibernis menſibus in opertum obſita fiſtilia reuocantur: plantæ verò ſubdiales canneis aut ſcirpeis tegetibus protegentur. Par eius cultio gelſimini, quod, eiufdem generis cum ſit, duplici foliorum textura denſius floret. ^{Hiſpanum} ^{multiplex.} Quanquam propagatione atque inſitione ſæpe tentatus omnem eluſit induſtriam, fortasſe vt minore ſui copia, quò rarius, eò præclarius habeatur. Et hoc in fiſtilibus cauſis cuſtoditur. Alterum gelſimini genus, quod ^{Arabicum.} lato Medicæ mali folio, folioſoque miræ ſuauitatis flore Alexandrinum, ſiue Arabicum appellatur, præterquam quòd ſolo lætatur itidem pingui, multum irriguo, aperto inſolatoque; frigoris & caloris adeo intolerans eſt, vt frequenter vtroque peruſtus intereat. Quare in fiſtili obſeri debet, vt gelido anni tempore in opertis ac tepidis locis hibernet. Maturè, vbi primulo rigore inalgeſcit annus, recipitur in locum conſectum eum quidem, non tamen vndique præcluſum, ſed patentem & vtiliter perſſabilem, velut in porticum peramplam, quæ hibernum ſolem accipiat, & auſtrinis aſſatibus latè oſcitet, imperuia & impenetrabilis Aquiloni. Diuturnum verò periculum docuit, in occluſa cella repositum hunc fruticem foliorum deſluuio non

sine noxa caluescere. Debet idem præterea cæteris gelsiminis seriùs vere iam adultiore in subdiallem aream promoueri, atque, cum sitiet, ita rigari, ne folia madescant: quia solent irriguis guttis, quasi brumalibus pruinis, contacta dilabi. Per æstiuos tamen feruores minuta aspergine, quam scopulæ irrorabunt, mirificè recreabuntur. Hoc isti etiam conuenit frutici cum superiore, ut in siluaticum inferatur: veruntamen, ligno, folio, & flore cum valde discrepet, difficiliùs coalescit. Pauca culturam colligam vniuersam. In ipsa scabritia duritiaque nouo more delicatus frutex ipso, quo colitur, obsequio sæpe læditur, & blanditijs necatur. In eo putando discordes putatores & sententijs inter se, & ferro cum eodem digladiantur. Etenim verno (ut mos est) alij quotannis amputant in palmum. Nimis crudelem alij omnium annorum, trucidationem rati, leuiore tonsura summa tantùm cacumina distringunt. Alij, siluosa densitate interlucata, ramulos reliquos intactos relinquunt. Ab alijs denique duro tenus ramosa teneritas reciditur. In re adeo controuersa & plena dissensionis meam equidem sic interpono sententiam. Nonnullam singuli, vniuersam putationis disciplinam completuntur omnes. Primo alteroque ab insitione anno insitum angustè, imoque tenus oculo deputabitur: sic enim ille fiet crassior, & plures ex se, vehementioresque ramos eijciat; qui, cum instar qua-

tuor

ruor digitorum erunt , Hispani morè gelsimini nonnihil mutilabuntur , vt cum ipsi , tum maximè gemma crassefcet . Tertius annus palmares virgas in arbusculæ speciem indulgebit . Ita quotannis paulatim excitatus frutex in trium circiter palmorum altitudinem latitudinemque arborefcere permittetur : atque hanc in pofterum ftaturam annua puratio tuebitur . Quare gracilioribus , deorfum fpectantibus , diftortis , aridis , & fupervacuis ramulis decifis , pufillum arbusculæ lucum collucabit : vegetos , nitidos , procerosque relinquet , vbi prædictum excefferint modum , leuiter attondendos . Ita fruticis incolumitati & pulchritudini , fublata inutili fobole , confuletur , idoneique infitioni furculi comparabuntur . Ad extremum ftirpitis detrahetur , quæ folet ab ima ftirpe identidem pululare , matrem prælibans , mitibusque ramis alimentum præripiens , filuatica progenies . Ope- Americanum
rofioſiorem poſtulat culturam rubrum Americæ gelsiminum annuum , quod barbaro vocabulo Quamoclitum appellant . Morofa naſci ſemina in aqua , & in ſole ipſam tepefaciente habentur eatenus , quoad præmollita turgescant : aut ſingula , aut bina in ſingulis fictilibus pingui humo repletis duos altè digitos demerguntur : ſol , & humor affatim indulgetur : ventus immodicus cuitatur . De tempeſtiuſo ſatu diſſentiunt ſententiæ colonorum , alijs Iunio menſe , maturiùs alijs , alijs verò ſeriùs ſerendum

dum esse firmantibus . Ego satis habeo non ignobilis cultoris prosperum cultum proponere . Hic ergo Maio aut Iunio mense , lunaris curriculi quarta extremaque parte , bina seu terna semina conserit in fictilibus : quotidie meridiana irrigatione madefacit , & intra dies octo properato germinatu in lucem euocat . Vbi quatuor digitos a terra extiterint ; vnica in singulis testis relicta planta , reliquas cum adhærente solo in singula fictilia transducit , parique irrigat sedulitate . Sumit sibi deinde capaciora vasa , & aqua replet : confitas in hæc testas vndique potaturas immittit : humoris exhausti damnum crebro rependit infusu . At si exuperans æstus humum arefecerit , irrorato manibus imbre æstius Aquarius humectat . Quoniam verò conuoluulus hic ambitione reptitia summa rerum affectat : arundinibus cancellatim fictili circumtextis , intentisue funiculis duum cubitorum commodos illi gradus offert . Ramulos quoque succrescentes , siqui vaguli vacillent , arundineo septo , lineoue adminiculo applicat implicatque : vbi tortili reptatu arundinum & funiculorum fastigia superant , cacumina demutilat , vt maiore conatu luxurientur in flosculos . Monet hic etiam, semina , vbi vix inaruerint , diligenter esse legenda : quia frequenter è folliculis dilapsa minutulis nigellisque corpusculis vestigatorem fallunt . Testatur denique, eadem , nisi largo humore

re ac sole sollicitentur, vnum, alterum, tertium, quoque annum sub terra filere, antequam progerminent. Recens & rarum Romæ, phœniceo flore gelsiminum Indicum, siue Canadanum, præter solum pingue, exhalato pinguedinis vapore bene maceratum, felici positu apricum, radicibus ramisque fundendis vacuum apertumque, desiderat etiam cancellatim scanfile adminiculum, vt amœnissimam prætexat viriditatem; aut certè pedamentum procerum, contra imbres peruicax, decoriticatum, & scobina exasperatum, vt articulatim radicata fruticis brachia statumen adiunctum arctissimè pertinacissimeque complectantur, atque ambitioso reptatu in arboream altitudinem eueant. Debet autem à parietibus nonnihil distineri, ne floribus onusta pendula cacumina incurvantibus ventorum furij allidantur. Hiberna frigora non ita multum reformidat. A primo vere in extremam vsque ætatem rigari vult. Seminis, quod hoc primùm anno apud nos protulit, adhuc intentata latio est: necdum insitio cæsiōe ac vulnerē peregrini fruticis cum vernaculo adoptiua fœdera sanciuīt. Vna prospero vsurpata periculo cultura ita singularem stirpem docet esse multiplicandam. Verno, priusquam oculi fruticis intumescant, trigemmis ramulus præciditur: eius caput cultro diffinditur, ac depangitur binis obrutis gemmis, vt tertius nodus extet. Sic ex facili

Indicum maximum flore phœniceo.

ca-

capit & germinat, humore præsertim adiutus,
& sole.

Rosarum cultura.

CAPVT XVIII.

Rosa, risus anni pulchrior, & princeps hor-
torum purpura, vt antiquitatem hilarauit
ornauitque, ita exercuit & pupugit cura
magis, quàm aculeo. Sic igitur ipsam curauit & co-
luit antiquitas. Fidiculæ vesperi occidentis nouis-
simis diebus, mense scilicet Febuario, vbicunque
patiebatur cæli ratio, terram ad rosæ satum bi-
palio vertebat. Hoc eodem tempore, siue inter
Vergiliarum occasum & brumam rosaria noua se-
mine aut virgultis conserebat, vel antiqua curabat:
sarculis enim, aut dolabris circumfodiebat, vniuer-
samque ariditatem ressecabat. Eadem à Fauonio
fodiebat, iterumque solstitio. Sed locis calidis,
apricis, atque maritimis Nouembri etiam mense
rosæta instituebat. Satio multiplex erat. Alij enim
semina ponebant, quæ seriùs eueniunt. Ob id po-
tiùs caule conciso inferebant, & ocellis radicis, vt
arundines. Alij caules aut in propaginem depri-
mebant, aut radicitus recisos in virgulas palmares
interuallo cubitali adobruébant, & frequentibus
irrigationibus iuuabant, factas deinde viuiradices
trans-

Rosæ cultura
vetus.

Pl. l. 18 c. 26.

Colum. l. 12.
c. 2.

Pallad. Febru.
tit. 21.

Varro de re
rust. l. 1 c. 35.

Pl. l. 11 c. 11.

Pallad. Nouem-
bris. 11.

Pl. l. 21 c. 4.

Constant. Pog.
Agr. l. 11 c.
19.

Theophrast. de
hist. plant. l. 2.
c. 2.

transferebant. Ex horum numero Pangæi montis Plin. ibid.
 accolæ adeo translatione profecerunt, ut numero-
 sis folijs pusillas rosas in amplissimas explicarint.
 Erat præterea, qui non absimili more ante calen- Colum. l. De
Arbor. c. 30.
Plin. ibid.
 das Martias, siue post Vergiliarum occasum ro-
 sam fruticibus, & surculis quaternum digitorum
 longitudine, aut etiam ampliore pedalia per inter-
 ualla disponderet: omnibus annis per idem tempus
 circumfoderet & recideret, ut quàm diutissime
 conseruaret. Neque verò exputabant solùm, ve- Theophrast. 9
De hist. plant.
l. 6. c. 6.
De caus. plant.
l. 3. c. 24.
Plin. ibid.
 rùm adurebant etiam nonnulli: quia succi copia
 in foliorum ramorumque siluosam atque inanem
 luxuriam nimia fundebatur, nisi ferro atque igne
 in breuissimi ramuli vtiles angustias coercita, spa-
 tiosoque exitu prohibita & repercussa, diuturnio-
 re mora satis concoqui & perfici cogeretur, ut am-
 plè foliosos erumpere posset in flores. Fossio altior
 quàm frugum erat, leuior quàm vitium. Pange-
 batur nec pinguibus, nec argillofis, nec riguis lo-
 cis, sed raris, & præcipuè ruderatis. Quanquam, Constant. Pog.
ibidem.
 ut assiduè vernaret, singulis mensibus scerebatur,
 atque stercorebatur. Ad hæc ponebatur calido,
 prono ad meridiem, & sicco loco, magno naturæ
 documento, tum quòd Carthagine HISPANIÆ hic- Plin. ibid. c. 4.
7. & 11.
 me tota præcox purpurat: tum quòd arida & siti-
 culosa Cyrene odoratissimos flores, nebulosa &
 rosicida Aegyptus procreat inolentes. Iam verò
 florum callida ita posteritas rosas colit. In solo
 quo-

Rosa Italica
flore pleno
perpetua.

quolibet feliciter, at feliciùs in præpingui & ad so-
lem recliui, palmari altitudine tria cubita aliam ab
alia depangit: per autumnum effæto senio reciso
stercorat: arundineis parietibus, cancellata structu-
ra excitatis, applicitas implicitasque adminicula-
re nodat: capita quoque deorsum versùs curuata
substringit; quia ipso flexu retardatus, qui fruti-
cem permeat alitque, terrenus humor adeo coquitur
ac digeritur, vt numeroso & conspicuo flore
tandem exuberet. Italicam superiori per similem,
nobiliorem tamen, ac diligentius colendam semper
virentem, perpetuam, siue omnium mensium ro-
sam appellant: quòd ea sæpius amputata primùm
fasciculi aspectu confertissimos calyces simul pro-
mit, quos deinde paulatim atque per partes ad alte-
ram vsque putationem floream recludit in partum;
vt ipsos singulis mensibus vnà cum floribus in-
ducere videatur. Istò autem densiore calycum nu-
mero, florumque prope continuato vere maximè
distat hæc à superiore, quæ minùs diues floridæ
purpuræ rariores aperit virides alabastros. Vt
igitur omnibus, aut certè plerisque mensibus per-
petua vernet, sæpe intra annum, ac bis minimùm
deputanda est. Exitu Octobris superficies omnis
solo tenus angusta putatione succiditur, vt è duro
repullulet: ita enim citati calyces numerosiores
florea fertilitate perhiemant. Mense iterum Mar-
tio exputatur, vno aut altero ramulis articulo reli-
cto.

cto. Verùm , vt ferotini calyces tota æstate vernaturum subnascantur , tempestiui , dum conuiuent , verno tempore detrahuntur. In altiore solo depactam putator minùs compescet , quippe plus humoris trahentem , quàm quæ in fictili posita sit. Putationi dies aptissima censetur , quæ triduo quadriduoue plenam lunam præcedit . Quindecim spatio dierum ante ipsam putationem aqua non ministrabitur . Vbi iam siti nimia laborare plantam animaduerteris , priùs circumfodies , vetustæque terræ subductæ vice vel hominum attonso capillo , vel equino fimo iam putri lætificabis , bono solo confitæ ipsi testæ superinducto : tum crebris eandem irrigationibus refocillabis , salubri apricatione refouebis , à frigoris inclementia tecto tepiduoue loco tutaberis . Eadem ferè cultura conuenit ijs rosis , quas puluinis hortensibus commiseris . Sed , quoniam illæ ad incommoda temporum declinanda citra noxam transmoueri nequeunt , auerso à Septentrionibus loco depangi debent ; cum hieme progerminauerint , impositis tegeticulis à nocturni frigoris iniuria protegi ; & ijsdem remotis diurnæ apricitatis beneficio foueri . Quanquam optimus magister vsus iam docuit , id genus frutices , præsertim robustiores , citra frequentem putationem intonsoe pleaque anni parte vernare ; dum tamen & pinguis terræ pabulum , & irriguæ aquæ poculum frequenter

Centifolia
Bataua.

Centifolia
inodora.

Variegata.

Damascena.

ter & affatim administretur. Ut autem dapsilent
florum prouentum habeas, ipsa fruticum brachia
(quemadmodum in proximè superiore rosa monui-
mus) præcipitabis. Cæterùm eodẽ frutices multi-
plicare promptissimum est, si de more propagentur
in sulcos: si autumnali putatione resectæ virgæ mo-
dico inclinatu statuuntur, ac strictim attonsæ duos
de terra digitos extent: hac enim ratione radices
& germina vehementiùs impellent. Sationi huic
tempestiuus October aut Nouember est. Bata-
uæ centifoliæ robustum solum, frigidus modiceque
apricus locus destinatur. Virgarum aritudinem &
senium tantummodo exputare conuenit: quia ra-
ros in ramulos hæc planta dispergitur. Pullulans
ab imo stirpe soboles fibris nonnullis capillata dif-
fertur. Parem cultum deposcit nomine specioso
par, flore minùs amœno dispar centifolia inodo-
ra. Vario rubore maculosa, odore ac magnitu-
dine vernaculæ subrubenti persimilis, ligno du-
rior, ramis fruticosior, florum mediocriter ferax
querit aperta, aprica, & rigua: solo gaudet ro-
busto. Flos adeo mollis est ac delicatus, ut nebu-
las reformidet. Putationis vice summa ramorum
teneritudo decacuminatur. Fœcundissima radix
latè spargendam fruticat in familiam. Damasce-
na iucundi spiritus rosa, modò aureis crocis odora-
tior, modò argento tantùm foliofiore minùs odo-
ra, humore, sole, liberoque lætatur cælo. Frigo-
ribus

ribus non affligitur: imò etiam toto ferme anno germinat ac vernat. Vetusiorum virgarum, quas ætate duratas ægrè transcurrit humidum alimentum, angustam trunco tenuis cæssionem per diuortium veris atque hiemis amat; vt nouella virgea silua integro, ac nusquam intercepto satiata, succo lætiorē se vegetiorēque profundat: atque ipsa materni trunci reuifcens & iuuenescens anilitas florida fœcunditate luxuriat. Iunioribus verò caulibus idem frutex vnā vel alterā gemmā relictā vult: quòd illorum teneritas vbertim tractum facillè admittit, atque æqua portione disperfat humorem: & paucos in exitus compulsā germinandi facultas vehementior assurgit, siluescitque diffusior. Rosa hæc surculo, & viuiradice frigido in solo posita feliciter celeriterque capit & profilit. Obsoleto colore alba rosa, operi topiario densa & flexibili viriditate perutilis, validum solum, liberum solem, & vberem aquam expetit. Putationem recusat, præterquam si quis senio defectus ramus exaruerit. Vegetas, hortorumque textili ornamento commodas, recentes virgas antiquioribus, prout res feret, adiungi adnectique postulat. Vberri­mè succrescentibus ab imo virgeis nepotibus genus amplificat. Lutea rosa, quæ foliorum densissima flauet coma, frigore delectatur. Idcirco felicior in Tusculano, quàm in Romano, provenit solo. Illic enim plerunque foliosior flos mature-

Albicās flore pleno.

Lutea maxima.

turescit ac dehiscit: hinc inani florum spe sæpe turgidi alabastri sensim corrugati languent. Robustum solum, vacuumque ramulorum libertati cælum appetit. Quare arundineis cancellis implicari alligarique formidat. Tonsuram odit, quia summatim floret. Inutiles tamen, malè nati, aridique ramuli vtiliter interpretantur. Florum plerisque deturbare ante maturitatem expedit, ut reliqui suis absoluti numeris eleganter vernent. Quæ pullulat ab radice densior virgea soboles, primo vere auellitur, ac transponitur. Cinnamomina flore pleno. Rubra flore pleno. Arborescens.

tum vere auellitur, ac transponitur. Cinnamomina educat humus valida, irrigua, non admodum soli ostenta: luteæ rosæ communis parca putatio conseruat: propagat etiam reuulsus à materna stirpe pullus nonnihil fibratus. Inter purpureas princeps habetur, quæ quamuis leuiter odorata, plurimis tamen foliorum versibus ornatissima, impulsoque altero flore è medio sinu, velut apice regio insignis, superbit. Quanquam decora hæc non semper illam crista honestat: siue quòd solito foliosior prior flos genitalem succum absumpsit: siue quòd eundem florem nimius imber, & nebula corrumpit; aut natiuus, & familiaris vermis exedit. Luteæ rosæ debita huic etiam cultura debetur. Ita in vario rosarum genere variat hortensis disciplina. Nostratibus autem rosis reliquis præcepta generatim tradita satis consulent. Illud habeo extremo subiiciendum loco, sic esse rosei fruti-

fruticis, quem volumus arboreſcere, incrementa formanda; vt, imis mediſſque nepotibus ſæpius detractis, ſuccus omnis partim implendæ caudicis craſſitudini ſeruiat, partim ad ſumma germina euocetur, quæ putatoris artificio in ramulorum ſpeciem fingenda ſunt.

*Floridarum ſtirpium arboreſcentium
cultura.*

CAPVT XIX.

VNis ferè florum delicijs inclytæ arboreæ ſtirpes, quarum pauciſſimas adhuc Romani educant horti, peculiari diuerſaque cultura vix indigent. Olitorium enim ſolum, vliginoſum, & apricum vel omnibus, vel plerique prodeſt. Peregrinæ atque hœdites eo cæli terræque poſitu excipiendæ ſunt, qui loci natalis ingenio reſpondeat. Earum verò hæreditariæ poſteritati continuandæ lateque ſpargendæ conſulit ſeminatio, inſitio, propagatio, talearum poſitio, fibratæ ſobolis tranſlatio. Superèſt iam, vt publicæ priuata præcipuarum cultura ſubiungatur. Arbor Perſica folioſo roſeo flore roſarum æmula à vulgari cultu pomiferæ non abhorret: bono in olerum ſolo, humecto, apricoque proficit: inſitione ſoboleſcit, quæ crescente luna fieri debet; quia ſlos for-

Arbor Perſica flore multiplici.

Molle.
*Theſaur. Rer.
 medic. noua
 Hesp. l. 3. c. 15.*

reficiunt. atque multiplicant. Molle, arbor Indorum, quam nostris libuit Lentiscum Peruanam, siue angustifolij Terebinthum appellare, amat calidum cæli statum, bonamque humum, singulis alternisue annis sufficiendam: aridis reſectis ramis interpurgari vult: propagari debet, pullis, qui nascuntur ab arbore, de more in terram depressis, ac triennio post è matre decisis, quia lentas illi radices mittunt: si qua parenti adnascitur, vtilius planta transfertur: tenera & adoleſcens viriditas rigationibus adiuuatur.

Aquaticorum florum cultura.

CAPVT XX.

FLoridæ aquarum plantæ, veluti natantes hortorum Nymphæ, dilectis in vndis demersæ memoriam prope suffugerant. Sed age iam adhuc in tempore memores à terrestri cultu ad aquaticum tranſeamus: vt hoc etiam hortorum cultores gloriari possint, sese amphibios esse, felicique labore à se aquas conseri. Nymphæa, non solum forma, verum etiam nomine inter flores Nympha, gemina est. Altera Heracليون dicitur, quia Nympham erga Herculem zelotypiæ fabulosus ardor in frigidam aquarum herbam deformauit, radice nigra, scabra, & clauam referente, vnde Rhopalon aliqui vocant; folijs ferme orbiculatis, læuibus, herbaceis, in aqua sum-

Nymphæa
 duplex.
 Alba.

Plin. l. 15. c. 7.

summa natantibus ; flore candido , compluribus
 foliolis oblongis & acuminatis compactili , medijs
 lacinijs flauente , per Maium Iuniumque mensem
 vernante; cum defloruit, capite papaueris, in quo se-
 men pullum, splendens & milio maius. Altera radi- Lutea.
 ce alba, folio oblongo, flore luteo, capitato & ro-
 sam æquante, semine superioris instar subnigro
 splendidoque, sed paulò maiore, quia Peneo inna- 10. Ruell. de
Nat. stirp. l. 3.
c. 67.
 scitur in Thessalia, Thessala nuncupatur. Vtraque
 verò conseritur in fictilibus ternos minimùm pal-
 mos altis, fundo minimè pertuso aquam non tran-
 smittentibus. In binos palmos humus pinguiissi-
 ma, penitusque putris substernitur: ibi radix bellè
 collocatur: deinde trium altitudine digitorum si-
 milis humus adiicitur: aqua demum superfunditur
 ita, vt oras vasis exæquet; cumque illa subsederit,
 subinde recens infunditur. Resecandæ transpo-
 nendæque, cum opus est, radici, necnon demu-
 tandæ terræ Autumnus tempestivus est. Palustrem Caltha palu-
stris flore
multiplici.
 Caltham flore pleno luteo, in semen non exeunte,
 caule inani, palmari, obliquo, in alas diuiso; folio
 ferè Nymphææ, rugosiore, rotundo, succido,
 venoso, leuiter serrato; radice multis candidisque
 capillamentis fibrata, cultus educat non absimi-
 lis. Requiritur enim vas humori continendo
 non pertusum in imo, & summæ maceratæque
 pinguedinis solum. Hoc tamen reliqua cultura di-
 stat, quòd in digitum radix deponitur, quòd aqua
 super-

supernatare non debet, cum insuccatam limosamque esse humum satis sit. Licet autem hæc planta hiemem non reformidet, à gelido tamen Septentrionis afflatu eam auertere præstiterit. Vere floret, interdum etiam autumnò. Ut autem senescentibus novos flores continues, plura de illis vasa conferes: cum vnum aliquod prope iam flores amisit, humi acclinatum siccari ac sitire patieris: deinde aridam superficiem attondebis, terræ præpinguis exiguum adijcies, & aquam superfundes: ea industria flores alieno tempore euocabit, atque ita per vices vasa vere perpetuo lutei floris aurescent. Cum radicem viles eximere, sobolemque transferre; tum vere, tum autumnò id facies. Communis est cum Calthæ superioris cultura cultio Trifolij palustris, geniculata radice latè proserpentis; terna folia, ouata, glabella, & carnosâ singulis in pediculis surrigentis; flosculos hyacinthi effigie albos, densis albidisque staminibus instar Capparis capillatos, à medio ferè bipalmi caule sursum versùs palmari spica extollentis; folliculos denique paruos & rotundos rufo, milijque persimili semine implentis. Sicui præterea suppetat in hortis commodi fontis, aut lacusculi, aut piscinæ opportunitas; is meliùs poterit in imo eiusdem labro, prædicta terra constricto, & has, & alias aquaticas florum feraces plantas eadem ratione conferere, hoc est in aquis hortos instituere.

Trifolium palustre.

Indie

Indica stirpes in hortis Barberinis.

CAPVT XXI.

India quoque vt opum, sic florum prædiues
 expolitissimos Barberinos hortos singula-
 rium admirabili munere plantarum exorna-
 uit; vt illi suo similes Principi longè inter cæteros
 emerent, vt Romanarum delicijs Apum India ^{*Cassiod. in*}
 Romæ vernaret, vtque Numæ Capitolium vetus ^{*Chron.*}
 in Quirinali, postquam in dominatricis familiæ vi- ^{*Marlian. l. 4.*}
 ridarium reffloruit, amœnitatis Indicæ tributarijs ^{*l. 22.*}
 floribus coronaretur. Ea igitur ornatu barbara, inge- ^{*Epist. de Magni*}
 nio amœna, manu Pallas, vultu Venus, quàm stre- ^{*ad Rom. l. 3. 4.*}
 nuè pugnaci arcu, tam formosè feroci supercilio sa- ^{*India Bar-*}
 gittifera, vt appposito regnantes Apes dono cultuque ^{*berinis hor-*}
 demereatur, florum semina quæsitissima desert ad ^{*tis tributa-*}
 littus. Inde Neptunum per liquida regna natante, ^{*ria.*}
 curru non ita procul aurigantem breui sermone,
 compellat. O fluctuantis imperij tranquille modera-
 tor, qui per infidas & naufragas vias tenui ligno li-
 noque orbem terrarum vltro citroque portas: qui-
 que disternatas immenso elemento gentes, ven-
 tis licet reclamantibus, vndis licet obluantibus,
 mutuo commercio misces, atque vnum alteri
 mundum admoues, age, Apibus mellea suauitate
 amabiliter dominantibus remotissimæ Indiæ gra-
 tum obsequium siste. Quid autem mellificas Apes
 oblectet magis, quàm florei delectus amœnitas?

Has ego lectissimas Indici veris primitias præmitto, frequenti posthac florum munere semper vernantem erga Barberinas Apes beneuolentiam testatura. Breuiter ad hæc & alacriter felicitis itineris hilaratus nuncio Neptunus. Adsum vndarum Rex, velociore nunquam impetu liquidam immensitatem emensurus, ipsisque regnis potiori Barberinæ maiestati famulaturus. Exinde florum geniales merces transuecturum currum margaritifera tractus candidis diuitijs in obsequiosa ornamenta congestis digestisque marinæ Nymphæ artificiosè opulentant: utque longinqua doceat nauigatio quam prosperam Cynosuram spectet, in summo curru præfixum eminet gemmeum è Barberinis Apibus publicæ vtilitati laborantibus trigonum vice sideris insigne. Iam soluturo Neptuno intus forisque pretiosum munus porrigit India, fabrefactam scilicet auream pyxidem, inclusis rarissimorum florum seminibus, quam includente metallo, nobiliorem, paucis hisce multæ obseruantia notis inscriptam, Regnatricibus Apibus florem India tributum. Curru sublimem maris Dynastam, abeuntem comitantur agili natatu ludibundi Tritones, tenero cantu flexanimæ Sirenes. Subridet æquati æquoris tranquillitas: superfulget sinceri cæli serenitas; vnusque Zephyrus circunuolitans, cætero latente ac silente rauco ventorum agmine, illud blandè insibilat, I felix.

Ita





Ita præviæ Indiæ stirpes Barberinos ad hortos feliciter appulsæ sunt; atque inter mellitas aduolantium Apum blandicias feliciter hospitantur, totas floridæ Indiæ siluulas felicitatis illecebra mox euocaturæ. Longissimè remotis, necdum à patrio solo digressis præire cæperunt exemplo proxima eiusdem Indiæ plantaria, quæ non ita pridem Romanos ad cultores diuenterunt: cum certatim cupideque ad Hyblam properent Barberinam. Et adhuc sanè properarunt è narcissis qui florem amplissimum liliaceum rubente saturat croco, qui lilio itidem similis primitium candorem leui paulatim rubore confundit, quique puniceis folijs densissimam staminum cæsarlem coronat. Neque narcissis seignior venit, ut formæ, sic officij æmulator, hyacinthus, cui candor atque odor famam, tuberosa radix nomen dedit. Crassis quoque reptabunda geniculis Indica Luca lentè festinauit. Canadana pariter insolitæ magnitudinis fraga adrepere. Tenuissimis leuiter nixum fibris Americanum Trachelium facillè solutis retinaculis accurrit; Dominoque concolor Purpurato, flos Barberinus, & planta Cardinalis euasit. Ipsæ altiùs ac pertinaciùs humi hærentes plantæ, reuulsis prælongis radicum digitis, adfuerunt, Indicum scilicet flore phœniceo Gelsiminum, Granadilla, Vitis Canadana, Indica Laurus, Oleaster exoticus, Arbor vitæ, Acacia, Sinensis Rosa. Indica præterea peramplo folio, eleganti flore, frutuque prædulci Musa, quam Plinij Palam esse,

Narcissus Indicus è rubro croceus flore liliaceo.
Narcissus Indicus liliaceus flore purpurascens.
Narcissus Indicus flore puniceo.
Hyacinthus Indicus tuberosa radice.
Luca Indica.
Fraga Canadana.
Trachelium Americanum.
Gelsiminum Indicum maximum flore phœniceo.
Granadilla.
Vitis Canadana.
Laurus Indica.
Oleaster exoticus.
Arbor vitæ.
Acacia.
Rosa Sinensis.
Musa.
Nat. Hist. l. 12 c. 6.

Pa-

*Garzias ab
Horto Plac. Misf.
l. 2. c. 10. apud
Clas. in exot.*

Papyrus.

*Tobias Aldi-
nus.
Arbor Co-
ralij.
c. clas. Appen.
ad hist. plant.*

Palan appellatio Malabarica prope eadem persuadet, quo congruentius in Parnasso vernaret, quam vbi, Musarum volucres, Apes sibi nidificant, Musis mellificant? Addidit se stirpibus Indicis Aegyptia Papyrus, victuro in chartis Principi decora planta. Verum hæ stirpes rarum, illæ decus afferunt singulare, quibus vnos India Barberi- nos hortos herbarum scientissimi Tobiaz Aldini manu conferit & condecorat. Prior Americana Coralij arbor bono minutoque in solo intra testam semine sata nostratis phaseoli simillimo, splendide tamen rubente planeque coralino visendam in altitudinem exijt, pluribusque ab radice stolonibus fruticauit. Medius & crassior caudex tres digitos biennio impleuit. Palmari supra terram interuallo patulos dissipatur in ramos. Cortex per adolescentiam læuior viret: in senecta rugosior ficulnei facie pallet. Raris idem, breuib, pallidis, hamatisque sentibus armatur. Folia, vt in siluestri Siliqua, nullis incisuris interrupto, sed æquabili & prope rotundo ambitu circinata leuiter fastigiantur: ipsius etiam hederæ rotunditatem, amplitudinem, crassamentum, duritiamque referunt. Singulos hinc & illinc porrectos nervos breui pediculo nixa in triangulum terna sempiternò conuestiunt; ac temperato lætoque virore spem colorant coralini ruboris in floribus legendi, non inter naufragia expiscandi.

Flō-

Flores per arbusculæ immaturitatem Romæ nondum tempestiui, coraliū æmulaturi, pulcherrimique nominis fœnus maternæ stirpi repensuri expectantur. Reflorescens deinde arbor in concolores floribus phaseolos creditur siliquatura.

Hæc interim peregrinorum ritu pomorum, quæ ab acore nominantur, satis irrigata, largiter insolata, in primis autem inimico frigori subducta pulchrè valet & conualescit. Brasili-
cus Phaseolus è subnigro semine, lupinum æquantem, atque vmbilicum leuiter lunante, propter coctilem laterculum in bonam succretamque eorundem acidorum fructuum terram deposito tam feliciter extitit, vt intra annum quindenos in palmos adoleuerit. Simplici, tenui, caduco, & vitigineo assurgit caule, instar vitium statuminando. Dextro læuoque latere alternantibus è gemmis, quadruplici digito interuallatis, quaternum itidem digitorum ramuli erumpunt, mali Cydonij latiore folio triplici aut quadruplici semper virentes; indidemque virgulæ, duplo longiores porriguntur, primum flore fabaceo quâ candido, quâ subrubicundo, siliqua deinde (quanquam hæc nondum euenit) fastigiatur. Indicum hoc legumen à frigore tuta & aprica positione, aquæ præterea tempestiua mi-

phaseolus
Brasilicus.

ni-

nistratone in extero solo libenter didicit hospitari.

Sc-



Præsentissimis par antidotis, Malabarica Moringa, Moringa .
Christoph. 2
Costa l. Arom.
c. 35. Apud
Clus. in exot.
semine confita Erui simillimo, eodemque cultu
educata, in fictili vegeta, laxiore loco vegetior, iu-
cundissimi floris vice hilarem explicat viriditatem.
Caule ramisque nodosa simul, & fragilis ad Lenti-
sci naturalem staturam incremento iam cubitali
contendere videtur. Minutis & lentiscinis folijs
raram sterilemque adhuc, dum ista scribimus, ob-
tendit umbram, quippe fructus pedalis & octogo-
ni, crassitudine raphanum æquantis, nondum fe-
rax. Caius quoque siue Caius, ac Tamarindus Caius siue
Caius.
Id. c. 24. apud
eund.
Garz. ab Her.
Arom. hist. l. 1.
c. 30. apud
eund.
primulo germine præmiserunt exiguum sui tene-
rumque rudimentum. Illius arbor malum Puni-
cam, huius Fraxinum aut Iuglandem apud nos
etiam æquatura creditur: Caii nucem leporini
renis figura, & colore cinereo in rubrum incli-
nante, vas exceperit, humus bona nutriuit. Mense
Martio posita extitit Maio: Septembri quatuor digi-
tos eminebat. Lauri regię folio minutiore viret:
viget autem apricatione assidua, irrigatione sedu-
la, cautaque frigoris declinatione. Florem candore
formaque mali Medicæ flori consimilem, folio-
siores tamen, nec ita odoratum; itidemque
fructum grandiori malo æqualem, flauum rufum-
ue, bene olentem, spongiosum, succi plenum, cum a-
strictione subdulcem, è prominula nuce, suo scilicet
ex vbere, alimentum incrementumque sugentem,
accuratissima educatio pollicetur. Tamarindi Tamarindus,

arborem è semine, lupini ferè gemello, sed fusco, cura prope par, & cultura in duos iam extulit palmos, rufa & ramulosa virga surgentem, ramulis utrinque alterna serie digestis, & minutim foliosis; foliolis, veluti pinnulis, in alas è regione geminatis, diluto colore virentibus, acidulo sapore iucundis, & acrem herbaceum intinctum concinnantibus, sub noctem velut in somnum conniuentibus, bene mane velut ad vigiliam grato spectaculo sese pendentibus. Nec vana præterea spes est, alibi nesciam hospitari plantam in Apum ac mellis amœnissima Regia flores citaturam, qui candido colore, suauisque spiritu cum ipsis Medicæ mali floribus certent, octo foliorum maiore numero victores: medicatissimum quoque fructum addituram, qui Græcæ Siliquæ more proueniat,



Flauum Gelsiminum, Sinensis Orientis, siue (vt alij malunt) Indici Occidentis delictum, ac nostratis orbis miraculum, nullo melius in theatro, quàm Barberinis in hortis suspiceretur, quibus Urbanus Sol, Vaticano tum rubore tum candore nitidissimus, nempe Alius & idem beatissimè affulget. Accersuit ad Romanam amœnitatem Eques Cassianus à Putco, ad quem cumulatissimè ornandum & animi, & generis, & opum decora difficili alioqui fœdere conspirarunt. Misit Aquis Sextijs Salyum Nicolaus Faber Peiresius Senatorij cum ordinis tum consilij vir; cuius prudentissimis in Republica tuenda curis fructuosus labor florei cultus laudabili voluptate coronatur. Hic ergo frutex Romam, translatus in duo ferme cubita attollitur. Læui cortice, amaranthum referente, purpurat. Ab imo caule ramosus pluribus virgis, itidem in ramulos brachiatis, fruticat. Folijs vires saturato splendidoque colore conspicuis, oblongis, Puniceæ mali foliorum instar duriusculis, densis, non incis, non deciduis, quin in singulos ramulos coeuntibus, alarum aspectu per virgarum latera explicatis. Floribus autem flauet omnino aureis, vulgaris gelsimini simillimo pediculo innixis, per summa ramorum in umbellam diffusis, Hispano gelsimino minoribus, diutius vernantibus, inualecente cum stirpe maiora quotannis incre-

Gelsiminum
Indicum flauum odori-
ssimum.

Cassianus à
Putco.

Nicolaus Faber
Peiresius.

menta capientibus, eius floris, quem vulgò Saponariam vocant, facie retusis, suauissimè olentibus, arido etiam è cadauere odoratam animam spirantibus . Post florum gemmas baccis grauescit, minusculas oleas magnitudine primoque virore exæquantibus, à maturitate deinde liuentibus, maturæ instar vuz translucidis, inclusumque nigellum & longulum, quale pyra includunt, semen indicantibus, hìc præterea solitarijs planeque vnionibus, illic gemellis & coherentibus . Culturam exigit cum Hispano communem . Humorem in primis amat, & solem . Gelidam Septentrionis animam odit: imò etiam quodcunque hiemale frigusculum in tantum reformidat, vt viridissima folia luteo pallore tingat; corticem læuore, ac rubore decorum minutim granosa luridaque scabie asperet, ac decoloret; proserpente demum aritudine citò senescat, & pereat . Sed hiberno frigore infestari publica multarum stirpium calamitas est . Illa fruticis huius teneritudo peculiaris, vt, per æstiuos feruores sitientibus herbis cæteris expetito guttatimque propinato rorantis cæli nectare lædatur . Etenim floris folia vel leuissimo roris aspersu pallescunt, assiduo etiam infusu exalbescunt . Hac autem feliciter industria propagatur externus frutex . Virga ab exteriorē par-

parte , qua vix latum vnguem distat à matre , sursum versùs obliqua plaga in transuersi digiti longitudinem ad medullam vsque inciditur : incisuræ leuiter diductæ lapillus inferitur : sabulosa terra , vel argilla nonnihil humecta plagæ illinitur : oblitum deinceps vas in altiore laxioreque testam demittitur : & inhumandæ incisæ parti humus superingeritur : aut certè angustius , ac diuiduum sine fundo fictile vtrique admouetur , & modicè deprimitur ; vt ad obruendum propaginis vulnus satis emineat , nec nimio descensu matris radices conuulneret . Nisi verò id vasis suppetat , testaceis fragminibus circum oras fictilis defixis aggerando solo , tegendæque incisuræ parabile vallum excitatur . Sunt , qui cæspitem eximant è fictili , & ima parte subsecta , reponant : subsidentem autem incilam propaginem humo adobruant . Hoc alioqui percommodum inuentum eo nomine videtur incommodum ; quia , dum supernè prodest , inferiùs nocet . Subducta enim , quæ imam plantam alebat & fouebat , humus quidni noxæ sit ? Ergo per vulnera impetratis radicibus , anno iam exacto secundùm matrem abscissa virga transferretur : & Indicum aurum flauos in flores liberaliter egerminans nostro etiam in orbe propagabitur , hoc est (vt illustris poëtæ ferme eadem aurea ver-

ba in rem meam vsurpem) floridam parentem
 æmulata, simili florebit virga metallo.





FLORVM VSVS

E T

ADMIRANDA

LIBER QVARTVS.

*Florum structura multiplex.*

CAPVT I.



O potissimùm spectat vniuersa florum cultura, vt messem variè voluptariam faciamus, siue vt eosdem demessos flores multiplici serie velut arctiores in hortulos disponamus. Nouo igitur more, singularique felicitate hortensis messor præmaturum gaudij fructum in flore legit; ac tempestiuè merit, dum adhuc messis in herba est. Voluptatis enim seges tum maximè maturuit, vbi non-

nondum exaruit . Iamüero debet ex vſu , cum
 quis meſſuit , manipulos obligare , nempe florum
 fasciculos artiſcioſe componere . Et ſanè manua-
 lis hæc ſarcina tam grata eſt , vt ægrè dimittatur è
 manibus : tam pretioſa , vt in conclauia nobiliora
 recipiatur : tam ſuauiſ , vt oculis æquè naribusque
 blandiatur : adeo denique familiaris , vt ad concin-
 nitatis artem multorum induſtriam cultorum ex-
 citarit . Vnum ego ſæpius demiratus ſum Anaſta-
 ſium de Vetera , vetuſtæ nobilitatis iuuenem , eiuſ-
 ſcemodi fasciculos tam variè tam concinnè figu-
 rantem , vt in opere formoſiſſimo vna ſummè diſ-
 ſpliceat fugaciſſima formoſitas . Quare , ſi te
 quoque cura eadem blandè vellicat , hanc ſo-
 lertiam adhibebis . Flores eliges (vt ea tem-
 peſtiuitas feret) genere nobiliſſimos , forma-
 pulcherrimos , odore (quoad eius fieri poterit)
 ſuauiſſimos , colore diſcrepantes , numero plu-
 rimos . Commodiorem huic operi ſegetem Ro-
 mana in ora ſubminiſtrabunt Februarius , & Mar-
 tius ; quippe quibus multiformis Anemone , Hy-
 acinthus , & Narciſſus vberrimè proueniunt . E
 floribus autem alios numeroſiores , miniſque
 præſtantes metæ aſpectu denſiùs neſtes : formo-
 ſiores alios certa per interualla circulatim ita
 intermiſcebis , vt aduerſo ratæ partis reſpon-
 ſu bellè promineant : curabiſque in primis , vt
 florea metæ flore pulcherrimo ſaltigietur . In ſum-
 ma

Anaſtaſius de
 Vetera .

Fasciculi ex
 arte .

ma structura flores dispones praelongo caule
præditos, vt ad imum fasciculi manubrium,
quoad poterit, porrecti, altricem in vasis aquam
exorbere possint. Duplici fasciculum ratione obli-
gabis. Aut enim vnumquenque florum ordinem
bis terue, aut sæpius circumducto nodatoque,
ac deinde ad extremum vsque fasciculum grada-
tim demisso longiore lino dequincies: aut certè,
vbi summam seriem linea spira sine nodo sub-
strinxeris, florem orbem alium subijcies, supe-
rioris fulcimentum, ad quem pariter illigan-
dum spiram eandem cautè deduces: eodem-
que singulos orbes modo continebis, donec ad
vltimum deueneris, quem lini volumine multi-
plici astringes, non sine magno vinculi compen-
dio. Perfacili etiam opera floribus in vasculo
bellè dispositis, ac demum subligatis, vario fascicu-
los artificio compones. Illud autem vniuersè cu-
rabis, vt artifex collocatio discolori structura na-
turam imitetur grata varietate consulentem volu-
ptati. Cæterùm capulus ipse narcissinis folijs in
longitudinem demissis, conserteque compositis ve-
stietur: summa & ima pars lineo nexu coërcebitur:
linum autem circunuoluto narcissino folio vtrobi-
que, si libeat, protegetur: ad octo digitos producta
longitudo æquali cæsione terminabitur. Vt autem
struclilis hæc florum congeries discolorem viuaci-
tatem proroget, resupinato capulo frigida identi-
dem

dem infundetur. Sic enim cum proximi & conſpici, tum fortè remoti abditique ſcapi vtiliter portabunt. Quin etiam proderit flores ipſos leui aſpergine irrorare. Placet hìc florei faſciculi exemplar proponere, vt etiam oculis flores olfacias. Illud addo præterea, faſciculum exhiberi potuiſſe florum varietate locupletiore concinnioreque; ſed vni ſtructuræ in breuiſſima pagina indicandæ minùs miſcellaneum typum perinde viſum eſſe idoneum.



Commonstrare præterea conuenit Romanam, Calathus florifer triplex
 idest pulcherrimam florum architecturam, quam
 principum virorum animis parabili speciosoque
 tributo demerendis Tranquillus Romaulus, Tranquillus Romaulus. lauda-
 tissimorum gloria hortorum florentissimus, paucos
 ante annos excogitauit. E delibratis viminibus ca-
 lathus aut rotundus, aut ouatus, prona concaua, Calathus primus.
 parte gibbus, ac testudineatus hoc authore con-
 textitur. Media pars nonnihil editiore textura
 infixorum, hispidaque segete extantium, nec-
 non gradatim ad umbilicum usque assurgen-
 tium viminum corona minimùm triplici valla-
 tur. Et laxioris quidem coronæ ambitus ab ip-
 sius calathi ora quatuor circiter digitos distat:
 vnaquæque verò inter se binis ternisue digitis se-
 paratur. Vimineum solum, tum quod extra
 vallum porrigitur, tum quod interiacet, varijs
 florum ordinibus, distincta generum & colorum
 serie in ambitum dispositis, sic insternitur, vt,
 ipsis in extimam partem floribus obuersis, in in-
 timam caules inter extantia vimina porrigantur.
 Ipse autem calathi umbilicus supinis flosculis, quo-
 rum cauliculi priùs detruncandi sunt, **conferim**
 integitur. Surrecta denique vimina ordinatis flo-
 ribus perornantur. Id autem vt pulchrè fiat, in ip-
 sorum scapos, si vacui sint, eadem **immittuntur**: sin
 autem duriuscula medulla pleni, debent ipsi florum
 scapi modicè demutilati concauos alios in scapos ex

Alter.

Tertius.

altera parte inferi, ex altera verò vimina im-
mitti. Quin etiam custodiendum est, vt illa,
quatenus extant, vel vno caule, vel pluribus con-
uestiantur. Ita florea ætate aridæ quoque vir-
gæ sese induent in florem. At verò tulipis,
quæ concauo scapo non sunt, ordinatè statuen-
dis, peculiarem calathum, modicè cauum, ca-
lathiscis compluribus quatuor digitorum alti-
tudine intextis peropportunè capacem, eodem
authore Tranquillo, comparabis: calathi huius-
ce fundum myrtaceis ramusculis flosculisque
præsternes: eodem ornatu conuestitos quallos
lectissimarum manipulistuliparum, &, si collibi-
tum fuerit, humilioribus quoque florum ramulis
infarcies, vt eorum silua multicolor exciteretur.

Concinnior alia, & frequentius vsurpata florum
dispositio ea est. Vimineus orbis peramplus,
quantus in dulcarijs placentis, quas Martios panes
vocant, circumferendis adhiberi solet, compara-
tur. Quatuor in ipso æquali crassitudine ac lon-
gitudine arundines, pro viminei orbis amplitudi-
ne proceræ, in summo æquabiliter circumspectæ,
in uno bifurcæ, paribus à medio atque inter se
interuallis, in quadrum, necnon ad lineam defi-
guntur; transmissoque per singulas inferiùs effora-
tas lineo vel ferreo filo subsuuntur. Arundo cæ-
teris modicè prolixior ad eundem modum media
depangitur. Diffissis deinde arundinibus, aut
len-

lentis ramusculis, aut funiculis præfixarum quatuor arundinum ima, media, summa pars in orbem traicitur, aut circumligatur: atque huic etiam ad commentum circulus interior adiungitur, ne stabiliti extrinsecus arundinei calami summa intrinsecus parte impelli & nutare possint. Qui circumiacet planus ambitus, myrteis ramulis confertim assutis ita contegitur, ut, crassiore extremitate sub imum arundineum circulum nonnihil immissa, ultra viminei orbis oram aliquantulum cacumina exporrigantur. Exterior quoque arundineæ turriculæ pars myrti ramis, recto positu per ipsos circulos insertis, æqualiterque circumtonsus, conuestitur: interior concisis minutisque folijs, tres circiter à fastigio digitos subsidentibus, oppletur. Ad hæc super substrata prominente myrto multiplex & multicolor florum series multiplici ea lege digeritur, nimirum ut vnaquæque corona vnius & generis & coloris sit: ut, qui pulcherrimè inter se dissident colores, componantur: ut infimus ordo ultra myrtea cacumina flores porrigat: ut superior series summis floribus ad inferioris extremos pertineat, donec introrsus recedens gradata structura ad imam usque turriculam pertingat: ut florum scapi supra substatam myrtum extendantur, aut etiam (si per proceritatem liceat) sub imam arundineam coronam recondantur: ut præterea iacentium inter ordines florum alij nobilioris notæ for-

maque ſtantes flores ordinato reſponſu collocen-
tur. Cæterùm media turrita machina ordinatim
diſcoloribus ſorum fascijs ornatiffimè diſtingui-
tur, inſertis ipſorum caulibus & in conueſtien-
tem arundines myrtum, & in penetralis turricu-
læ congeſticiam viriditatem. Poſſunt autem flo-
res, qui circulis firmiùs innituntur, decorticatis
viminibus in ſcapos (vt ante diximus) immiſſis,
tremulo luſu audaciùs prominere, cæteris floribus
per anguſtiores circuitus verecundiùs corriden-
tibus, & myrto cohærentibus. Hic mihi ſtru-
ctor præmonendus eſt, vt grandiuſculos ſatiſ-
que conſpicuos flores ſimplici, minutulos &
parum ſpectabiles geminata ſerie diſponat. Sed
amœniſſimè vernare debet in floreæ ſtruce faſti-
gium. Ergo & frondeo ſarto flores vario ad ar-
bitrium ordine inſiguntur, & in ſummis arundi-
num internodijs fabrè compacti floreï fasciculi, ſi-
ue triumphantis in vrbibus Floræ vexilla formoſiſ-
ſima attolluntur. Licebit præterea ipſas arundines
arte multimoda collocare, vt innumerabiles for-
mæ ac gentilitia ſæpe inſignia exprimantur. Vſ-
que adeo floribus ædificare plauſibile eſt. Id ædi-
ficij præmaturè ne corruar, aquulæ frequenti aſper-
ſione ſuſtentabitur.



Cc 3

FLOREAE POMPAE FLOREVLVM TVRRITVM

Alias quoque perelegantes admirandasque moles <sup>Aliz moles
è floribus.</sup>
 opere nonnihil diuerso è floribus quà colligaris,
 quà solutis, quà integris, quà etiam concisis exci-
 tare cæperunt Fabritius Sbardonus, & Ioannes <sup>Fabritius
Sbardonus.
Io. Baptista
Martelletus.</sup>
 Baptista Martelletus, cultorum par, floris non-
 ferendi modò, verùm etiam concinnandi peri-
 tum in paucis. Vterque igitur è tabellis virgisque
 rudem compagem præmolitur: tum singulas ei-
 usdem partes apto flore (siue illæ minutum exi-
 gant, siue grandiore) ita conuestit; vt idem
 illic non apponi, sed nasci debuisse videatur.
 Vidimus nuper nouitate spectaculi Argo vetustæ
 non concedentem, fabricatam è floribus Nauem,
 cum minimè raptura vellus aureum, sed obse-
 quium auro pretiosius delatura ad meritissi-
 mum Principem, Carolum Cardinalem Pium,
 per Vrbem vela faceret, secundissima po-
 tiùs aura cum admirantium, tum plaudentium,
 quàm manibus prouectam esse gestantium; cui
 florum genitor Zephyrus libentiùs, quàm cym-
 bis ligneis, aspirabat. Verumenimvero hæ mo-
 les operosæ ac peramœnæ, quia citra copiosi assi-
 duique humoris opem facile arescente strue con-
 surgunt, mox elanguescentis atque dilabidæ flo-
 reæ pulchritudinis ruinosa sepulcra, & breuia
 Mausolea fiunt. Quare, vt recisus atque structilis <sup>Vasa floribus
immitendis
perforata.</sup>
 flos, nempe caduca res, vbiuis locatus aquam po-
 tet, ac diutius duret, nouo artificio & opportu-

Horatius
Grassius.

nam & lepidam excogitauit machinam nostro ex ordine fertilis ingenij vir, Horatius Grassius, non in mathematico tantum, sed in hortenſi quoque puluere Archimedes. Hoc enim inuento in quacunque figuram poſſunt vaſa deformari, quæ toto licet corpore perforato ſint, nulla tamen ex parte aquam effundant. Age ſubijciat oculis ipſa deſcriptio, quod animo fortasſe incredibile videatur. Placet in primis cuiusmodi vaſ, cuius pars ima in patentis polubri planam capacitatem explicata ſtructuræ ſuperioris planitiem, denſiſſimo ad hortorum inuidiam flore diſtinctam, repræſentet; editior verò pars turritum illud pegma, opere itidem flore exornatum, forma lepidiore victrix æmuletur. Huiusce igitur vaſis penetrabile arcanumque artificio illud eſt, quod pars diſſecta clarè patefacit. Totum enim interius vaſ quinque vaſculis, ſive conceptaculis, aut infundibulis, & quatuor aut reſectis, aut in latus inclinatis ſiphunculis, ad aquam ſenſim transfundendam vtrinque perforatis, coagmentatur. Et ſinguli quidem ſiphunculi ſub ima cuiuſque vaſculi foramina, ne humor effluat, porriguntur. Poſſunt minore negotio ſummæ vaſculorum oræ ſingulis grandiuſculis crenis ſic demutulari ſimul, & perforari: vt ſuperiore parte inherens, inferiore verò in labrum ſquamamue porrectus obex prohibeat, ne deſluens aqua exteriora per foramina exundet. Aqua è ſummo vaſis ore
deſuſa

defusa prius vasculum replet ad summam vsque fistulam vel ad crenam, per quam transmissa secundum, parique ratione reliqua opplet conceptacula; donec ex imis humilioris vasculi foraminibus exundans indicio erit, vas totum idoneo alendis floribus humore abundare: qui tamen è toto foraminibus peruiro vase non elabitur, quòd ad foramina non peruenit, quæ inditur, aqua; sed, ad summum vsque tubulum crenamue repleto superiore conceptaculo, quæ superfluit, per eisdem exitus in subiectum vasculum defluit, ac deinceps in reliqua, vsque dum ad infimum descendat; vnde tantum, si nimia transfundatur, redundabit. Ipsi autem flores ita collocantur, vt, qui foraminibus inferuntur, perparum emineant; ne conspicui vasis formam aduentitius abscondat ornatus. At verò in expositis quatuor conchis, quas totidem laruales vultus suffulciunt, singuli florum fasciculi lepidè compacti pulchriore candidis vnionibus discolore fœtu decenter extabunt. Media, in ore summo amplior & procerior siluula ludibundum in tremorem latè nutantibus floreis capitibus gestiet, suæque ipsa celsiori ac triumphali formositati plaudet. Eiusmodi vas quò grandius, eò fuerit etiam hunc in vsum opportunius: florum enim densior collocatio, ac diffusior porrectio partium decora singularum non adobruet. Quare palmarum minimùm quatuor altitudinem requirit,

quirit, quemadmodum satis edocet seorsum addita dimetiens. Illud habeo præterea subiiciendum, idem vas; quia & molis magnitudine, & inditi humoris copia, & florum additamento maximè ponderosum, & casui obnoxium erit; prouidentissimè factum iri, si minimè circumferatur, sed apta in sede, vnde commodè circumspecti suspicique possit, immobile statuatur.



Patefacta superioris vasis arcana structura intestinum columnæ artificium aperit, quo totam triplex foraminum spira conuulnerat, florea fascia suauiter medicandam. Eadem poteris arte obeliscum pulchrius, quàm Aegyptijs notis, insertis floribus inscribere. Neque verò minore cum admirabilitate, tum voluptate scatebit vas; quod vndeque perforatum plura, quàm ipsa vocalis Fama, pandit ora, vt, quæ uolumus, insignia seu notas floreis vocibus eloquatur. Tria hîc obseruabimus: primum, vt in foramina flores immittantur, qui solitarij funduntur è cauliculis: cuius generis sunt anemonæ, caryophylli, rosæ; nequaquam autem adhibeantur, qui singulis è scapis multiplici germinatu pendent, vt videre inter cæteros est in hyacinthis narcissisque. Illi enim, quòd pressè adhærent, quæ cupimus, distinctè notant: hi, quòd immodicè prominent, notata confundunt. Alterum, vt apto ad ea, quæ destinauimus, discrimina & exprimenda discolores flores ordine collocentur. Postremum, vt summo ex ore densior atque explicatior florum copia sic emineat, vt subiecta formositas pulcherrimè capilletur. Superest iam ferre omnibus id genus vasis commune, triplex artificium explicandum: vt videlicet, si velis conceptaculis singulis cum aquæ, tum scaporum facile putrescentium sedimentum situmque posse detergere, tota vasculorum serie extimæ dimidiæ

midia parti hærente , pars altera dimidia (si tamen ea lignea seu metallica placeat) adapertilis , confertisque fibulis nexilis fiat : aut eadem vascula medio tereti stylo continuata in extimi vasis theca, vtrunque seiuncta, & bipartitò diuisa, itidemque nexili claudantur : aut certè (quod in obelisco tantum & columna locum habet) integra pars extrema vasculis inanis elaboretur , deinde vasculorum series thecæ inanitati par medio perpetuoque stylo nexa disponatur . In adapertili autem uale citra siphonum crenarumque vsu vascula singula seorsum aqua poterunt repleri .



VAS ALIUD PARTIM FORAMINI
 PERVIUM FLOREIS NOTIS
 INSCRIBENDVM
 COLVMNA FLORIBVS IN SPIRAM
 INFIGENDIS PERFORATA.



At verò siquem magis delectat, in simplicioris artificij vase digestis floribus, sub tecto, atque adeo intra ipsum conclaue parabilem & translatitium, hortulum alere; noua forma fictile hic vsurpet, quod & animo primùm mihi finxi, & re ipsa deinde in hunc eundem vsum percommode vsurpare capi. Argillaceum vas placuit. Hoc enim meam mihi originem suggerit, ex argilla oriundo: hoc addecet paruo bene viuente, tenuique ditiſſimum. Potest argentea, vel aurea locupletiorum efficacitas artificioso testæ huius imitamento pretioso n. illud exhibere prodigium, vt argentum aurumque floreat. Pes modico gyro circumscriptus nonnihil extuberat: hunc trochilus, siue canaliculatus orbiculus angustat: summum trochilum torulus, nempe circulus eminulus coronat: inde vterculus breui ascensu extumescens laxiorem transit in vterum: amplior trochilus, siue collum quadantenus introrsum agitur: os prælargum, vteroque suppar in labrum nonnihil exprorectum resupinatur: binæ ansulæ in geminorum anguium spiras innocenter minaces retorquentur, quorum capita tortili lapsu labrum, caudæ vterum complectuntur: medios angues sinuato penduloque tergo in speciem lubricos vario circumplicati volumine anguiculi coërcent. Dicas, appositè spiris anguineis ansatum esse vas, immixtis floribus exornandum; vt in florida quoque ingenuæ amœnitatis herba anguem latere

intelligas. Operculum in aliquam hemisphærij seu tholi formam ad excipiendos habilem flores incuruum, grandiore foramine in summo vertice, minoribus autem in reliquo ambitu alternantibus foraminibus vndique peruium est floribus insertandis. Arrisit id genus operculi, quo ad arbitrium, detracto, & aqua, ne situ computrescat, vetere vniuersa effusa, recens identidem altero vel tertio quoque die infundi, & extremi florum scapi ab humore iam tabescentes, nihil prorsus mutata flore serie, attonderi possunt. Tota verò testa intus forisque læui ac polito albario inducta, extrinsecus Arabum foliosa pictura, quæ veris cùm floribus de venustate ceter, exornatur.



VAS OPERCVLO MVLTIFORO
AD FLORES ORDINATE CONTINENDOS





IDÈ VAS ORDINATIS FLORIBVS CONSPICVVM Dd 3

Sed ista florum gloria mutila est, ut integri decori sint: utque turmatim in fasciculos, tanquam ignobilium vulgus herbarum, colligantur. Nobiliores ad usus imminuti concisique traducuntur: perque ingeniola damna, & artifices iniurias noua musui operis æmulatione illustrium virorum vel insignia, vel etiam facta floridis sanè coloribus ad iucundam fallaciam clementiuntur. Tertio decimo abhinc anno floream hanc picturam exhibere cæpit Benedictus Dreus, Vaticanæ fabricæ præfectus, cumque optimæ indolis filio Petro Paulo hac arte quotannis exhibet. Pictam graphidem ad commensum operis præparat, ut fieri solet in emblemate vermiculato: deinde magnitudinis eiusdem papyrum oleo, quod è lini semine fuerit expressum, inungit: eandem siccato iam vngue translucentam ipsi graphidi applicat: corporum lineamenta innocenter impresso stylo circunducit, & acu spissè traiecta minutim perforat. Aequali præterea telæ, quæ bene intenta, & compactis in quadrum asserculis affixa sit, eam papyrum aptè imponit: attriti carbonis puluisculum in raræ texturæ linteolo conglobatim illigat, & pressè affricatum per foramina transmittit: sublata papyro, punctim notata in linteo lineamenta penicilli ductu continuat. Ad hæc multicoloris florei paratus quæ integris, quæ confectis, prout usus exiger, folijs artificiosè digestis umbram operis, lineis circundu-

Musiui opus
è floribus.

Benedictus
Dreus:
Petrus Paulus
eius filius.

etiam, ad expictæ graphidis imitamentum colorat. Ita, propter exemplum, oris humani temperatum ruborem caryophyllus ex albo subrubens appingit: genas rosa suo iure occupat, ut eas verè roseas appellemus: oculorum pupulas cæruleus ille, siue subniger flos infuscat, quem alijs hyacinthum botryodem siluestrem, alij comosum minorem vocant, in agrorum marginibus & secundum vias nascentem. Quin etiam idem, qui lumen geminat in capite, toti umbras inducit corpori. Flauet capillus in genista: nigrat in cæruleo hyacintho botryode: canet in candido caryophyllo: illuminatur umbraturque eorundem apta permissione florum. Vestes nobilitat & opulentat colore cælesti flos regius, qui ab equestris calcaris imagine vulgare nomen sortitur: purpureo silvestre floris rufi papauer, aut ruber caryophyllus: aureo genista: viridi myrtus. Usque adeo ambitioso labore quæsitæ expressique in urbibus colores in agris obuij parabilesque sunt. At verò cæli serenitatem cæruleo aspectu simulat prædictus regius flos: pallido nubeculas suspendit rosa Damascena, & gelsiminum. Multiplex in hoc opere faciundo provisio ac diligentia est. Locus enim deligitur frigidus & opacus, qui natiuos florum colores tueatur. Tempus destinatur exponendæ picturæ proximum, spatiumque circiter bidui breuissimum, ne minimè vitalis floreus decor ante gloriæ plaususque fru-

fructum euanidus consenescat. Discolor è floribus tectorium digiti ferè crassitudine inducitur, ne tenuius dilabatur. Vbi fuerit opus, flos elanguescens aut dilapsus recentatur. Aequali demum libramento supina destinata in sedem transfertur vno leuiter iuncta congestu structura, ne deuergentia illam confundat ac destruat. Hoc igitur artificio fabrefacta solemnibus Diuorum Petri & Pauli ferijs suspiciendarum rerum florea simulacra in Vaticani sepulcri ornatissimo pauimento spectanda proponuntur. Et alij quidem anni gentilia Pontificum insignia tergemino diademate ac pontificijs nominibus insignita: tyrannicarum alij pœnarum, etiam in floribus crudelia instrumenta: triumphales palmas & coronas, alij: cœlestium alij Legatorum par nobile, Petrum scilicet diuina potestate clauigerum, & Paulum penetrabili eloquio ensiferum, ab vltimo complexu ad supplicium digredientes: alij demum eisdem vno tumultu compositos ea struētis floris arte repræsentarunt; vt in Vaticanæ maiestatis obsequium citra vllam artem admirabili spontis suæ pictura pauimenti marmora ipsa vernare viderentur. Postremus hic tandem annus eidem Petro arcanam Christi Diuinitatem submissè adoranti, diserteque profitenti solidam beatitatem oris diuini oraculo rependit. Et licet vtriusque diuerbium dociles flores grandiore subiecta litterata pictura eloquerentur; ipsa tamen corporum
florea

florea conformatio tam arguta erat, vt in eadem animi sensus vocesque sentires. Videt igitur iam omnibus annis, & obstupescit sapientissima miratrix Roma feliciter artificiosam audaciam: quando sine fabulosis præstigijs & offucijs licet floribus in Heroas Diuosque transformari. Fuit etiam nuper in celeberrimo confluentium spectatorum concursu, qui sic plauderet, nostra, quàm prisca, elegantius & efficacius ætate sepulcra floribus conspergi, quorum vegetis coloribus extinctorum maiorum non modò decora, verùm etiam ora reuiuiscerent: nec alia decentius posse, quàm concisorum purpura florum, Christianæ religionis principes propugnatores, illustri cæde purpuratos, expingi: vt piè fortiterque fufum cruorem vel à funere vernaturum interpretemur. Illud præterea decorum gratumque spectaculum eadem nupera, solemnia exhilarauit, vt flores in amicas Apes, Barberinum insigne componentes, reformarentur. Hæc autem fuit visendæ rei structura facillima solertis inuento iuuenis Stephani Sperantij, qui sub inclyti nominis equite Ioanne Laurentio Bernino egregiam nauat operam statuariæ. In duobus depictis vasis regiæ lauri trunci singuli sic depacti sunt, vt aliquantulum prominerent. Geminæ vtrinque generis eiufdem foliosæ virgæ adalligatæ connexis cacuminibus quatum in orbem coeuerunt.

Apes è floribus:

Stephanus
Sperantius
Io. Laurentius
Berninus.

runt. Ad hæc alios è cera, ex herbaceis fasciculis alios Apum typos, dimidiatum ferè palmum longos, gummi Arabica bene perlitos, genistæ folia ordinatim adiuncta contexerunt: fulciores alui lineas circulatim intercurrentes flos Africanus minor, supernè in fuluo rubens, mollique holoserico villosus colorauit: capita minutatim incisus asphodelus liliaceus obsoleto rubore distinxit: oculos rotundauit saturo colore purpurea scabiosa, quæ fortasse Aëtij pfora est: membranaceas alas eiusdem asphodeli rigida folia porrexerunt: furculaceos pedes itidem genista calceauit. Ita floridæ ternæ Apes tum imo trunco, tum porrectis hinc inde geminis interioribus ramulis in triangulum, vt in insigni Barberino visuntur, insistentes si non palato, at certè oculis animisque spectatorum noua voluptate mellificarunt. Iam verò multiplex euulganda solertia est, qua delicta, & obnoxia florum missilia etiam ad oras longè remotas citra corruptionem vitiumque spargimus. Minimi laboris, tutelæque magnæ prior est, quam non semel à me laudatus adhibet Fabricius Sbardonus. Huius igitur exemplo capsula paratur palmum alta, palmum cum dimidio longa. In ea myrteis ramulis rorulentis, leuiterue madidis tenuis torus insternitur. Super hoc mane lecti cum longis cauliculis, roscidi, necdum satis hiantes flores ita deponuntur, vt ore om-

*Matthiol. in
Diosc. l. 4. c. 17.
Ruell. de Nat.
strep. l. 3. c. 82.*

*Ad flores longè
mittendos
capsula multiplex.*


*Fabricius
Sbardonus*

omnes reſupino cubent, vtque ſingulorum capita pedefque alterno poſitu adiaceant. Interiectum ſpatium breuiores floſculi complebunt. Ne bellè depoſiti flores vecturæ quaſſu emoti agitarique ſubſultent & collidantur; proximè florum ſcaporumque iuncturas vtrinque foratis traiectiſque binis aduerſis capſulæ aſſeribus tranſuerſi furculi induantur, qui floribus ſub iugum miſſis modico innocentique preſſu euagandi coërceant libertatem. Hoc artificio è myrto floribusque alterna tabulata vſque in ſummum diſpoſita ſuperpoſitis myrti ramuſculis conteguntur. Operculum denique, minuto nonnullo foramine ſalubrem auram tranſmiſſurum, imponitur. Non placent myrti loco à nonnullis adhiberi ſolita braſſicæ folia: quia paucos intra dies mucida & olida ſuum inclufos in flores vitium virusque tranſfundunt. Paulò alij operoſiùs flores in faſciculos, ima ſummaque parte prorſus æquatos, componunt: caules in capulum coactos, & arborum muſco inuolutos colligant: binos deinde ternosue faſciculos, alterno (vri iam diximus) ordine collocant, infixiſque in tranſuerſum viminibus modicè interſtringunt: ſimplici multipliciue ſerie diſponunt: interuacantes lacunas muſco explent: eundem etiam, ſeu myrtum ſuperinducunt; & capſulam bene operculant. Franciſcus Caſtellus Mantuanus, flo-

rea in re vir exercitatissimus, ita flores peregrinari docet. Fagineis asseribus modicè crassissimam, prout usus postulat, latam & oblongam, altero angustiore latere operculandam, compingi iubet: illud etiam præcipit, ut è quatuor, qui porriguntur in longitudinem, assibus aduersi duo vel medio utrinque intercurrente scetili sulco, vel binis affixis ligneis regulis canaliculati alium insertum ambulatorium asserem, singulari multipliciue grandiore foramine, immittendis floribus idoneo, peruium excipiant. Post hoc flores nondum planè maturos vel pridie, vel exiguo antè, quàm mittantur, in vnum pluresue fasciculos colligit; &, si expedire videatur, aliquandiu habet in aqua, ut humidum bibulis caulibus alimentum trahant. Fasciculi cuiusque capulum plurimo acidorum fructuum circumdato duriusculo folio præmunit, ne lini artior nexus penetret atque infecet caules. Eundem capulum pro capsulæ latitudine æqualiter attondet. Ipsos denique fasciculos in foramina sic inserit, ut alterius fasciculi flores capulo alterius è regione respondeant; ne inter se contingant, neque mutuò allidantur. Operculum tandem clauulis configit, mandatque tabellario, ut ipsam capsulam ex ephippio suspendat in longum; eandemque stantem peruchat, non iacentem.

Sic

Sic ille flores inconcuſſos atque incolumes hibernis potiſſimùm menſibus, quò fuerint deſtinati, tranſmittit.



*Florum siccitas viuax, & verisimile
mendacium.*

CAPVT II.

ET hoc potest industria, vt floris, nempe diurnæ caducæque rei aridum ipsum cadauer, atque adeo mendax vmbra diurnet ac perennet. Si velis igitur diurnos flosculos nullo negotio facere diurnos, resectosque à vitali radicis nexu ad simillimam viuorum faciem condire; nouam disce paratioremque vnguentis Aegyptiacis condituram, quam paucos ante annos in Germania ex parte vsurpatam ita perficies. In labrum fictile cupreumque, siue in alueum ligneum cribratæ arenæ tantum conijcies, quantum ad vasis dimidium perueniat: deinde aquam illimem & liquidam vsque ad eius fauces infundes, & lignea rudicula peragitabis miscebisque, vt, siquid inest fimi pinguiorisque terræ, eluatur: cum arena siderit, è decliui vase obturbatam aquam effundes: sic toties arenam lauabis, donec aqua limpida, & pellucida superemineat. Tum emundatam elutamque arenam in sole tandiu patieris esse, dum, quisquis ex aqua remansit humor, assicetur. Cum hoc modo emundaueris, suum cuique flori vas longitudine ac latitudine congruenti.

Florum conseruatio ex arena.

1o. Rodolphi Camerar. Syl. leges Memorabil. medic. & mirabil. nat. arcam. centur. 9. part. 95.

Ec præ-

præparabis vel ex argilla, vel certè è ferri stanneo
 tectorio dealbati prætenui lentaque lamina. Flo-
 res deinde leges absoluta maturaque formositate
 præstantes, humore nullo perfusos, prolaxis, vt
 voles, caulibus manubriatos: eosque altera manu
 summatim ac leuiter prehenfos suspensosque in
 vasa ita demittes, vt infra eorum oras binos ternos-
 ue digitos descendant, vtque ipsi nulla ex parte vasa
 contingant: manu verò altera paulatim arenam in-
 geres eareus, quoad totos caules obrexeris: tum
 ipsos flores aptè compositos, modiceque diductos
 leni arenæ iniectu cautè adobrues. Vnam præte-
 rea tulipa exigit operam, vt, quod è medio ex-
 tuberat triangulare caput, præcidatur: sic enim
 floris folia scapo pertinaciùs hærebunt. Ita opple-
 ta vasa sub insolata porticu per vnum alterumue
 mensem habebis: floresque tandem eximes viridi
 siccitate recentibus non absimiles, vno. tamen
 odorato halitu, suauique anima destitutos: qui-
 bus ad arbitrium solutis connexisque alieno etiam
 tempore perfrueris. Breuior alia florum conditu-
 ra. In aquam è salibus acerrimam, quam chry-
 sulcam vocant, intingitur flos, adeoque innoxius
 & vegetus conseruatur, vt, si prior inaneret mol-
 lities, recentissimus videri posset. Iam verò vt li-
 brorum monumentis citra scriptionis laborem flo-
 res ipsos æternes, Adrianum Spigelium, hiemales
 hortos, siue stirpibus agglutinatis quouis tempore
 ver-

12. Camerar.
 ib. d.

Conglutina-
 tio.
 Usage. in ven
 herbaria. l. 1.
 c. 58.

vernancia volumina instituentem audi: cuiusque generis vnum, aut pro colorum macularumque varietate plures flores vnà cum scapis, adnatoque foliorum aliquo, necnon maturo cum semine (si possit id colligi) succide: succisos pro naturali situ inter inoffensi laeueris paginas belle colloca. Emporeticam enim bibulamque chartam licet hunc in vsum plerique adhibeant, minus tamen vtilem ostendit experientia: quod exucti humoris herbaecci apprimè tenax interpositas plantas ægrè siccat, introductoque sæpe mucore corrumpit. Idonea papyro inclusas herbas in volumen insere compluribus paginis crassum & peramplum, quod videlicet chartæ easdem herbas includentis magnitudinem exæquet. Ponderus præterea superimponè, quo, tanquam torculari, paulatim vrgente innoceñter planta comprimatur. Quare premendis herbis validum & prægrauè pondus cauendum est, priusquam aquosior humor herbaceus magna ex parte exaruerit. Subinde autem plus ponderis adijciatur. Et primò quidem minimo, dum plantæ flavescant (quod æstiuo tempore triduo vel quattiduo contingere consuevit) deinde grauiorè, ad extremum grauiissimo pondere opus erit, vbi prope iam arentibus humoris per paulum superfuèrit. Illud etiam curiose curandum est, vt nullo non die easdem inspicias versèsq: & plicaturas, si quæ appareant, explices: floresque & folia ita con-

stituas, vt conspici vtrinque possint: chartam præterea mutes, vsque dum peraruerint. Arida iam plantæ paginis interiectæ sicco loco seruabuntur, donec aridarum numerus admodum excreuerit. Hac arte siccatas, atque interpressas papyro agglutinabis. Aptissimum gluten ita conficitur. Glutinis taurini pellucidi, quod Germanicum vocant, vncia sex asperrimi aceti vncijs maceratur noctem, vnā: tum igne lento liquatur: igni subductum nonnihil refrigerescere sinitur: statimque adijciuntur aloes hepaticæ drachma dimidia, & aromatici caryophylli in puluerem contriti scrupulus; ac probè miscentur. Ad hæc variæ magnitudinis penicilla pro magnitudine stirpium in promptu erunt. Plantam igitur agglutinandam super viliorem chartam expandes: glutine oblines: sublatam deinde candidæ paginæ impones: aliaque superposita papyro arctè atque æquabiliter affricando premes, ut ex toto adhærescat. Eandem præterea plantam binas inter paginas libro habebis inclusam, prægravi pondere superaddito, donec ipsa penitus assiccescat: id autem vnus aut alterius horæ spatio eueniet. Mox ad volumen faciendum inde auferes. Scire hîc licet non eundem agendi tenorem cum qualibet esse stirpe promiscuè seruandum. Quædam enim sunt, quæ propter succi aquosioris copiam difficulter arescunt, ex facili putrescunt, & folia dimittunt, aut

ea decolorant corrugantque: quo in genere semperuium ac telephium reponitur. Eiusmodi herbas, dum virent, glutino chartis adiungere satius est: prius tamen oportet geminis intersitas paginis in volumen indere, ac temperato pondusculi pressu leuiter calcare, quoad flaccidæ flexilesque fiant, & facile possint agglutinari. Sua singulis iam agglutinatæ herbis nomina præscribantur: utque singularum expedita inuentio sit, elementario literarum ordine digestæ apto volumine coagmententur. Id ego voluminis curiosè peruolutaui Palatinorum inter librorum erudita spolia, quibus tam felix, quàm pius, Boiorum Dux, & Romani Septemuir Imperij, Maximilianus à Pragensi atque Heidelbergensi victoria Vaticanam bibliothecam, nempe Sapientiæ Capitolium, locupletauit. Visuntur quoque Bononiæ nobilissima in bibliotheca, amplissimis magistratus ædibus adiuncta, lectissimis plantis glutino sociatis compacti libri complures, quos cum cæteris ingenij sui monumentis literatæ hæreditatis nomine sapientissimæ patriæ legauit vir optimis disciplinis ornatissimus Vlysses Aldourandus. Visuntur Neapoli, codices permulti consimiles in Ferdinandi Imperati herbarum peritissimi musæo, peregrina planeque admirabili rei naturalis & medicæ supellectile instructissimo. Ut arefactæ in paginis, quàm viuentes in hortis, plantæ diutius ac felicius vernare

Maximilianus
Boiori Dux,

Vlysses Aldourandus.
Ferdinandus
Imperator.

Vfus in
mensis.

Conditura

Aqua stillati-
tia.

Imitatio
multiplex.

videantur. Iuuat nonnullos in ipsa mensarum dapali melle ver istud arido flore immortale ad voluptatem geminandam aliena tempestate representare. Quare accommodatos potissimum flores in umbra siccant, flauam nempe genistam, puniceum balauitium, & cæruleum delphinium: vt inter palati gaudia oculis quoque pulcherrimi colores epulandi exhibeantur. Sed mortalium delicatæ auditati parum fuerat floreas delicias delibare aspectu, nisi etiam ore deuoraret. Igitur in sacchari vernaculo nectare conditi flores quàm facili, tam suauis mutatione demigrant in fructus, salubrem amaritudinem nimis fastidienti posteritati dulcissimè medicatos. Et sanè decuit, flores, dum viuerent, mortalibus liberaliter melleos, post interitum dulci sepulcro condi pariter, & condiri. Quin etiam ipse didicit ignis è floribus, quos exiccat & perurit, aquam fundere odorato spiritu vitalem: cumque stillatitijs florum lacrimis mansuram voluptatem eliquare. Iam verò, quòd ætate florea nobilium pictorum vernante artificio perbellè colores transeunt in flores, delectant alios colorata florum mendacia, quæ gratum oculis fucum faciunt, dum vel egregiè depictis vasculis manipulatim adiuncta multiplicium tabularum pensili spectaculo ædes perornant; vel punctim illito membranis colore singulatim elaborata hortensi volumine, siue horto plicatili continentur.

tur. Sed nullus magis conspicuis florum characteribus circumfertur inscriptus liber, quàm qui Eystadiensis horti pulcherrimas plantas ad naturalem magnitudinem affabrè incisas repræsentat. Ut illæ in chartis, hoc est in solo gloriæ, quàm in gleba Germaniæ, perenniores longè speciosius efflorescant. Quòd si quamvis pingendi rudis plantas, quæ tamen asperæ, spinolæ, præduræ non sint, velis ad viuum expingere atque adeo exprimere; sic facito. Asseri probè læuigato atramentum typographorum leuiter ac summaticim illinito eorundem puluillo manubriato. Super hunc asserem plantam aut virentem, aut arentem; aut integram, si par excepturæ paginæ sit, aut dispartitam, si maior, expandito. Deinde chartam superponito, valideque defricato, donec atramento planta satis imbuta sit. Ab assere sublatam ipsi paginæ, in qua effigies imprimenda est, imponito: aliaque superimposita papyro, manu linteoque confricato, vsque dum ad imaginem imprimendam exprimendamque satis esse videatur. Sed coloribus viuos flores mentiri vulgare miraculum est. Illud potiùs mirari decet, veris floribus florea mendacia eleganter colorari. Recens & lepidum inuentum est, ut se ipsi flores expingant. Coloris igitur florem imitaturi vice florem eiusdem coloris folium, pro picturæ inducendæ magnitudine figuraque vel integrum.

Eystadiensis
hortus.

Adrian. Spigel.
ibid. c. 57.

Cassianus à
Puteo.

vel dissectum, Arabico gumini expingendæ tabellæ seu pagellæ agglutinatur. Eminentia, vmbraque, atque adeo reliqua picturæ parerga colorum artificioso ductu tam bellè adiunguntur: vt non facile arbitreris, vtrum ars, an potius natura debeat operi subscribere, Faciebat. Eiusmodi ego picturam bifirmi artificio formosam, & commoliti auri ductili nitore insuper collustratam vidi apud equitem Cassianum à Puteo, virum inter cætera ornamenta tum clarissimi generis, tum ditissimæ domus, tum lectissimæ bibliothecæ, tum locupletissimi musæi, tum cultissimi animi, singulari quadam ad omnes homines demerendos benefica suauitate conditum. Vt minimè mirum sit, nobilissimi viri suauissimam virtutem Barberinis Apibus esse charissimam, quibus cordi est quicquid mel sapit. Ipsi, meus labor, flores hortenses regnatricum Apum mellificam beneuolentiam eidem conciliatrici acceptam referunt comitati, quæ meis floribus potuit efficaci commendatione suæ illecebram suauitatis afflare. Eiusdem non dissimulanda silentio est prolixa liberalitas: vt in florifero cultu arcana atque in primis admiranda experimenta mecum communicata maluerit prodesse palàm ac delectare, quàm eruditionis suæ splendida latebra auarè occultari. Conuertit iam in se oculos plaususque nostros Belgicæ solertiæ in re florea naturam prouocans arti-

artificium: flores enim, quos indoli suæ amœnissimæ simillimos in hortis curiosè colit Belgarum natio cultissima, tam decora fraude concinnat è serico; vt putes, non ingeniosi hominis manu, sed solertissimi serici vermis naturali opificio contextos: vt idem habeat, vbi tandem in papilionem conuersus decenter insideat. Sericum igitur non intortum, sed flaccidum, pro flore foliove imitando varium, approbè pexum explicatumque, limpida gummi oblinitur, vt rigescat. Exinde ad commensum exprimendarum partium plures in partes conciditur. Quas crispari oportet, illæ prius humefactæ tepido calamistro vibrantur. Aptæ demum inter se felicissimo dolo coagmantur, serico villo floream lanuginem Americani potissimùm floris ac tulipæ simulante.

*Arcana florum cultura.**CAPVT III.*

INertem esse artem censeo, aut certè victricis palmæ iactura minùs laudabilem, quæ naturam sic æmuletur, vt pari gradu grassari ad laudem, non autem præuertere contendat. Quamobrem florum est, quæ hominum ore frequenter effunditur, iustissima querela, cultorum scilicet plerosque nouis quotidie floribus comparandis inuigi-

Arcana flo-
rum cultura
miraculorum
ferax.

Andræ Ca-
pranicæ hor-
tensis dispu-
tatio.

uigilare, in ijs verò, quos comparauerint, ingenioſo artificio perficiendis conuiuere; hoc eſt in vulgari cultura ſatis ſolicitos, in præſtantiffima eſſe penitus incurioſos. Et ſanè, ſi pulcherrimum, in hoc ſtudium incumberemus, florea miracula, quæ magno foris impendio conquirimus, paratio-
ra domi ac præſtantiora inueniremus. Quòd ſi cultrix induſtria à duriffimo arborum ingenio inſituios alienoſque fructus feliciter exigit: quidni eadem à mitiffima florum indole nouas oculorum nariumque delicias exoret? Libet igitur florei decoris mangonem agere, vt horteniſes ephebi decentioris formæ inſolito lenocinio in admiracionem amoremque ſui vel ipſam criticorum effaſcinent ſeueritatem. Libet ſupra naturæ vernantis morem artiſcioſa miracula audere: ne voluptariæ culturæ pars iucundiſſima deſideretur. Tempeſtiuas commendabili audaciæ ſuppetias fert, quæ chymicam ſapientiam ab eruditis latibulis horteniſem educit in lucem, Andræ Capranicæ cum genere, tum eruditione nobiliſſimi, planeque Romani viri academico in conſeſſu cum plauſu audita vox. Cum tria ſint, inquit ille, naturalis commiſtioniſ elementa, nempe Mercurius, ſiue glutinoſus terræ humor, quem Chymici paſſiuum dicunt; ſal, ſiue ſemen actuoſum, naturamque conſtituens; ſulphur denique, hoc eſt ſulphurea quædam vis præparans atque coniungens: imitatrix natu-

re solertia in hortis ingeniosa miracula triplici pariter, eoque parabili præsidio efficiet. Nam interfectarum pecudum sanguine Mercurium supplente, ac Mercurialem terræ succum minùs validum adiuuante florum corpuscula mirum in modum amplificabit; hircino tamen, utpote nimia siccitate inepto, abstinabit: cineribus, tanquam fecundo salacique sale, cum ipso sanguine commistis numerosos partus excludet: fimo tandem sulphur æmulante cum celeriter maturabit, tum variè colorabit. Verùm, ut à minutioribus inijs maior existat admiratio & voluptas, prædictorum medicaminum vires, siue quintas (ut vocant) essentias, aqua vitis præmacerante atque exugente extractas, ac distillarij feruida opera in angustum contractas, adeoque vehementiores adhibere præstiterit. Attentissimè tamen custodire oportet, ne perurentibus hisce medicaminibus radices ipsæ contingantur; sed ut interiecta modica humo innocenter ad partum incalescant. Cum autem pro caloris omnia temperantis gradata temperie ipsorum portio & mensura medicamentorum adhibenda sit; dimetiendo lataminis potissimum calori perutilis fuerit productissimo collo, & ocluso penitus osculo ampulla, quæ variatim calido contactu inclusam aquam gradatim ascendentem descendentemque demonstrat. Sic ille. Sic autem testes oculati complures: In Hetruria

Consilio mi-

12.

op-

oppido celebri, cui vernaculum nomen Aquapendens, ingenioſus hortuli cultor, aurifex, vt in auro, ſic in agro ſplendidus faber, iucundiſſimum illud prodigium arcanis elementis conſtat, vt in anguſtiſſimam glebam, calice modico, aut eiſdem amplitudinis fictili vaſculo, aut etiam cochleæ teſta incluſam depactus arboris frugiferæ ſurculus terna minimum vel quaterna iuſtæ magnitudinis, & natiui ſaporis poma inducat, ac decennium circiter duret: quod agreſte miraculum (niſi fallit fama) ad floriferos ſurculos facilè videtur poſſe transferri. Sic præterea in hortenſi re multum callentes alij: Vt plantæ lætiores proſiliant ac vernent; ſui generis cineribus terræ permixtis, aut certè columbino ſimocum aqua in ſole tepeſacta pabulandæ ſunt. Quamquam poſterius hoc pabulum bulbosæ tuberoliſque radicibus, vitio & corruptioni opportunis, periculose apponitur. Sic demum ego: Quoniam artis huius mangonicæ atque ornatricis arcana medicamenta & adhuc multa excogitata ſunt, & plura in poſterum excogitari poſſunt; non eſt mihi propoſitum rem infinitam æquare velle dicendo, ſed aliqua præmonſtrare, tum vt cupidis facem præferam, tum vt deſides ad curam pulcherriſſimam incendam. In floribus hæc amamus amœna prodigia, tempeſtiuitatis vices arbitrarias, coloris nitelam nouam, odoris grauitatem emendatam aut inſolitam ſuauiſſimam conciliatam, & multum.

Lætificandi
plantas ratio
duplex.

In floribus
admiranda.

tiformem formæ varietatem. Quadripartitæ hu-
iuscæ artis secretiora præcepta, scorum & capita-
lî tradenda, iam accipe.

Arbitraria florum tempestiuitas.

CAPVT IV.

QUod summa in animis virtus, hoc imita-
trix in hortis cultura perficit, vt sicut vir,
sic flos omnium horarum sit; siue vt,
modò anticipata, modò dilata, modò continuata
cuiuslibet floris tempestiuitate, vere arbitrario
perfruamur. Igitur si rosam exempli causa (quod Flores pro-
enim vni conuenit flori, transferri commodè ad perati.
plures potest) vernare temporius voles: properato
circa extremum Octobrem latu, intra fictile solo
succreto, & fimi admistione tenero humectoque
inhumabis: calida bis quotidie rigabis, & foue-
bis: ventosis, nimiumque pluuijs diebus intra
tectum subduces: pernoctare sub dio non permit-
tes: vbi gelicidia hibernique imbres desierint, ac
diei apricitas inuitarit, vitalem solis in lucem pro-
feres: vbi verni teporis prima illecebra germinum
primitias euocarit, calidiorem affundes aquam.
Ita fiet, vt veris florum nouissima rosa prior efflo-
rescat. Vnum imminere periculum monuit ex-
perientia, ne, violenter præfstinato factu, mater
effocta præmoriatur. Tanti tamen fecere culturam
istam

Nat. hist. l. 21.
c. 4.
Apud Constant.
Papo. de agri-
cult. l. 11. c. 19
De re rust. Fe-
bruar. sine l. 3.
tit. 21.

istam veteres magistri, vt eam litteris commen-
datam posteritati præmonstrarint. Effossa igitur
circa radicem (vt Plinius docet) pedali (vt Di-
scymus & Palladius) bipalmi scrobe ; & matu-
rina vespertinaque calida irrigatione quotidie
iterata serotinus rosæ flos sollicitabitur. Si præte-
rea cupis Tiberij præmaturum augustum cucume-
rarium nobili ; mobilique ; atque adeo ambulato-
rio roseto æmulari : confecta bruma stercoreatam
terram cophinis aut fictilibus inditam rosarum
radicibus obferes, modicumque præbebis humo-
rem. Eadem obsita vasa tepidis & insolatis diebus
iuxta ædificium promouebis in solem, vt ab affla-
tu noxio protegantur : frigidis autem, & procello-
sis, necnon in vesperam inclinatis sub rectum re-
feres : quin etiam per serena frigora intra specula-
rium munimenta recipies, quæ salubres radios ad-
mittant, gelidam vredinem excludant. Vbi ab
æquinotio verno planè annus intepuit, totos cō-
phinos aut fictilia summis tenus oris infodies : fon-
tanam aquam sitientibus irrorabis. Quod si rese-
ctam è rosæ frutice gemmam hiulco amygdalæ
cortici vsitata inferet emplastratio ; præfloreus ar-
bor floreas gemmas, rosas, verno per hiemem fœ-
nore repræsentabit. Si more maiorum Quiritum
placet, natalicio anni mense Ianuario iniiri à rosis
consularem ac regium inter flores purpuræ magi-
stratum ; Democritum audi docentem, rosarum
stir-

Apud eund.
Constant. ibid.

stirpes æstiuis mensibus bis esse per dies singulos irrigandas. Cæterum vernos æstiuosque flores hieme citabunt quæ calida sunt, & pingua, nec non tenuia, velut detractis folliculis vinacea, exemptis officulis oliuarum recrementa, & fimus, præsertim equinus, identidem suffectus. Ita si sub Octobris calendas caryophyllum, violam, ac generis huiusce plantas, detruncaris subinde germinibus mutilas, cum radicibus, in harum aliqua efficacium sordium obrues: è vitali sepulcro inter niualem brumæ squalorem viuidus ac nitidus florum partus exister. Quanquam exhaustis nimia fecunditate viribus floridæ cum fœtibus matres frequenter intereunt. Denique quodcunque semen, inditum scillæ fuerit, acerrimo bulbi calore feracitatem proritante, celerius germinabit. Vt autem seram inter niues colligas rosam, ipsos frutices, cum primùm egerminant, in aliud solum modò ne incommodum, transfer: nam primam illi confirmandis viribus, vltimam fundendis floribus operam dabunt. Vt suis cum pomis serotino rosarum vere bis fertilem se malus demiretur; roseis eam oculis callidus insitor Florentini monitu in-oculet. Sed leuiore opera rosam præsertim & caryophyllum seros cogit ad flores vulgaris industria, dum primæ germina in calyculos extuberantia digitis decutit: plantaria ipsa æstiuum producit in solem: crebra etiam rigatione fouet, ne perarescant.

Card. de Va-
mss. l. 13. c. 66

Retardari.
Io. Bapt. Porta
Villa l. 9. c. 5.
Mag. nat. l. 3. c.
10.

Apud eund. cō-
siant. ibid.
Porta Mag. nat.
ibid.

Re-

Continuati.
Apud Conſtāt.
Pag. l. 11. c. 21

Retardatus enim collectusque genitalis humor nouis identidem cauliculis floribulque, alieno tempore iucundioribus, vehementius atque vberius eluxuriabitur. At verò (vt author eſt Anatolius) flores cum cæteri, tum lilia nominatim varijs ſubinde temporibus exiſtent; ſi radicum alias in duodenos, in octonos alias, alias demum in quaternos digitos deponamus. Eadem quoque lilia commodè perennabunt; ſi, dum adhuc occluſo foliorum oſculo ſilent, ſuis innixa ſcapis colligamus, atque in recentia fictilia non picata impoſito diligenter operculo recondamus. Cum enim interiecto tempore è tenebris promentur in ſolem, optatam quaſi lucem ſalutatura, pulcherrimè oſcitabunt.

Apud eund. l.
11. c. 19.

Non inuidebunt lilijs roſæ vegetam perennitatem; ſi Didymum audiamus, qui menſibus eas omnibus ſub cælo clementiore promittit; dum tamen ſingulis pangantur, ſtercorentur, irrigentur.

cap. 17.

Non abſimilis cultura toto floridas anno (vt præmonſtraui) anemonas feret. Sed breuiſſimi ſoſculi violenter diuturna voluptas carè, nempe radicum vel exitio vel macie ſtabit. Roſam, quæ, licet materno hæreat frutici, cum ſole naſcitur occiditque, varijs, quamuis reciſam, vario artificio annuam faciunt. Didymus in amurcam uſque eò mergit, vt liquor ſupernatet. Alij adhuc herbeſcentem hordei ſegetem cum radicibus euulſam, in labrum fictile non picatum demittunt, roſeoſ-

Apud eund.
conſt. aut. ibid.

que

que calyces superingestos eadem herba protegent
ac tuentur. Alij virens hordeum pavito loco sub-
sternunt, rosasque superinijciunt. Sunt, qui turgen-
tes alabastros in viridis hærentisque solo arundinis
cauum internodiũ diffisso nodo concludant: &
papyro fissuram leniter obstringant, vt sit, quã theca
arundinea interspiret: vbi verò libitum fuerit, ex ea-
dem recisa arundine roseum partum excludant, &
aqua egelida foueant, vt dehiscat. Sunt præterea,
qui succisos, linoque circumligatos calyces, ipso re-
cisionis vulnere liquida pice illito, immittant in
arundinem, eamque, ore cera obstructo, aut po-
tius bene picato, sub dio in decliui solo defodiant,
ne penetrans pluvia corrumpat. Tu verò sic præ-
terea rosarum consulito diuturnitati. Flores se-
mihulcos sub vesperam ferro præcidito: manu ne-
tangito: serena nocte sub dio habeto: mane in ficti-
le, cremati redactique in puluerem plumbi atque
argillæ intrita perlitum, & incoctile, atque adeo
madori nimio imperuium, condito: idem obtura-
to: sicca in arena obruito. Aut certè siccatas rosas,
rosa stillatitia madefacito: tum in fictili labello die-
bus quinque defossas conseruato. Proderit quo-
que rosas in ollam rudem abdere, eandemque be-
ne operculatam sub cælo inhumare. Proderit vas
querneum cum floribus cæteris, tum præcipuè rosis,
quæ nondum oscitent, opplere: probè operculare
& picare, ne qua rima humori pateat: putealibus

Apud eund.
ibid.
Pollad. M. 10.
fine de re rust.
l. 6. tit. 17.

Card. de Va-
ries. l. 13. c. 66.

Id. ibid.

deinde, aut cisterninis, aut potiùs profluentibus aquis, vtpote minùs vitiantibus, immergere, atque ita per diu incolumes flores asseruare: vbi verò eductos dehiscere volueris, malo pediculum infigere, vel ipsos aceto perfundere, solique ostendere. Vegetas denique ac recentes rosas hoc modo custodies. Vini & salis quantum sat est in ollam, infundes: eandem rosis nondum hiantibus implebis: operculo adoperies: in cella repones: cum volles, ollares rosas eximes: in solis aut fornacis tempore expones, vt diducantur. Illæ autem perinde formosæ recentisque videbuntur, quasi tunc hortensis terra, non coctilis argilla peperisset. Atque sic demum inter ollas versari decorum est. Amaranthus, inter caducos flores immortale miraculum, aqua madefactus reuiuiscit, & hiberna ferta contexit. Recisus etiã, & lento furni vapore siccatus coronarios in vsus reponitur. Vsq; adeo viuax est, vt & nominis & pulchritudinis immortalitatem demersus ambustusque tueatur. Verùm vt huius disciplinæ capita ipsa summatim ac distinctè complectamur: aliena flores tempestate vernare cogemus aut germinis retentione, aut loci calore, aut alimenti pinguedine, congruentique temperie. Cita enim retentio tempestiuam fecunditatem seros reseruat & laxat in partus: penetrabilis calor meatus aperit, ac præcociem elicit amœnitatem: alibilis pinguedo, atque temperies ad veris

Plin. l. 21. c. 8.
Ro. Ruell. de
Nat. stirp. l.
2. c. 20.

Arbitrarie
tempestiui-
tatis ratio
multiplex.
Gordon, ibid.

Vitis; intempestiui floream luxuriam vires impetumque sufficiunt. Ea igitur est hortensis artis potentia, ut mortalium, vitatatis delicias fastidientium, delicatæ voluptati consulens constanti lege naturæ constitutas temporum vices, annualesque tempestates libero vagoque vere permutet. Placet iam decoram voluptatem hanc iucundiores facere condimento salis factitij, statim eliciendis alieno etiam tempore rosis præsentissimi, quem ego salem è Petri Ioannis Fabri, Monpelienſis medici, Palladio, & Myrothecio Spagirico in Floræ reæ beneficium deprompsi. Principiò compluribus rosarum fruticibus crematis & cineractis, residuus cinis ad quindecim aut viginti libras colligetur. Ex eodem cinere; cum roris aut imbris cælesti aqua inferuefacto, lixiuium fiet. Tum è lana coacta tæniolæ, altera quidem parte in eiusdem lixiuij vas demissæ, altera verò in vas alterum propendentes, ductum ad se lixiuij liquorem ad liquidum percolabunt: aut certè laneus lineusue pannus percolantem consutus in saccum, siue emporctica & bibula charta in cucullum conuoluta, velut colo transmissum, defæcabit. Ut autem totus vnica opera sal eliciatur, in singulas cineris libras denæ vel duodenæ humoris eiusdem adijcientur. Ad hæc in aheni lixiuium sinetur exhalare vsque adeo, donec sal incipiat apparere: qui cum lixiuio traijcietur in vas vitreum, seu terrenum, si-

Sal Chymic
arbitrarijs
floribus eli-
ciendis:

Petr. Ioan. Fa-
ber. Pallad. c.
3. Myroth. l.
2. 4. 3.

guli tectorio laeuigatum; ne siccescens in æneo sal
 vitioso metalli odore imbuatur. Transfusus len-
 to igne, aut æstatis igneo in sole bene siccabitur.
 Siccatum salern oportet iterum in fictili fufuræ ca-
 tino temperato vapore ad instar calcis excoquere,
 ac sedulò custodire, ne liquefcat: quia vis eius om-
 nis euanesceret. Debet igitur validè incandesce-
 re: tum aut rotrato aut pluuiò humore macerari,
 & supradictò more percolari, vt liquidior fiat: dein-
 de vel in vnum vitreum vas, vel in plura defundi; at-
 que in sole, seu lenta pruna ficcari. Idque septies aut
 octies opus iterabitur, quoad ipse sal candidissi-
 mus & limpidissimus reddatur. Exinde rostrato è
 distillarij vase, vitreo tamen, non autem plumbeo,
 quod ab Arabico fonte deriuata voce Alembi-
 cum appellant, stillata rosa in tabernaculum liquandus est,
 tum lentè siccandus: denique igneo rosarum vapo-
 re stillatio, qui vulgò spiritus dicitur, resoluend-
 us. Hanc verò quintam è rosis naturam sic ex-
 primes. Rosas complures in vitreum ænophorum
 per amplum communi aqua rosacea semiplenum,
 conijcies: summum vasis os operculo itidem vi-
 treo bene obstrues: in fornaculam condies: omnia
 lento cinerum tepore quinque vel sex horas in-
 feruefacies: extillantem humorem subdito exci-
 pulo colliges: eundemque in vas primum refundes,
 cum illud refrixerit. Rosarum præterea tum flo-
 rem, tum liquorem eodem ex ænophoro educes,

om-

omnemque vehementi pressura succum elicies :
eum in idem vas defundes , recentisque rosas adij-
cias : vt simul omnia quinquies aut sexies infer-
ueant , facies : tum prædictum succum eodem va-
se probè operculato conclusum quinquaginta aut
sexaginta dies fermentescere patieris in cella vina-
ria . Lento denique cinerum calore igneus atque
æthereus vapor , siue spiritus ardentis aquæ modo
stillarim elicietur odoratissimus , & veluti liquato
in aquam igne vim habens adurendi . Hoc arden-
tissimo liquore sal supradictus resoluetur ac dista-
bescet . Vt igitur extemporalis rosa quiduis anni
ad arbitrium existat : eius potentissimi medica-
minis aliquantum ipsis fruticis radicibus affunde-
tur : persusa pars communi cinere cum terra com-
misto coaggeturabitur . Neque verò adeo medicatus
liquor vnus euocandis rosas , sed multis quoque
cum totius corporis , tum præcipuè capitis morbis
depellendis opportunus est , si sorbeatur cochlearis
mensura . Et adhuc quidem lufit in rosa : maio-
re nunc miraculo , quos enecat , ad vitam reuocat
flores , quæ Naturæ à secretis est , innocens & inge-
nua Magia . Etenim quancunque virentem ver-
nantemque stirpem seminis fertilem radicitus re-
uellit : concrematam in cinerem , nitrosumque
salem peritè redigit . Eiusdem præterea plantæ se-
mina bono in solo noua luna deponit : mox emis-
sis primulis germinibus ad partum iam incitata .

extrahit: cum prædicto ſale conterit & commiſcet; atque ita macerat & putrefacit. In ſalis huius vnciam duas adijcit vncias quàm mundiſſimæ virginisq; terræ: abſtinet autem à ſtercoroſa, ſiue animantium purgamentis olida ſordidaque. Humum, quæ propter fontes nonnunquam lutoſa & pinguis inuenitur, hunc ad vſum aptiſſimam deligit & adhibet; priùs tamen bene repurgat. Vtranque deinde rem coniicit in vaſ terrenum, haud quaquam læui tectorio incruſtatum, atque in hortis expoſitum eſſe patitur ſub dio: ne tamen in illud impluat, cauet. Cremata iam & humata, planta triduo reuiuifcit ac regerminat vegetior, excelſior, atque formoſior. Tunc eadem ars, rerum admirandarum ſolers, pro germinis incremento ipſum fictile patentiori loco paulatim ſubducit: in ſubdiali denique ac perſtabili fenestra, locat. Eidem fictili opertum foculum ſupponit, indita ardente lucerna vaporantem; idemque operculo claudit, tuendæ ſtirpi idoneo, ſumma parte perforato. Exinde nouendialem flammam minutatim & gradatim exauget. Nonum circiter diem, cum operculi ſummo è foramine, flos incipit exiſtere, teſtam ita operculatam (operculum enim remouere nefas eſt) in frigidam humidamque cellam ſubterraneam recondit. Ibi quatruidui ſpatio, ſale iam in tabem reſoluto, flos euaneſcit, & planta ſubſidens recedit. Hic

ex-

extrema solertia prædictam cum sale confusam, terram è fictili vitreum in vas peramplum trajicit: idemque sigillo Hermetis obsignatum frigido humidoque loco asseruat. Vbi nouo miroque spectaculo cum oculos, tum animos pascere collibuerit, in solem profert: si sol languidè calefaciat, subditi cineris addito tepore sollicitat. Ecce autem inter vitreas angustias ingens miraculorum congeries: excitante calore paulatim assurgens, modò sopita, planta profilit: florens Phœnix intra horæ dimidium suis è cineribus renascitur: è terræ tumulo vernam redux ad vitam flos mortalibus ad immortalitatem surrecturis proludit: in aprico sine opaco floris vmbra porrigitur: fatoque sale non decantata sterilitas, sed miræ solo salacitas ad extemporalem partum conciliatur. Quis iam insulsam esse insipientemque florum culturam putet, cui subest arcana sapientiæ sal? Nec minùs, quàm reparabilis vita fuerit, in arbitrario flore admirabilis est alterna mors. Subducto enim calore vmbratilis flos in suos cineres relabitur, suumque chaos sensim repetit euanesceus. Decet nimirum ad voluptatis arbitrium renascentem inusitati veris, vitro inclusi, formositatem sine cadaueris deformitate denasci. Sed ne quis à me bellam, & iocoso circulatorum salillo conditam fabellam ad præstigias & offuscias animis offundendas enarrari existimet, testes

*Hermet. diſci-
pl. de ſeſc. c. 23.*

habeo ſalis huius efficaciffimi cum graues Philoſophos Chymicoſque complures, tum in primis Iosephum Quercetanus; qui licet arcanum experimenti pulcherrimi artificium non euulgent, id eſſe tamen exploratiſſimum affirmant. Et Quercetanus quidem ingenuè faterur, nullis precibus aut promiſſis effici à ſe potuiſſe, vt Polonus medicus experientiſſimus opertam ſpectaculi huius artem aperiret. Is autem ſtirpem, quanlibet ſcitè ac philoſophicè ſoluebat in cinerem: apparatusque ampliùs triginta ſtirpium cineres ſuis quenque in vaſculis, Hermetis ſigillo conſignatis, & peculiari ſtirpis cuiuſque nota inſignitis aſſeruabat; vt, cum popoſciſſet vſus, lucernæ igniculo cineribus admoto repentinam eliceret viriditatem. Neque verò, vt res ipſa, ita cauſa compertu difficilis eſt. Etenim, ſi chymica eam ſcruteris in latebra, manet occultum quoddam ſtirpium in ſale ſemen, quod illico exit in opus viuidi caloris acceſſu. Sin autem eandem cauſam Lycei mauiſ in luce cognoſcere; præparantes qualitates, quæ vel ad excitandam, vel ad regenerandam vim ſeminalem, in ſeminibus vigentem, animatque corporis membratim effectricem, requiruntur, in huiuſcemodi ſalibus partim remanent, partim calore aduentitio reparantur: ipſa verò ad corpus ex diſſimilibus rebus temperandum initia ſue elementa ſaris commiſcentur. Nam in cineribus

ribus salibusque latens ignis & aer cum additæ humidæ materiæ aqua terraque efficaciter confunduntur. Quare facili celerique negotio existere potest vulgari satù editæ gemella quidē planta, sed tamen propter imperfectiorem gignendi facultatem, tenuitatemque materiæ minus vitalis, & recessu caloris euanida. Sic æstiuæ pluuiæ subitarij filij, ranunculi, alijque abortiui vermiculi, quibus putris materia mater est, quàm facilè nascuntur, tam celeriter occidunt. Ex earundem qualitatū fœcunda permixtione pullulauit geminum illud oculis iucundum prodigium, in vrticæ videlicet combustæ congelato lixiuio concreta eiusdem vrticæ imago, & in aqua stillatitia repentè nata & innatans planta: illa Quercetano, hæc alio scriptore celebrata. Illud hîc ad extremum habeo subijcere, chymicum istud in re florea spectaculum, quod sibi spectatum permulti contestantur, mihi nec experimento, nec aspectu esse comperit: sed, si naturæ viribus exhiberi possit, ob eam, quam exposui, causam non improbabile videri. Quòd si quis obstinatè perneget, nullius fidem extorqueo.

CAPVT V.

Rariorum co-
lorum indu-
ctio.

TRiplex vel vniuerſis vel plerisque floribus inſolens color in hortis magis expetitur , quàm inueniatur, niger videlicet, qui lugubri facie arrideat: viridis, qui, dum floret, herbeſcat, oculosque paſcat: cyaneus, qui cælum coloret in terris. Squamoſus alni fructus in ipſamet vltro inarefactus arbore , ac tenuiſſimam in farinam contritus nigrum, rutæ ſuccus viridem, cyani flos in frumentarijs agris paſſim obuius, itidem arefactus, atque in puluiſculum reſolutus cyaneum ſiue cæleſtem colorem dabit. Vſus autem hic eſto. Fimum ouillum, utpote humida leuitate miſturæ alibili aptiorem , ſumito: ex aceto bene ſubigito ac depſito ; eo enim craſſiuſculum ouis excrementum idoneam ad commiſſionem extenuatur: exiguum quoque ſalis adijcito ; nam eodem & aceti aſtrictoria vis emendatur , & ad radices acriùs peruadendas via medicamento aperitur . Ad hæc vel expreſſi è ruta ſucci , vel prædicti pollinis alterutrius tertiam circiter præ ſimo partem cum ea maſſa confundito & permiſceto : ſcrobiculum bono in ſolo, quod intra teſtam extraue ſit, excauato: eam maſſam in eundem demittito: in ipſam medicatam intritam colorandæ plantæ radicem deſigito: deinde irrigato, curato, colito, ut mos eſt. Illud autem ſedulo curato,

rato, vt albi floris radículas hoc artificio deligas medicandas. Ita, propter exemplum, candidi caryophylli furculus efficaci fimo infossus peregrino facile colore vernabit. Candor enim, docilis nimirum color, cum perspicuus & pellucidus sit, colorati alimenti particulas radicitus haustas, totoque probè corpore permistas expicto in flore, tanquam ingenue in ore, manifestat. Quid, si multicolor iste fucus in vna eademque prædicti massa lætaminis confundatur? Equidem cum Ioanne Fabro, Lyncei iudicij viro, à quo totum id florei medicaminis præscriptum accepi, fieri opinor posse, vt natura, quæ suo pte ingenio frequenter ludit in floribus versicolore pictura, colludentis artis inuitamento lasciuiat audacior. Quin etiam probabili coniectura & ratione idem Faber affirmat, florum villos ac stamina Florum pars tincturæ aptissima. &, qualia videmus in croco, capillamenta, quia floræ concretionis purior succus, & veluti discolor sanguis sunt, efficacissima pollere tinctura, vt flosculis alijs, candidis tamen, multiplicem atque adeo amabilem fucum faciant. Neque verò illa in floribus pulcherrimè inficiendis experimento frequenti explorata præscriptio reticenda est, quæ sic præcipit. Solum pinguißimum deligito: id eodèque in sole siccato, dum prætenuem soluatur in puluerem: eo puluere testam rite oppleto: mediam candidi floris plantam aut furculum depangito: ne quid infusi humoris, aut instillati roris ea humus Colorans irrigatio. hau-

hauriat, nequid ipſe, præterquam colorati liquoris, affundas, caueto. Quare ipſum fictile nocturno plu- uioque cælo ſubducito, aprico tranquilloque die in ſolem efferto. Si regum æmulos purpurare placeat flores; Braſilicum lignum, cuius roſea ſanie offe- ctiores lanas imbuunt, minutatim in taleolas vel ſe- gmenta concidito, atque in aqua decoquito, donec ad tertias quartæſue coctura ſubſidat: eo purpureo decocto, cum iam deferbuerit, matutinus ac veſper- tinus pocillator bibulum ſolum inſuccato. Si candi- das hortorum gemmulas pretioſo raroque miracu- lo ſinaragdinam in viriditatem gemmaſcere dele- ctet: eius rhamni ſeu ſpinæ, quam Petrus Andreas Matthiolus Infectoriam appellat, vulgò Spinum cer- uinam dicimus, maturiſſimas baccas, modicè didu- ctas, in aqua incoquito, præſcriptaque ſolum forma irrigato. Sin autem floreum argentum in aureum florem chymica æmulatione flaueſcere laudabiliter auara cupido eſt: baccas eaſdem nondum ſatis ma- turas itidem apertas excoquito, flauoque terram ſuc- co ſaturato. Si denique diurnæ lucis candorem vul- tu præferentes floridulas terræ ſtellulas trifti nigritu- dine nocteſcere voluptas eſt: minorem gallam & chalcanthum in atramentum inferuefacito: eo ſi ra- dicem intingas, floris cacumen inſcribes. Aut me- miniſſe aut prædiſcere hîc debes, adeo naturam non exui vel expelli, quin ſubinde illa recurrat. Qua- re de ſua ſe remoueri ditione indignans, natiuus identi-

In Dioſcor. l. 1.
c. 102.

identidem reflorescet color; ut naturæ cum arte
super vnica planta concertatio voluptatem pariat
bicolorem. Quod si audere non pigeat, etiam
triforme leges ab vna stirpe miraculum. Nam si
discoloribus ex aquis alteram mane, vespere alte-
ram vtrique stirpis lateri sic affundas, ut quotidie
latus vnum distinctis temporum interuallis dupli-
cem fucum ebibat, colorumque vices alternet
irrigatio præpostera, matutina nunquam eiuf-
dem coloris aspergine in eandem partem sub ve-
speram refusa: & natio, & aduentitijs efflore-
scentibus coloribus iucundè prodigiosa planta,
trium colorum ore triplici ridebit. Audio rem
felici periculo comprobata, atque equidem
credo, quia physica ratio persuadet. Cum enim
singulæ diuerforum colorum irrigationes, utpote
non vniuersè, sed particulatim irroratæ, totam
simul plantam alere, atque adeo colorare non pos-
sint; multicolor alimentum non satis vbique com-
mistum multiformem prodit in florem. Huc acce-
dit, quod naturalis color, ab artificiosis non planè
victus, ex parte aliqua eminet, floremque tri-
plicat cum voluptate discrimen. Si candida lilia, Tinctura li-
liorum. roseo rubore tingere, hoc est si virginalem cando-
rem decenti pudore pingere volueris; monente
Anatolio, Caioque Plinio subscribente, florescen-
tes liliorum scapos mense Iulio colligito: denos, Apud Const.
Pezom. de Agr.
l. 11. c. 21.
Nat. hist. l. 24.
c. 5. duodenosue in fasciculum colligatos in fumo su-
spen-

spendito: fumidi temperatique vaporis efficien-
tia sparsim extuberantibus nodulis siue bulbosis;
scapos ipsos in sæce vini vel nigri uel Græci men-
se Martio macerato; donec tibi eisdem extrahenti
purpureo colore planè saturi appareant: deinde, in
scrobiculis assatim circumfusa sæce, serito: videbis-
que adeo multum esse à teneris consuescere; ut in
extremum germen transeat prima sominis tinctu-

Apud cūl. ibid.

Tuliparum

ra. Cæterum Florentini consilio lilia facîle varia-
timque expingemus, si citra vulnus intra liliacei
bulbi squamas cinnabarim, aliumue pro arbitrio
colorem infundamus. Tuliparum quoque flores
arbitraria pictura variabit, si biduo triduoue bul-
bi habeantur in aceto, donec tenerescant: deinde
eximantur, ut acetum nonnihil expiret: exinde
colores minimè acres edacesue innocentibus bul-
borum incisuris ex vino stillatitio inducantur: co-
lorati demum bulbi elapso mense inhumentur.

Rosarum.

Ibid. c. 29.

Ipsa, purpureum formæ compendium, rosa, si
Didymo magistro, cum primum dehiscens in fo-
lia cæpit euolui, sulphuris nidore suffumigetur,
exalbescet: siue quia sulphureus albor, igne exte-
nuante atque rarefaciente penetrabilis, tenues ro-
sæ meatus peruadit & inficit: siue quia iuxta deli-
catus, atque odoratus rosæ flos olidissimi suffi-
tus horrorem insolito pallore testatur: siue tan-
dem ne formoso colori nimum credas, qui fumo
leuissimo decoloratur. Idem rosæ flos peregrini-
nos

nos facillè induet colores; si, solertissimo viro Ioanne Baptista Porta suadente, iuxta radicem diffissum in caulem, itidemque fissos in ramulos aut æruginem, aut Indicum, aut crocum, aut cæruleum lapidem, aut alium quemlibet fucum tenuissimè comminutum largiter ingeras: si, plaga deinde bene circumligata, sinum adaggeres. Observabis tamen, ne, quæ plantas adurunt atque encant, coloratura venena, cuiusmodi habetur auripigmentum, applices. Quòd si cælestis pulchritudinis versicoloribus imitamentis flores in Irides aëria feliciores transformare placet: complura generis eiusdem, at non eiusdem coloris florea semina in ouillam caprinamue pilulam defixa, vel in gracilem arundinem inclusa, vel in lacinijs colligata serito. Corruptis enim vaginis & inuolucris, è seminibus varia permistione adulteratis discolor florum soboles existet, quæ non pluuiæ nubes lacrymis, sed gestientis naturæ risu expietam Iridem serena fronte præportabit. Iamuerò, vt peregrini colores pertinacissimè, ac tanquam iure hæreditario hæreant, è pomarijs ad floralia, callidam conciliatricem insititionem traducamus, cuius artificis dexteritate mansuetæ stirpes ignotis folijs, & non suis se floribus operiri demirentur. Atque vt in auream flauæ pulchritudinis hæreditatem genista insitiuam rosam & gelsiminum adoptet, primùm immittendas plantas, cum genita-

Discolor seminum permistio.
*Matthiæ. in
 Dioscor. l. 2. c. 153.
 Io. Bapt. Porta
 Mag. nat. l. 3. c. 5.*

Insititione aduentitij colores.

Porta, ibid. c. 15.

nitali terra translataſ ad geniſtam aſſeramus, quòd illæ materno meliùs, quàm nouercali, ſuſtinebuntur vbere, dùm inoleſcant: geniſtam deinde terebra, ſeu potiùs peracuto cultello, qui ſcobem minimè faciat, nec perurat, obliquè mediam perforemus; vt naturali contentione in ſublime feratur cum à ſtirpe ramus immiſſus, tum ab radice humor affuſus. Ad hæc roſæ vel gelfimini veluti traducem ramulum, quàm latè inferi & circundari trunco debet, ſummo leuiter cortice circunraſo ſpoliemus, vt is expeditè ac proximè adhæreſcat: tranſmiſſiſque binis terniſue gemmis, foramini aptemus: ſubacto etiam luto vulnus circunlinamus, & vinculo circunligemus: poſtremò inſitum ſurculum, dum ſuccreſcentis idem geniſtæ niſu ſuſtollitur, hoſpitali tenus frutice à matre recidamus, vt inoleſcente cortice inſitum coaleſcat, & coëat cicatrix: ſuperficiem verò fruticis ad ipſum uſque receptum ſurculum detruncemus, totus vt ſuccus aliò non euocatus vni potiſſimùm inſito ſeruiat. Ita cum geniſta, atque cum alijs quoque diuerſi coloris congruentibus plantis concorporantur, externæque matris vtero iterum concipiuntur pridem nata roſa & gelfiminum: vt hominem, quamuis adultum, ad nouam virtutis morumque faciem & alium & eundem renaſci poſſe, à ſtirpibus doceamur. At verò ſi candidum aut purpureum caryophyllum cæli
colo-

colore donare velis, à vulgarissimis illum plantis
sic impetrabis. Buglossum, aut cyanum, aut po-^{td. ibid.}
tiùs vetustum erraticum intubum, quem & cicho-
rium appellant, radice tenuis, quæ pollicarem su-
peret crassitudinem, recides: tum mediam radicem
consideratè modiceque diffindes, ne plus iusto fis-
sura descendat: ac floriferam sobolem à parente vul-
sam aptè immittes, vt rimam coagmentet: vimineo
demum nexu ictum vulnere insitium fœdus ob-
stringes: ac fauciam hospitam vt consanes & lætifi-
ces, circa terram circumiectam simum putrem ad-
aggerabis. Ita in pulcherrimo flore cælum colorari
posse pollicetur insitio erudita. Quanquam ego spe-
ctaculum hoc sæpius auribus, nunquam oculis vltur-
pauì. Illud eadem præterea fieri à se posse confidit,
vt in candidos flores color deriuetur aut purpureus;
si rubræ pastinacæ, quam sifer nonnulli vocant; aut
puniceus, si anchusæ præscripta ratione iungantur.
Iam verò si ex albo rubroque bicolorem expetis ^{td. ibid. c. 3.}
rosam, eam ingeniosus insitus, quem inoculationem
siue emplastrationem nominant, sic feliciter dabit.
In eo rosæ frutice, de quo inferere, atque oculum
gemmamue ad insitionem sumere voles, nouel-
lam, integram, & maximè nitidam quæres virgam:
in hac deinde oculum considerabis, qui bene ap-
pareat, quique solem spectet orientem, bonamque
floris indolem habeat: eum oculum modico in cor-
tice ita circumsignabis, vt is medius sit: acutoque

scalpello eundem circuncides, & cautè materiam delibrabis, ne oculum lædas; quem à materia resectum intercides medium. Eius postmodum fruticis, quem inferere voles, generosam ac nitidam virgam eliges, & eiusdem amplitudinis cortice gemmaque dimidiata materiem nudabis: in eam verò partem, quam nudasti, dimidiatam gemmam ex altero sumptam frutice aptabis ita, vt emplastrum delibratæ parti conueniat: duorumque oculorum, diuersarumque gemmarum inter se apta segmenta vnus oculus, atque indiuisa gemma videantur. Vbi sic feceris, circa gemmam libri plagam reuincies, dabisque operam, ne lædas: deinde commissuras & vincula bene subactò tenacique luto, quod imbre non dilabatur, collines: spatium tamen gemmæ relinques, vnde libera egerminet. Ne materiæ, quam inseueris, succus aliò dissipetur; sed vnum illibatus & indiuiduus insitum vt enutriet: superiores ramos, siqui sint, amputabis: tum subinde soboles detrahes, quæ à lateribus radicibusque subrepunt. Post vnum & vigesimum diem solui potest emplastrum, quia tunc solent sic applicata germina coaluisse. Quanquam vnus alteriusue mensis tutior fuerit mora. Sic rosam leges in vna stirpe à bisformi parente biclorem, siue bifrontem, Iani scilicet sororem. Idem bicolor oculorum oblectamentum à caryophyllorum plantis, alio tamen cultu, exorabis. Cum enim ip-

sæ,

ſæ, vt quæ oculis carent, inoculari nequeant; arte
 diffimili coalitæ ad florem hoc miraculum con-
 ſpirabunt. Igitur quæ candidi, quæ rubri caryo-
 phylli generosæ ſoboles radicisue in duas mediæ Is. Bapt. Porta
Villa l. 9. c. 12.
Mag. nat. l. 3. c. 3.
 partes diuiduntur, compoſitisque inuicem diui-
 dis corporibus, aptè coagmentantur in corpus
 vnum, quod ex diffimilibus tandem partibus
 compactum, diſcoloribus iure floribus capillabi-
 tur. Illud hîc ſuperest generatim vniuerſeque tra-
 dendum, flores omnes & ſeminum ſatu (ſicut Varietatis
colorum vul-
gares cauſæ.
 iam præmonui) variè colorari; quòd altrix terra,
 non vno vbique habitu temperata eorundem ſe-
 minum mollia corpuſcula varijs locis vario alit
 atque inficit alimento: & pinguis lætaminis iniectu
 etiam nigreſcere; ſiue quòd calido ſimi vngvine
 ſos infulcatur, vt candida oleo papyrus; ſiue quòd
 ſumidus ac niger ſimus, quæ nutrit, denigrat:
 indiligentia verò & neglectu violam præſertim &
 roſam, quantumuis purpureæ ſint, poſt annum ter-
 tium (vt author eſt Theophrastus) in ſenium, atque Apud Is. Bapt.
Port. Mag. nat.
lib. l. 3. c. 5.
 adeo in interitum expalleſcere; quòd, humore vita-
 li ob culturæ deſiderium abſumpto, concolor mor-
 ti ſiccitas mortifera ſuccedit. Adeo & flores & mo-
 res cura quidem feliciter, infeliciter incuria expin-
 gunt: vt illa vitam in ipſis coloret, hæc mortem.

Arte maius Natura miraculum.

CAPVT VI.

Artis, & Na-
turae concer-
tantium fa-
bula.

L Egite iam florum auidi mortales, inter flo-
res artificiosè coloratos ornandæ veritati
natam, floridulam fabellam. Ars Hercu-
lano amoris vinculo Floræ coniunctissima in eiuf-
dem hortensi theatro insolitis coloribus, flores ex-
pingentibus, inaspecta post hominum memoriam
spectacula ediderat, & in tenui re non tenui cum
gloria luserat. Nec Flora solùm admirabunda,
sed ipsa etiam Ars gloriabunda garrulo præconio
sibi plaudebat. Dissimulandum tamen in fœ-
mina fuerat familiare natiumque crimen, su-
perba garrulitas; nisi Naturæ se se ipsi nouo colo-
randi artificio prætulisset. Vicimus tandem,
aiebat, vel ipsa, qua cum assiduum mihi ami-
cumque pro gloria certamen est, quæque victa
obmutuit, Natura iudice vicimus; dum tuis,
Flora, delicijs militamus. Quàm vellem, quæ
vbique est, ac nusquam visitur, regali, quo mi-
hi sæpe gratulata est, ore conspiciendam hîc se-
se daret: vt palmarem hanc, seu veriùs floream
victoriam suo quoque plausu cumularet; ac fate-
retur, ex istis victricem mihi coronam floribus
deberi, quos ab orbe terrarum condito ipsdem
illa

Artis iactan-
tia.

illa semper, obsoletisque iam coloribus inficit :
 inusitatis ego conspicuos admirandosque perficio . Pupugit æmulæ Artis iactantior vox aures
 animumque, magnæ miraculorum opificis, Naturæ : & , Itane verò ? ait . Quæ sine me inertissima
 esset Ars, de me citra pugnam triumphat ? Age ante victoriam triumphanti meritum plau-
 sum properemus . Tum regio vultu habitu <sup>Naturæ habi-
 tus .</sup>
 que spectabilis placidam iram dulci rubore speciosè pinxit in genis : ut non excandescere , sed
 splendescere visa sit . Amantissimæ enim rerum omnium parentis est sine noxio fulmine fulgurare .
 Vel oris taciti tranquilla, æstuante corde , maiestas mitissimum ingenium eloquebatur .
 Pectus in vbera porrectum altricem liberalitatem, omnibus lactescentem, indicabat . Regia dignitas
 & potestas in amictus ac sceptri aureo , nempe bono lumine cernebatur . Hoc igitur ore ^{Comitatus .}
 cultuque augusta ex infinito stipatorum numero quatuor tantum assecclas deligit, præsentem ad usum
 accommodatos, Vertumnum scilicet , mutationum omnium Dædalum , vario & versicolore
 amiculo æquè, ac nomine ipso, versatilis vires ingenij denudantem ; recocto in crudum iuven-
 tæ robur senio , mimico rictu , atque hircino barbitio festiuiissimum caput : ipsos quoque Solis ac
 Lucis nitidissimos filios, eodem editos partu tergeminos pueros , quorum formosus nitor dies

est, Luciferum, Meridiem, Hesperum. Et Lucifer quidem scitissimo filo adolescens hac formæ textura præfulget. Matutinis radijs, intonsos in capillos extenuatis, aureolos crinis parili à fronte discessu niueam, in quam defunditur, ceruicem amabili fulgore innocenter incendit, ac nitidè opacat. Quæ toto corpore intermicat, summa in fronte scintillat in sideris lucem, diei nuntiam, desinens venustas, ac mera Venus. Enimvero insolitæ pulchritudinis lux diem debuit præportare: & radiantis comæ cinctum esse decuit fides. Decorè confusi lactis & sanguinis rosea temperies Auroram graphicè colorat in vultu: atque in hoc etiam Aurora liquentibus margaritis rotat. Liquida enim voluptate humiduli & ridibundi ocelli guttatim fluentibus in lætitiæ rorem lacrymulis subinde gemmant. Potes & hunc de more rorem saluam siderum appellare: siquidem ocellos à stellulis non distinguas. Molli cliuo eminulæ vberesque genæ Hyblæo colle feliciùs florent; inermibus enim rosis purpurant, hoc est, ut roseam rem florida breuitate complectar,

Vestit pudoris purpura inuestes genas.

Puniceum osculum, dum animam recipiat, odorum omnium vitalem suauitatem inhalat. Byssinæ chlamydis nebula glabelli corporis, quod inumbrat, interlucente formositate præradiat.

diat. Gemella venustate visendus clarissimè se
prodit sua, nempe meridiana, luce Meridies.
Breuioribus radijs ardentior coruscat flaua cæ-
saries, natiuoque calore sine calamistro crispu-
los in cincinnos annulata suspicientibus au-
ream gratamque oculis conferit catenam. Sum-
mæ insidet fronti nitidissimus Sol, digna vi-
delicet crinali auro lux. Gemina cum Solis immi-
nentis, tum ingenitæ pulchritudinis luce viui-
dus vultus decenter ignescit: atque ipse igneus
decor meridianum afflat ardorem. Splendi-
dæ mediæ diei simile velamentum ex auro, te-
nera ilia substringens, multum corporis nudat:
meliùs enim protegit nuditas æstuantem. Simil-
limis, planeque fraternis Hesperum lineamentis
artifex pulchritudo decorauit: facie tamen leui-
ter fusca; radiorum capillamento rufiore, ante-
pendulo & anteuentulo, ferme oculos præuelan-
te; diurna luce in pallidam stellatæ frontis faciem
elanguescente; occidentis diei purpura colora-
to medio velamine nuntium noctis illustrem
significat. Hoc ergo & habitu & comitatu Na-
tura in conspectum sese dedit Artis, recens apud
Floram miraculum sublatè magnificeque prædi-
cantis. Assurrexit vtraque parenti maximæ, ve-
rendo fulgore percussâ. Ars etiam, quamuis ta-
cita, leui rubore iactantiæ conscientiam falsa est:
vt non fruticibus modò, sed genis quoque rosas

Ad Artem
oratio.

inseuiffe videretur . Eam ita prior alloquitur Natura . Ecce, quæ nusquam abest, quo cupis, adest ore spectabilis; quo non cupis, formidabilis, nec ante plausum datura, quam iusto duello superata succumbat . Quanquam superare quî possis eam, sine cuius armis & viribus nec etiam pugnes? Sed age, quam verbis confidentissimis præcerpsisti, vtra nostrum re ipsa victricem colorandis è floribus palmam legat, ad nouam Floræ voluptatem ac decus, te ipsa iudice periclitemur . Venerabunda gratias agit Flora: prouocationem.

Artis insitum
admirandum.

Ars interrita non reculat . Ergo, vt erat ab recenti opificio collectis decenter lacinijs artificiosum ad prælium succincta, exertisque brachijs expedita, è circumfusus insitionis armis falculam, moræ impatiens corripit: fortè proximum Italicæ rosæ perpetuò virentis fruticem in fictili consitum strictim attondet: è duplici oculo delibratum corticem abducit: albæ rubræque gemmas callida inoculatione sufficit . Mirum visu dictuque! Roseus frutex, velut insititia non amœnitate solùm, sed humanitate quoque inoculatus, & pro cultricis atque ornatricis Artis victoria officiosis non spinis, sed floribus pugnaturus, tribus illico tumet gemmis: mox totidem fruticat ramulis: triuni denique colorum vernat rosis, natiua, scilicet subrubente, atque alba rubraque insitiuis . Miratur triforimi pulchritudine amabile monstrum

strum Flora. Naturam verbis hisce vellicat Ars.
 Quæ tuis armis pugno, quàm prosperè meo ingenio expugnem, vide: quàm grauius tuiste rosis conuulnerem, fatere. Leui primùm risu elusit argutulam insultationem Natura: tum, Hoccine, inquit, est, quo me iugulari posse sperasti, trifidum è triplici rosa telum? Faxe iam roseos istos colores adhuc inuiso, acque inaudito, tuisque conatibus maiore miraculo repræsentatos aspicias, ipsoque spectaculo saucia des tandem victrici Naturæ debellatas manus. Tantum profata terram præpotenti virga leuiter verberat. Illo leuissimi verberis nutu admonita tellus, quid magna iubeat Imperatrix, repentinum turgit in partum: mox vegetum germen excludit, quod paulatim ramosa brachia dispergens, mediisque inter ficulneas & pampineas frondibus virescens, ignotam in arbutulam adolescit, pallido cortice decolorem, florumque rotundis calycibus onustam. Hærebat rei euentu suspensa Flora: ipsius verò Artis, præfago metu immotæ defixæque, corculum assultim palpitans, & properè micans trepido tripudio artem ludicram faciebat. Trepidationis motu choreæ cælestis æmulam solliciti cordis saltationem horum Natura verborum sonitu incitauit. Hactenus prolusimus: iam seriò pugnabimus. Nec nobis opus est ferro ad victoriam. Sine insitionis tuæ operoso vulnere

Naturæ arbutula mirabilior.

vin-

vincemus. Atque vt à meis floribus tandem profligata expalleſcere diſcas, atque erubeſcere: trium iſta colorum tibi laborioſa miracula nos per ludum & choream properabimus. Tum ſuos ad aſſeclas conuerſa, Age, inquit, vetule mi Ludio, in admirabilem omnem varietatem verſipellis Vertumne, citatam efficacemque ſaltationem & modulato ſono, & numeroſo ſaltu præi: vt recentes flores, celeripedem vertiginem verſicolore viciffitudine imitati, coloratam choream ludant. Vos quoque agite, mea lux, diurnæ nitedulæ, Lucis puerperæ nitidi Lucilli, peruulgandæ diei perpetui triumuiſi, volucres orbis infimi pictores; quippe qui, deterſis tenebris, rebus redditis colorem, vnoque omnia lumine quotidie coloratis: agite, inquam, peregrinam iſtam roſam vario nirore ſic expingite, vt Artis diſcolorem fucum non deſideret: dum expingitis, ſubſultim ſic ludite, vt pugnax pro flore ludus ſeriò vincat. Decent enim floream iocoſa bella victoriam. Statim ab imperio, Dominam prono priùs capite veneratus, incipit tinnulum ſiſtrum numeroſè quater, micare pedibus, toto corpore geſtire, non alia Medea, quàm geniali ſionet ingenio, recoctus multibarbum in puerum, ſenex Vertumnus. Capularis ſenis, iuueniliter alternantis pedes, & latera criſpantis, exoſes enerueſque flexus à cæteris quidem ſpectatoribus

bus risum elicuerunt: ab Arte verò, sibi iam præmetuente atque etiam inuita, extorserunt. Ipsi recentis arbusculæ antea compressi flores semhiulcis repentè osculis subrisere. Numerosi quà sonitus, quà saltus præeuntis illecebram tergemini fratres, agili tripudiantes impetu, persequuntur. Ludibunda interim agilitate mobilis, tremuloque fulgure illustrior, puerorum radiat pulchritudo. Spectaculum hìc habeo sanè nouum admirandumque, quod oculos pridem oblectauit, auribus exhibere. Prior impigro saltu Lucifer ad arbusculam accedit, ac demessum ex hortensi segete candidum lilium, velut in candoris exemplum, extollit: cum ecce tibi grandioris in speciem rosæ penitùs dehiscentes flores, matutino Luciferi albore afflati, ad æmulationem vsque lilij exalbescunt. Mox exultim subeunte, flammeolamque imitandam rosam præferente Meridie, meridiani ardoris roseo sensim lumine colorantur. Ab Hesperitandem subsultantis, expingendumque amaranthum proponentis accessu, occidua lucis colore amaranthino paulatim erubescunt: nouæque rosæ, nouo more, vnus dieculæ pingente luce, trium in colorum faciem variatæ, artificiosum triplicis rosæ, vñitata insitione congestæ, miraculum decolorant. Attonita primùm atque obstupida, ceu saxeæ, Naturæ vi-
obriguit Ars: deinde victam se cum pudore gloriæ.
re, tum voce ingenuè confessa, famulaturas
Natu-

Naturæ manus dedit . Flora quoque obstupuit
& plaussit : suasque geniali victoria illa delicias cum-
mulatas esse sibi gratulata, beneficæ bellatrici gra-
tias egit, florum omnium suauitatem redolentes .
Oblato denique ab eadem Flora florido corona-
mento, victricem ornaturus, dubitatum est , vtrum
vox , an flos fuerit suauior . Hic florei duelli finis :
hoc documentum , infeliciter pugnare Artem ,
cum repugnat Naturæ .

Neque



Neque verò quisquam existimet, Elysiæ amœnitatis
 fabulosum à me florem aliquem prædicari: nam de-
 cem ante annos à nostris hominibus occidentali ex
 India missum semen est floris huius, quem bar- Rosæ Sinen-
sis nomina.
 baro Indi nomine Fuyò, alij à genitrali solo Mal-
 uam Indicam, Iaponicam alij vocant: nos cum
 ijs, qui Romam ex India miserunt semina, Sinen-
 sem Rosam nominabimus. Primus ego meritissi-
 mus sator hospitem florem Romana ciuitate do-
 nauit: Sinenfis enim floris satio atque cultura Se-
 nensi cultori debebatur. Eius igitur semina intra Satus.
 profundum fictile pingui tenuissimeque succreto
 in solo, ineunte vere, in digiti altitudinem raro satu
 deposita, crebris irrigationibus tempestiuè adiuta,
 & modicè insolata, post mensem foliola emittere,
 tum folijs conueltas virgulas excitare cæperunt:
 quibus pro incremento recens identidem solum
 iniiciebatur, vt radicula summam repentes al-
 tiùs obruerentur, instillataque vligine alerentur: ip-
 si autem consito fictili tepidum in locum recepto
 gelicidia cauebantur. Anniculæ plantæ adultiores Translatio.
 ex angusto vasis ergastulo in libertatem spatiosi
 loci assertæ, fœcundumque in gremium præpin-
 guis, irrigui, solibus expositi, ac præsertim ab ha-
 litu Septentrionali auersi soli transductæ, actis ac
 lateque inoffensis radicibus adeo profecerunt ac
 proficiunt, vt quotidie diffusiùs atque excelsiùs
 arborecant. Iamque aliqua, quamuis annuis pu- Magnitudo.
 tatio-

Forma.

rationibus detonsa, palmos circiter viginti eualuit; caudicis verò dimetiens ad quinque digitos pertinet. Radix albida, lignosa, numerosis implexisque fibris ad summam vsque tellurem capillata, ramoso diuortio simul vna & multiplex, præposteri situs arborem subterraneam, eiusque, quam parit ac sustinet, similem congeminat. Ab radice caudex pallidus, simplex, & lævis frequentibus subinde distinctus oculis conuiuet, quibus gemmaret in ramulos, nisi cultrix vigilantia cæcatum in tectem proceritatem educeret. Vbi truncus desinit, concolores frondentesque rami, virgea prolixitudine sublimiter latèque porrecti, vna nemus arbore faciunt. Caudicis ramorumque materies instar ficulnæ candida & carnosa modicè durescit. Folia magnitudine pampineis, asperitate ficulneis, figura vtrisque, aut potiùs hederaceis angulosis consimilia, sed tamen crenata, in ipsa rotunditate angulos & sinus habent: superiore parte herbido virent colore, inferiore candicant: ramosis vtrunque neruis ac venis ex viridi pallentibus distinguuntur: sua ipsa vtrinque lanugine asperantur: asperis itidem, crassis, prælongis, ac sæpe palmaribus, primò virentibus, tum superiore parte pediculis subrubentibus nituntur: & raris interuallis disposita sic ramos ferè conuestiunt, vt bina inuicem opponantur, alio deinde bina, qui priori contrarius sit, seiungantur oppositu: atque

que ita geminatione alterna ordo foliorum decussetur. Verum, ut ingenita folijs asperitas minuta non manibus modò, sed oculis quoque contrectata exploratissima esset; lynceum exploratorem, nempe microscopium, siue conspiciulum tubulatum consulimus, quod ab ima parte suffultum ad breue intervallum subdita corpuscula, ingentem in molem amplificata, suisque distinctè partibus coagmentata, supernè intuentibus demonstrat. Hoc igitur monstrante, in parte folij supina maiusculorum nervorum pulvini & mediocriter virides, & albicantibus tanquam stellulis incompositè distincti visuntur. Reliqua verò area inæquales & multiformes in areolas, alba humilique lanugine opertas, & rufis atque eminulis velut lenticularibus verruculis asperlas, angustis quoque ac virentibus mæandris, tenuioribus nimirum venis siue fibris interstinctas extenditur. Sed pronæ partis torosi nervuli diluta in viriditate candore simili stellati sunt, & reliquum folium pariter lanuginosum ac verrucosum est. Pediculus quoque subviridis, breuique lanugine hirsutus, cum albida, tum subrubicunda scabritie exasperatur. Ab æquinoctio verno in germina oculi turgent: convoluta foliola primùm apparent, quibus paulatim sese tum explicantibus tum amplificantibus virgei subeunt ramuli, assiduo partu, dum adolescunt & roborascunt, è gemmis folia trudentes. Quin etiam non rarò fit, ut ex eadem gemma fraterculus

H h folio

Floris tem-
pus, & colo-
res.

folio ramuſculus adnaſcatur . Sic toto ferme anno foliorum ramorumque perpetuo prouentu ad hi-bernum uſque ſolſtitium Roſa Sinica ſilueſcit . At-que hoc tandem tempore, cum contra frigora oportuit eſſe veſtitiffimam , folijs ſubinde dilabentibus nuda hiemat: ac, niſi loci ſitu aut artis ope protega-tur , facile gelu adurit, atque etiam interit. Quod-fi clementior bruma prætepeat, vixdum veteribus amiſſis, nouarum in frondium præproperum geni-mat ornatum . Tertio à ſatione anno florere capit . Quanquam, difficili iam ingenio mitigato, bima- præfloreſcit . Ea floris initia progreſſuſque ſunt . Sep-tembri meſe per autumnæ æquinoctium è puſillis cum folijs, tum floreis alabaſtris confuſæ paniculæ exiſtunt : mox , incremento ſingula discriminan-te, calyces compluſculi , ſeni plerunque vel octoni, modicis ſuffulti petiolis intelliguntur, quorum caly-cum plerique ſummis è ramis, pauciores proximis è gemmis cum præuijs frondibus vnà eminent. For-ma illis nondum oſcitantibus globola , quinis com-pactilis & quaſi criſtata eminulis commiſſuris, quæ medios circum alabaſtros inchoatæ acuta coitione ſaſtigiantur in ſummo . Color iſſdem alabaſtris ab ea parte, qua pediculis inſident, ad imas uſque com-miſſuras viridis , inde ad ſummas ex viridi rubens . Pediculi , qua præſertim parte ſupini ſolem aſpi-ciunt, ſubrubicundi; qua calycibus adnectuntur, craſ-ſiores, tandem panduntur foliaceas in ſtellas, octonis

denisue virentibus, ijsque planis radijs rosarum calyces excepturas. Nam peregrinæ formositatis floristellæ ipsæ famulare gestiunt in obsequium subiaccere. Vbi ferme ad nucis iuglandis magnitudinem isti extumuere papillati corymbi; in lacteum florem, extimis folijs, intimorumque nonnullorum oris subrubentibus, auarè dehiscunt. Mox totam sese pandit ad Batauræ rosæ amplitudinem, repando calyci, sæpius quinquepartito, & in pateræ formam nonnihil sinuoso insidens, varia serie foliorum ramulosis rugis crispantium speciosa, triplicisque coloris vicissitudine speciosior Sinensis rosa, florum Vertumnus, hortense miraculum. Rosa hæc primo lactea decenter nascitur: decet enim floris infantiam lac. Albo deinde rubroque temperatis coloribus, in oris humani formosam temperiem transformatur, vt hominibus charissima sit, quibus concolor est. Tandem candido vultu paulò ante nata, purpureo moritur, vt pauidè morientibus exprobrat iracundo rubore pallorem. Nostrate tamen sub cælo, vtpote minus, quàm Indicum sit, propitio eadem rosa dilutior purpura coloratur. In patrio Indiæ solo vna die, quam vnicam viuit, hæc veluti florum dies matutino cum albore albicat, cum meridiano ardore flammeola est, cum luce noctescente purpurat: vt, quando vnum agrè nouum colorem in pluribus flosculis longo tempore ars æmula elaborat, admirandas triplicis coloris in vno flore

vices præperare vnius esse dieculæ sibi minimè laboriolum ludum victrix natura significet. At verò nostratibus in hortis hospes biduo triduoue viuax diuturniorem flori miraculi copiam facit, vt cumulationem hospitij gratiam lento sui spectaculo re-
pendat. Quanquam utrobique monet è candido
mox purpureus flos, ab ingenuo candore facilem
esse transitum ad purpuram. Floris autem iam pur-
purea folia, vt poma solent, ad maturitatis indicium
(deceat enim maximè purpuram maturitas) humo-
re tenuissimo euanescente, nonnihil conuiuent &
corrugantur; donec tristiùs infuscata, penitusque
contracta deflorescant. Amœnissimæ spectaculum
voluptatis est, alieno tempore sic vernare arbuscu-
lam, vt coloribus multis quadruplicem anni faciem
simul expingat; dum flos alius niueus niuosam hie-
mem, alius flammeus igneam æstatem, purpureus
alius maturum autumnum, alij medio quæ vitæ quæ
colorum transitu varij variè coloratum ver, vniuer-
si denique singulique versicolores tempestatum
omnium vicissitudinem intra tempus breuissi-
mum colorant.



SINENSIS
ROSAE
ARBUSCVLA

Hb 31

Habent quidem eiusdem miraculi præconem Polij
 folia Plinium, Tripolij flores Dioscoridem. Sed ille
 falsa, quippe lapsus memoria; credulus hic audita
 scribit: nos oculis sæpe comperta narramus. Vna
 mirabiles Sinensis floris vices palam tulipa illa æmu-
 latur, quæ materno terræ lacte primò satura exal-
 bescit, deinde ebriola erubescit. Quid vnus ta-
 men flosculus cum floriferæ arboris compluri-
 bus, quid in simplici foliorum ambitu seminudus
 cum foliosiore, quid humi reptans floridulus pu-
 milio cum arboreo gigante, nisi vincendus, con-
 grediatur? Illa præterea mira nouitas quotidiano
 spectaculo pæne viluit, vt Sinensis rosa etiam re-
 cisa in vasculo aquæ pleno, atque adeo inter
 manus, si diutius habeatur, varios induat colores.
 Tanta est flori huic delectandæ mortalitatis ambi-
 tio. Illud autem esse causæ dixerim, cur idem etiam
 demessus colores mutet: quia superstes à vulnere
 floris anima, si præsertim aquæ humore, arborei
 succi vicario, foueatur, floreas particulas natio
 calore quò vehementius percoquit, eò efficit
 coloratiores. Quanquam ego, cum è binis rosis al-
 teram in aqua, in sicco alteram de industria non
 semel habuerim, experimento didici, pari progres-
 sione irrubuisse vtranque, ac simul denique con-
 tabuisse. Vnde interpretari est, hisce floribus insiti
 humoris abunde esse, cum floridam vitam beatè
 tolerent succo suo. Et quisquam neget, rosarum re-
 ginam omnium Sinensem esse rosam, quæ graris

Nat. hist.
l. 21. c. 7.
De Med. mat.
l. 4. c. 130.
Marthol. in
Diosc. l. 3. c.
107. et l. 4. c.
130.

Etiam à reci-
sione varians
color.

colorum vicibus mirabilem in modum varians pulcherrimas sese transformat in facies reliquarum? Ut ipsa celsior atque arborea statura dominantis in cæteras rosæ argumentum sit. At enim odore caret. Hortis etiam vrbanis donantur è nostratribus rosæ vnicolores, odore nullo probabiles. Cur igitur & amabilis & admirabilis non sit, quæ odoris vnus desiderium triplicis variantis coloris constanti miraculo compensat? Quin etiam inodora est magno documento, nimis lenocinantem oculis coloratam speciem sæpe fucum esse vanitatis. Iam verò mirum videri nemini debet, suis adeo Indis pulchrum esse hunc florem, ut, nato inde proverbio, inter homines pulcherrimus quisque Sinen sis rosa pulchrior appelletur. Animaduerti per hosce annos, quibus ea primùm nostris floruit in hortis, triplici flores genere discriminari. Aliæ nanque arbutulæ florem edunt crispante foliorum compage densissimum, qui, cum totus hiascit, plerunque aliqua rubet ex parte; quia velut ex pluribus coagmentatus floribus particulatim panditur & coloratur: quique paulò, quàm congeneres cæteri, seriùs vernat; quia plenioris absolutio floris operosior est. Aliæ verò sparsim eminentibus inter crocos folijs rariùs comantem pariunt. Aliæ demum quinque foliorum simplici serie, medijsque crocis, turbinata in figuram acervatis, quatuor tantùm aut quinque pavoninum in apicem extantibus, pulchre degenerem progenerant.

Indicium pro-
verbium.

Genus tri-
plex.

Ante









Ante hac semen flos hic ad maturitatem non pertulit: quia nondum, ut opinor, iustum incrementum ac robur arbuscula ceperat. Octauo tandem anno, Decembri mense ineunte, deprehendi perfectum in semen rosæ mediocriter foliosæ arbusculam profecisse. Quanquam, quæ simplicem fundit florem, hoc eodem anno, qui tertius illi à satū est, semen quoque maturauit. Floris caput siue Folliculus. & semen. globulus pediculo adhærescens inter quinque florei calycis iam aridas foliaceas lacinias, ad eiusdem adulti calycis magnitudinem extumidus, eminulis puluinorum toris orbiculatim striatur, canaliculis in summa imaue parte stellatam in figuram coeuntibus: aridi præterea colore folij, qui ex viridi inclinat in flauum, decoloratur; breuique subalbido pilo hispidus inhorrescit. At verò totus interior folliculus candicat. Sex circiter carinata loculamenta intercurrentibus membranulis discriminantur, quæ strias inter exortæ in duriusculam mediam cartilaginem coeunt. Intersecta membranis concaua pars, lanugine densa, longiuscula, & candida pubescit. Pediculi alba cuspis ad medium usque folliculum pertinet, cui media cartilago adhærescit: huic semina ipsa numerosissima, rufula, minutula, rotundè longula, modicè incurua, & qua parte gibbum habent, pilosa, æqualis longitudinis petiolis albicantibus ac tenuissimis acutiore sui parte liratim adnectuntur. In vno tantum


Seminis fa-
cies micro-
scopio re-
presentata.

tum folliculo tria & sexaginta supra centum numeraui, sex in loculos siue sinus pari ferè numero distributa. Verùm ut minuscule rei quæque pæne fugiat aciem oculorum, singulæ partes perspectæ exploratæque sint, eodem optico microscopij tubulo minutissima semina inspecta faciem hanc referunt. Magnitudine figuraque hædinos ferme renes æquant: color ipsis est ex fuluo gilvus: toto corpore sunt punctim pumicoso: circa glabellum vmbonem pilis subalbidis, raris, inæqualiter fruticantibus, dimidiatum digitum prolixis, in setas aculeosue porrectis, horridè capillantur: vbi denique in se reducta sinuantur, hilum exprimente oblongo callo, nigricante, albida intercurrente linea distincto, altera parte capitato, altera nonnihil exporrecto, definiuntur.

Iam









Iam verò ita præterea peregrinam arbusculam cūramus. Ramosa luxurie siluescentem, ineunte Martio interlucata densitate, deputamus: emaciata cacumina intondemus. Vt autem reparata subinde sobole perennitati prospiciamus; non modò rosam hanc semine serimus, sed auulsos quoque resectosue materni cum corporis parte, nempe cum veteris portione trunci, nouellos ramos, atque ima parte ad morem ficulnei surculi nonnihil diffissos, in vnum alterumue palmum eodem mense depangimus: gemmis singulis vel binis è terra extantibus, quod de cacumine superest amputamus: resinata cera plagas obducimus. Ita semestri spatio radices, annuo flores elicimus. Virgas insuper stirpitus pullulantes aut nonnullis cum fibris decissas transponimus, aut à parente in terram demersas propagamus. Sed agedum, vt planè admirandum in huius rose versicolore pictura naturæ artificium peruideamus, floream picturam ipsam eruditi Lycei bono, idest philosophico in lumine collocemus. Et flores & fructus vniuersi commune hoc habent, vt, quandiu formam atque incrementum capiunt, paulatim varios transeant in colores. Prout enim insitus calor quotidie magis alimentum concoquit, humoremque siccitate variè temperat; ita colorum elicit subinde consequentium varietatem. Attamen varietas ista, quia lentiore transitu perficitur, minùs est

Discoloris
varietatis
philosophica
ratio.

obseruabilis, minusque cum nouitatis, tum admirationis habet. Ad hæc in plerisque quæ floribus, quæ fructibus idem incremento corporis & coloris modus est: siue quod è stirpibus aliæ, quæ robustiore altrice vi vegetantur, dum partus suos natiui caloris efficacitate cæteris perficiunt partibus, simul etiam ad vegeti coloris firmitatem stabili temperie afficiunt: siue quod in alijs calor imbecillior, humorem minus obsequentem nactus, quam absolvere temperaturam nequit, inchoatam relinquit, vnaque florem languidè coloratum. At verò cum Sinensis arbuscula & mediocri calore, & humore sit prædita tenui (vnde aquis eadem gaudet, & propter aquas in India, feritur) adhuc impar concoctione valida humori spissando calor, eundem prius vbertim trahit, lateque diffundit ad florum partes congruenter explicandas: satis deinde conformatis adultisque floreis membris, totus in eo est, vt minùs contumacem succum magis magisque percoquat, eidemque perfectiorem temperiem gradatim inducat. Quare celeri notabilique varietate demum consequitur candorem dilutum color purpureæ ardentior. Et sanè decuit eum florem, qui argenteus regaliter vixerit, rogali funere splendide ignescere. Ita flos formosissimus, qui ad principatum candidatus nascitur, ac roseo
 pu-

pudore modestissimus ad eundem iuuenescit, regia meritò consenescit in purpura.

Emendati, additique floribus odores.

CAPVT VII.

Quoniam ut oris, sic floris fatua est & inanima pulchritudo, cui bene anima non olet: ideo vel inodoros, vel fœtidos flores odorare, atque animare par fuerit beneficium atque miraculum. Hæc autem & floribus & colonis suauis erit odoraria disciplina. Prima sit ratio inodorandi, quæ colorandi fuit: cum scilicet ipsa; quæ conferitur, odoramentis terra medicatur. Sic poteris ouillum fimum ex aceto subactum soluto in puluerem moscho, siue zibetti ambariue liquore, alijsque odoribus temperare; ut è nutritio depacta germina olecto animam bene olidam trahant. Efficacius est ex odorato seu puluisculo, seu liquore medicamentum alterum, quo minuta ipsa semina biduo triduo præparantur: quia, cum id non aliunde trahendum, sed ipsis intimum seminibus sit, vim habet ad agendum præsentissimam. Libet hîc ad felicissimæ fidei culturæ domesticum afferre experimentum. Fuit è nostris hominibus aliquis, eruditæ amœnitatis philosophicus Dædalus, qui calthæ Africanæ,

Florum odor
è terræ medi-
camine.

Seminū me-
dicazione.

quàm eleganter florentis, tam grauitè olentis, semina in aquam rosaceam, infuso resolutoque moscho bis odoratam, biduo præmacerari: tum in umbra siccata humi de more posuerit. Prioris anni flos, natiua nondum graecolentia satis emendata, aduentitiam suboluit suauitatem. Eius floris semina pari ratione medicata, ut quæ insuauem ac feram indolem prope iam exuissent, suauiore proximo anno florem induxerunt. Huius denique floris pariter conditum semen in sortum pulchrè degenerauit tam odore gratum, quàm facie venustum: ut in Africano flore rosam simul, & moschum olfaceres. Recentiores coloni (ut fama est vulgatissima) stylo perforatis radicibus, immixtisque aromaticis caryophyllis, coronariæ vetricæ & odorem & inodorantis odoramenti nomen indiderunt: ut ea iam, veteri appellatione antiquata, caryophyllus vulgariter nominetur. Pari quilibet mangonio poterit peregrinis suauitatibus, in radicum foramina insinuat, caryophyllos efficere odoratiores. Dicitur præterea, quemadmodum coloris, ita odoris admiranda nouitas alienas infusio stirpes infusione transfundi. Sic centifoliam rosam, inodora & fatua specie fallentem, suauissimo halitu animabimus; si rosæ, quam ab anima odoratissima Moschatulam vocant, sæpius inferamus. Nonnulli rosarum odorem ita rosis exaugent. Ipsarum radicibus implicatas roseas coronas simul

Odoraminu
inmissione
in radices.

Infusione.

De Bapt. Porta
M. g. nat. l. 3. s.
16.

Florum hu-
matione.
Consiant. Po-
goni. de Agric.
l. 11. c. 19.

ado-

adobruunt: vt cæteras faciliè vincant rosæ, quippe
filix coronarum, victores ornantium. Cum igitur
halantibus è floribus iucundissimi florem spiritus
cognatæ radices ducant; cumque corruptis dein-
de, atque conuersis in amicum pabulum rosas alan-
tur: odoratiore anima ipsi partus impertiuntur.

Illud verò cuiuspiam penitus incredibile videatur, ab
assito fœtore odoriferas feliciùs prouenire delicias.

Fortidis ro-
bus assitis.

Testes tamen habeo odoris fœditate nobiles, & al-
lia & cæpas; quæ coronarias omnes herbas, & no-
minatim rosas, si iuxta inhumentur, Theophra-

De caus. plant.
l. 6. c. 28.

Apud Cens.

Pogon. ibid.

sto ac Didymo affirmantibus, suaviùs inodorant:
siue quia, cum vnumquodque re sibi consimili
nutriatur ac delectetur, quicquid grauis halitus
circa est, olida hæc olera trahunt ac resorbent;
qua summiota graueolentia, defæcatus floribus odor
acerrimusque relinquitur: siue etiam quia calida
exhalatione inhalata odorem exacuunt, & locum
exiccant. Siccis autem locis oderatiora omnia

proueniunt. Quapropter incoquente sole sicca-
nea Cyrene flores parit odoratissimos: Nilo sta-

Theophrast.
De hist. plant.
l. 6. c. 6.

Plin. Nat. hist.
l. 21. c. 4. 7.

¶ 11.

gnante humida Aegyptus abortiua fœcunditate
fundit inolentes. Vique adeo, vt oratorum, sic hor-
torum fœcunda siccitas & acutiùs & iucundiùs
olet.

Mutata florum formæ.

CAPVT VIII.

Polydorus
Neruccius.

Q Vis hoc vnquam crediderit? ingens nostra etiam ætate miraculum, Proteus, in flosculis latet: necdum vllus inueniri potuit Aristæus, qui de floreâ illum latebra in publicæ cognitionis lucem satis extraxerit, nempe arcanam peruulgarit artem, qua flores, cum forma tum foliorum numero insigniter aucti, vultum habitumque, variantris Protei more, demutent. Vidi ego sæpius Translyberinis in hortis Polydori Neruccij, suis ipsis lectissimis floribus amœnioris viri, anniculas anemonas latifolias, nondum è fictili catilorum seminario in capaciora vasa translatas, vix paucis degenerantibus, adeo foliosæ amplitudinis, & iucundissimæ varietatis læta nouitate mirabiles; vt vna, spectatoribus vniuersis attonitis, ea voce plauferit admiratio, in eo florum genere conspici posse conspectius aut mirabilius nihil. Cæterùm concinnandi ad hoc miraculum seminis ars, luce dignissima, adhuc tenebras amat. Satorem enim, velut oraculum, cum aliquando consuleret curiosa & supplex amicorum obsecratio: liberaliter patefactæ artis arcanæ loco vocem illam retulit, diuini consilij tenacem, Secretum meum mihi. Ego ve-

rò

rò, ambiguis missis ambagibus apertè aio, accurato, quem præmonstraui, satum, & perspicaci propitij sideris obseruatione fieri posse, vt semen Proteo mutabilius inusitatas in florum formas admirabili varietate degeneret. Vt autem numerosa foliorum serie stipata, amplificataque anemonæ proueniant, semen legetur è floribus, qui præcoces inter ac serotinos medij vernant. Hos enim neque frigoris, neque caloris inclementia præuitiat; sed benigna temperies ad felicissimum seminis educat prouentum. Quoniam verò ex his quoque nonnulli vel nullo, vel maligno exitu sementant; deflorescentium indoles obseruabitur: ac, deterioribus decussis, flos vnus aut alter è vegetioribus reseruabitur, cuius medium capitulum vastius intumescat. Consimili cæteri flores industria proficient: si, præcipuè amputatis præcocibus vniuersis calycibus, è tardioribus vnum efflorescere patiamur, in quem tota vis genitalis, & sæcunditas effundatur. Eueniet enim facillè, vt flos amplior aut foliosior niteat, & semen generosius in spem pulcherrimæ posteritatis existat. Solertissimi coloni probabilis vox est: Si floream quancunque plantam breui vernaturam, quintadecima luna, vel paulò ante, demessò floris germine, transferas, eidemque, dum comprehenderit, solem defendas; flos erumpet foliolo conarudensissimus. Accepi, Germanum hominem, in hortensi cultione satis exercitatum, affirmare
foli-

Flores quo
artificio lo-
lioli.

ſolitum, fieri poſſe, vt ſimplici flore ignobilis atque inglorius caryophyllus multiplici foliorum ornatu nobilitetur; ſi trigefimum intra diem à diuinæ Matris in cælum aſſumptæ ſextilibus ferijs eius caryophylli frutex in vaſe fictili, optima terra oppleto, deponatur, ac repente loco ab hiberno frigore vindicetur. Sin generis eiufdem duo vel tria ſemina in ceræ tubulum, pinnæue calamum, ima quàm ſumma parte laxiorem, incluſa ſolo committas: florem itidem folioſum elicies. Alia, & quidem artiſcioſè conſuſa, ſatio inter hortorum admiranda ſpectacula ſpecioſiſſimam tibi aſſeret floream Chimaram. Quod igitur de olerum miſcellaneo ſatu Didymus tradidit, ad conſimilem florum ſationem ſic traducito. Ouilli aut caprini fimi fabam, quamvis exiguam, ſubula excauato: diuerſa deinde ſemina in ipſum cauum conſertim indito: vbi tenerum & rarum ſimum ſubſtraueris, optimè culto in ſolo parua ſcrobe demergito: tenuem terram ſuperiniſcito: leniter irrigato: vbi exire in folia ſemina cæperint, aquulam irrorato: aſſiduè lætamen inſpergito: poſt excitatum caulem vigilantiorem curam impendito. Sic è pluribus coalitum floribus amabile monſtrum habebis. Proderit quoque ad hunc uſum binas vel ternas eiufdem ſtercoris baccas contundere: varia cum ipſis ſemina permiſcere: papyro detritoue linteolo inuoluta, & deligata defodere: reliquam denique diligentiam adhi-

*Apud Conſt.
Pogon. de Agr.
l. 12. c. 14.
Plin. l. 19. c. 12.*

hibere. Quòd si crispulæ placeant florum comæ, Quo crìspi,
Apud Còssi.
Pegen. ibid. c.
23. à Græco Florentino tradita de apio crispando ars ita transferatur ad flores. Ante in pila leuiter semina tundantur, atque cylindrus ipsis inducatur, quàm eadem inhumentur. Volubili enim compressione prætorto feminis meatu, conuolutus funditur flos, veluti flexo in spiram siphunculo tortilis aqua. Conducat fortasse nonnihil ad florum magnitudinem variandam animaduertere, ex qua folliculi parte semina colligantur, & quo situ collocentur. Nihil sanè obest in floribus periclitari, quod certò euenire Columella testatur in cucurbitis. Nam graciles è tenui collo, vastiores è medio ventre collectum semen affert. Vt à satione iam ad insitionem transeamus, ipsa nominum monet affinitas. Angustiore igitur florem amplificabis, si floris amplioris frutici vel arbusculæ adiunctum pronuba maritet insitio. Sic ob animam suauissimam grandiore digna corpore Damasce-na rosa, quam delicato odoratoque vocabulo Muschatam seu Moschatulam appellant, si latius purpurantem aut albentem inseratur in rosam; à felici coniugio pleniorē habitiorēque trahet formositatem, & florei paludamenti pompam ornatiùs ac fusiùs explicabit. Plura possunt ad florum formam demutandam perficiendamque in olerum arborumque mangonio iam vsurpata traduci, aut etiam noua solertis ingenio coloni excogitari. Pau-

Quo variè
magni.

l. 11. c. 3.

cap. 3.

ca nobis præmonstrasse sat est, ut (quod supra monui) florum studiosi ad nobiliorem culturam expergiscantur. Scio esse, qui liberalius quàm veriùs doceat, ad arbitrium docili cereaque esse indole teneros flores: &, sicut naturæ artificio inscripti nomina regum nascuntur, sic artis magisterio posse in seminali tyrocinio erudiri, ut faciliè fiant è rudibus litterati. Scio etiam esse, qui, poetica scilicet fide, de se illud affirmet:

*Vidi ego cultoris, medicato semine, flores
Versicolore coma nomina ferre sui.*

Verùm hæc iste somnia speciosa clausis, opinor, oculis vidit Parnassijs in hortulis, quorum flosculi fabellæ sunt. Nam quí fieri potuit, ut medicamine natas floreas litteras vnus poëta, nisi somnians, legerit: cum vniuersi tum veteres, tum recentes coloni super hac arte cæcutiant? Nimirum noui præco miraculi pro vero simile veri poëtico veriloquio, idest canoro mendacio, prædicauit. Est autem vero proximum, ausam fuisse imitatricem artem, quod artis magistra natura perfecerit. Videmus nos quidem constanter ludentis naturæ manu complures flosculos iisdem semper discoloribus notis figurisque distinctos, easque à varijs qualitatibus, certa lege in semine ordinatis, existere intelligimus. Sed quamam ipsas arte natura in feminis perpusillo sinu ordinet, atque in versicolores de-

in-

inde ductus explicet, penitus ignoramus: hoc est
 inscribendorum florum artificium compertum
 adhuc non habemus. Licebit sanè discolorēs in Quo litterati;
 tulipæ flore notas & formas, non tamen ad hæ-
 redes bulbulos transaturas aut perennes, utpo-
 te non ab innata, sed aduentitia causa perfectas,
 exprimere; si (quemadmodum in floribus coloran-
 dis indicauimus) innoxia incisio easdem bulbo
 impresserit, atque altior pictura colorarit. Aliud Alexius Pe-
demon.
 hic habeo in floribus folijsque picturæ genus, ab
 alijs præmonstratum, ostendere. Sal Ammonia-
 cus, & candidi exiguum sacchari cum aceto te-
 ritur in lapideo mortario; eaque intrita in usum
 asservatur. Cum libuerit, cumque per florum
 tempestatem licuerit; rosæ vel caryophylli folia
 sic cera glutinantur, ut æquata prorsus appareant:
 prædicto deinde liquore litteræ, aut alia quælibet
 signa præformantur: post horam, intra quam li-
 quor ille siccescere solet, aurum argentumue in
 bracteas tenuatum applicatur, & gossipio leuiter
 apprimitur: eodem tandem absterfus, quæ non hæ-
 rent, reliquijs, in floreo volumine aurea vel ar-
 gentea legetur eruditio. Si velis aqua pingere si-
 ue scribere, quæ quamuis acris, innoxia tamen
 floribus sit; hoc modo facies. Sumes tibi gummi
 Ammoniaci partes tres, Arabici partem vnā,
 sagapeni partes quatuor: omnia permiscebis, at-
 que

que in aceto patieris esse, donec emollescant: deinde contundes, percolabis, seruabisque in vsu. Sic præterea non absimilem compositionem conficies. Gummi Ammoniaci vnciam vnam, Arabici vncias tres per horas quatuor & viginti aceto macerabis & emolles: adijcies flauī mellis quantum nucis magnitudinem æquat, & alij decocti contusique caput vnum cum aloes hepaticæ momento: ea itidem commiscebis, atque aliquandiu ex aceto coques: exinde colabis, totumque bene succum exprimes. Sin autem is videatur liquidior, eundem recoques, donec iusto lentore spissetur: atque ita præparatum in vitreo vase custodies. Quando autem vti volueris, quæ fuerint obducendæ auro in floribus notæ, eo medicamine præducentur: vbi deinde siccata, calidoque oris halitu satis humectata fuerint, auri bracteola penicillo aut gossipio applicabitur. Aliam pingendi floris artem Hieronymus Cardanus tradit, ipso periculo exploratam. Ficulneo lacte in flore foliove arbitrariæ figuræ notæque præfignantur: vbi lac concreuit aruitque, lactea scriptura colorato puluisculo inspergitur, aut auri argentiue bracteola contingitur: siquid alibi superuacaneum hæserit, gossipij globulo decutitur aut detergitur. Ita prius adumbrata, præclare signa eminebunt: ita floribus & folijs cum res, tum verba

non

non inutiliter mandabis . Sunt præterea , qui lacteum fici humorem oui albumine temperandum , aut vnum allij succum adhibendum existiment . Sed vtinam liceret arti natiuis atque indelebilibus notis flores inscribere , sicut licuit colorare . Tuam enimvero , Franciscæ , tuis tuorumque laudibus Princeps eminentissime , gentilem gloriam prædicaturi , iucundissimo nomine Barberino gloriose inscripti nascerentur . Quid enim floribus iucundius , quàm eo nomine insigniri , quod ab amicis Vrbani Apibus profectum prorsus melleum est ? Quid verò etiam congruentius , quàm eius nomen floreis litteris commendari , qui cum eximia floreat litteratura , tum impensè faucat litteratis ? Verùm vnus fas est aut naturæ viribus , aut mendacijs poëtarum flores inscribere , & quodammodo erudire : vt regium pueri nomen in hyacintho , atque in vetitæ Flaminii Diali fabæ flore lugubres litteræ appareant . Attamen , quod ars nulla possit , virtus vestra perfecit : vt , si minùs flores , multò certè nobiliores hominum animi nominis Barberini cultu inscriberentur . Quanquam in obsequium vestrum arte felicior natura Barberinæ familiæ insigne , iuxta gloriæ , ac mellis diues , in floribus vniuersis quotidiano faciliq̃ lusu exprimit ; dum in ipsis Apes , volucris studio properantes , sistit . Hoc ego naturæ miraculum dum ali-

*Barberinum
insigne in
floribus.*

Kk

quan-

Meliſſæ, ac
Florillæ fa-
bula.

quando contemplerer attentius, gauderemque eſſe non poſſe mellificium ſine ſtemmate Barberino, quo flores ipſi exornantur: eruditam mihi fabel-
lam, nempe veteris Apum erga flores amoris ori-
ginem in Barberinos Principes voluntas propen-
ſior ſic ſuggerebat. Meliſſam & Florillam, filias
gemellas, vno ſuſcepere partu parentes fœcundiſſi-
mi, Cælum ac Tellus. Illæ cum genere, tum be-
neuolentia coniunctiſſimæ, ſtudijs tamen longè di-
uerſis diſſidebant. Florilla enim florum, quos amore
magis quàm nomīne complectebatur, colendorum
ſtudioſa, floriferi cultus inuentricem Floram ſe-
dulò ſectabatur, & eiſdem elegans imitatrix, amœ-
nitarum omnium delicijs florentiſſimos hortos ſi-
bi extruxerat, quos diligentia inſatigabili excolebat.
Ex illa deinde ad omnis ætatis, noſtræque præſer-
tim, principes viros ſuauiſſimæ huius culturæ nobi-
le ſtudium propagatum eſt. Meliſſa verò muſici
diligens & perita concentus, atque adeo inter Mu-
ſas frequentiſſima omnibus beatam numeris mu-
ſicè agebat ætatem. Hæc aliquando Muſarum fami-
liarem chorum, ipſumque choragum Apollinem ad
ſororis hortos congruentis voluptatis ergo inuitauit
ac deduxit. Floridorum enim Præſides ingenio-
rum ſimillimos hortorum flores amant; nec liben-
tius in Parnaffia ſcabritie, quàm in hortenſi amœ-
nitate, commorantur. Omnibus igitur humanitatis
officijs, hoc eſt pluribus animi, quàm terræ, flori-
bus

bus à Florilla excepti hospites mirari amœnitatem loci, nempe Regiam voluptatis: areolarum ingeniosos errores, idest implicandis quâ pedibus quâ oculis amabilem labyrinthum: florum, ad sui commendationem inuitantium, discolorem risum, atque odorata suspiria: aurarum, leui spiritu graues æstus difflantium, iucundè frigidulas blandicias: silularum, motu sibiloque annuentium, opacas illecebras: fonticulorum, liquida lætitia diffluentium, trepidos lusus: auicularum, tinnulis voculis argurantium, canora gaudia: cæli, semper vernantium hortorum delicijs plaudentis, ridibundam serenitatem: medij denique magnificentissimi domicilij iure gemmeum nitorem. Decet enim circumfusus florum radijs non alium solem esse, nisi gemmas. Hæc diu demiratus hospes ille doctissimus cœtus amicam demum nobilemque se recipit ad vmbra. Eminebat editiore in loco annosa Laurus ingentibus ramis cum ad opacandum, tum etiam ad coronandum eruditum chorum diffusa. Inde cum in totam hortorum pulcherrimam speciem liberior excurreret prospectus: Tuæ, inquit Apollo, partes hîc Melissa desiderantur, vt & lectissimis sororis floribus, & nostris auribus canoræ laudationis iucundissimam auram aspires, siue vt flores gemines: neque enim plures Florilla serit, quàm tu loquaris. Tunc enim uero repentè natæ in pudibundis genis tacitæ rosæ oris flexanimi vocales flosculos promiserunt. Igi-

tur numeroſè cymbaliſſans (cymbalum enim for-
 tè geſtabat) ſuauiſſimam cæpit vocem in florum
 laudes eliquare . Mellito Meliſſæ cantu canora Mu-
 ſarum & Apollinis oracula conticuerunt : pennatas
 filiarum Sirenas cantitare diſpuduit, intentoque ſi-
 lentio dulciorem condiſcere modulationem decuit:
 per florem Elyſium vagulæ aurarum animulæ, re-
 pentè attonitæ, ſuſpenderunt volaticum luſum, blan-
 dumque murmurillum : ipſi ſuis delectati laudibus
 flores ridentia decenter oſcula diduxerunt . Sed
 nulli ſuauior atque potentior , quàm Florillæ , flo-
 rum laudatrix accidit cantilena . Etenim illa voca-
 li dulcedine ſenſim ſine ſenſu colliqueſcens ac dila-
 bida cæpit ſibi deficere, dilectosque in floſculos de-
 floreſcere atque transfigurari . Vidiffes primò pe-
 dum lacteolos ac tenellos digitos in totidem florea
 paulatim germina formoſo languore colorari : vi-
 diſſes conantis pedes attollere, actis repente radici-
 bus , plantas humi adhæreſcere , dixiſſesque planta-
 rum illis nomen tum maximè conuenire . Vſque
 adeo ſua cuique voluptas Circe eſt . Altiffimè pu-
 pugere poſthumi ſororis flores Meliſſæ corculum .
 Quare , conſeſtim abiecto cymbalo , mutatoque
 ſtridulum in gemitum cantu , Florillam in flores
 abeuntem irritò complexu moratura non accurrit,
 ſed aduolauit : ac ſimul in corporis mutationem
 æquè prodigioſam neſcia properauit . Nam ſum-
 mæ manus pedesque ſcatere primùm Apibus cæ-
 pe-

Florilla in
 flores .

Meliſſa in
 Apes .

perunt: tota denique in volatile Apum examinem
dissipata est. Nimirum ad sororis complexum pro-
peranti multas amor addidit alas. Mansit autem,
mutato etiam corpore, studium erga consanguineos
flores hæreditarium; statimque ad illos nouellæ
Apes, alatz scilicet Melissæ, prouolarunt: vt, quan-
do vno humanoque non liceret, innumerabili mel-
lificoque ore floeos sororis vultus Melissa iam
multiplex oscularetur. Mirandum itaque non est,
tam auidæ, tam suavis osculationis saluam esse mel.
Deflerunt Musæ, Apollo defleuit nobilissimas so-
rores, à voluptatis amorisque funere noua facies
sibi ipsis superstites, & amissas tamen. Decuit sa-
nè pulcherrimos, quippe natos è Nymphæ,
flores sapientissimi cœtus: pretiosis lacrymis prius
irrorari. Decuit etiam meram suauitatem elabo-
raturas Apes, vtpotè Melissas suauissimas, mellis
oculis lacrymatum rorem prælibare. Sed mutus
oculorum dolor vocalem chorum diutius non de-
cebat. Ergo quæ crotali, quæ sistri, quæ reliquæ
sonoræ supellectilis lamentabili plausu vocis que-
rimoniam geminantes mœstissimæ Musæ, musicæ
nimirum Præficæ, funebri nœnia suauiter obstrepe-
bant. Iucundissimus æris numerosi tinnitus no-
uas Melissas, veteri musices amore inextincto, huc
illuc displicatas in eum locum, vnde sonus emitte-
batur, conuocauit. Quare Musis imminentem ad
Laurum denso examine conuolantes glomerato

partim agmine in speciem vix summo è ramo penderunt; partim mirabili sese ordine atque omne librarunt. Etenim complures ouarum in orbem confertim dispositæ tres in triangulum pendulas coronarunt. Tum verò in illo lætissimo prodigio futuram felicitatem præuidens certissimus interpretes Apollo, Accipio, inquit, omen, gratoque oraculo promulgo. Veniet illa tandem ætas, veniet, qua Musarum volucres mihi charissimæ, Barberinæ Apes, virtutum omnium florem, ab ingenito amore sibi cognarum, gloriosa sedulitate delibantes, mea in Lauro, sapientiæ imperijque coronamento, nobilissimæ posteritati suæ nidificabunt, vtilitati publicæ mellificabunt. Vix ea felibus quidem, at fugacibus verbis auguratus; ut Barberinæ gentis domicilium in perenni Romanæ gloriæ viriditate æquè stabile futurum, ac Troianis aduenis in Latio fuerit, mansuris notis præsignificaret; coronariæ ac triumphalis Lauri trunco

David 7.

Quod





Quod igitur laurea semper in umbra splendide ^{Barberina gloria.} habitavit Barberinorum examen Heroum, nunc, ut cum maximè, tum morum, tum sapientiæ, tum imperij suauitate sese Lauro dignissimum ostendit. Nobis enim uero illud bene ac beatè contigit, ut in tribus Barberinis fratribus Francisco Antonioque Cardinalibus, Thadæo Vrbi Præfecto & Principe Prænestino, collecta maiorum decora intueamur, amemus, & colamus: utque fratres eosdem in illustrissimo auro examine, tanquam gentiles tres Apes, maximè conspicuos hoc à vulgaribus Apibus distare fateamur, quòd illæ regem vnum habent, hi regia omnes indole cum Patruo ter maximo, VRBANO VIII. & sapienter & feliciter imperant. Te verò, Francisce, regiam in primis Apem flores mei experti sunt, ad quos singulari beneficio cohonestandos purpuream maiestatem istam, aureamque opulentiam inclinasti. Tuo illi auro debent, siquid nitent: ac sese totos tibi obstrictos laxatis officiosum in risum osculis eloquenter contestantur. Quis alterum præterea Antonium Pontificis fratrem, è Vaticanæ purpuræ flore pietatis eximiam mel colligentem, velut Apem prudenter sedulam, non suspiciat? Nostræ demum ætatis felicitas est, in orbis terrarum regnatrice Vrbe Urbanam Apem tam suauiter dominari; ut è Vaticano culmine suauissimæ indolis nectar,

poë-

poëtica mella diffundat . Licet per liberalem, profundentis Vrbanitatem, libetque per insitam omnibus suauitatis auiditatem aliquid melleæ poësis delibare: quin etiam omnino decet è floribus, mirabili naturæ lusu, properatoque gaudio hieme vernantibus, natum, atque in carmina eliquatum, mel ad hanc florum commentationem, ab insulso scriptore insuauem, extrema manu condiendam, corriuare . Quam enim longius meum volumen complecti non potuit, hanc breuissimi epigrammatis fauus dulcedinem includit. Sic igitur eadem & auribus & animis planè mellea fluit.

Ex Poëmat.
Maph. Card.
Barb. munc
VRBANI VIII

*Veris opes varios flores mirata superbit
Purpureas inter cana Pruina rosas .
Ver queritur: mærensque, meos cur, inquit, honores,
Floriferumque rapis tu mihi Bruma decus ?
Tu quoque, Bruma refert, glaciem furaris, in æstu.
Vt sint vina magis grata, niuesque rapis .
Parcite iurgari, clamat Solertia : per me
Nix æstate riget, florida vernat Hiems .*

Consiste in melleo carmine Florum Liber . Mætam suauitatis & gloriæ attigisti . Nullus enim Florum Culturæ fructus suauior, finisque nobilior, quàm, præter morem supraque votum, ex Apum Rege mellificium .

L A V S D E O .

INDEX RERVM.

A

A <i>Cacia Indica Cultu-</i>	
<i>ra</i>	371
<i>Descriptio</i>	209
<i>Adonis horti.</i>	5
<i>Adriani Spigelij inuentum flo-</i>	
<i>reum.</i>	434. & seq.
<i>Alcinoi horti.</i>	5
<i>Aldobrandinorum horti.</i>	88
<i>Anastafius de Vetera.</i>	396
<i>Andrea Capranica disputatio</i>	
<i>hortensis.</i>	442
<i>Anemone latifolia.</i>	174. 179
<i>Anemone tenuifolia.</i>	173
<i>Alba rubro circumdata.</i>	176
<i>Alba rubro umbilico, coma</i>	
<i>bicolori.</i>	178
<i>Albicans.</i>	175
<i>Cinnabari albisque maculis</i>	
<i>bicolor.</i>	ibid.
<i>Coccinea folijs conuolutis.</i>	ibid.
<i>Flammea.</i>	178
<i>Lactea.</i>	175
<i>Miniata diluto colore.</i>	ibid.
<i>Miniata saturo colore.</i>	ibid.
<i>Purpurea flore holoseri-</i>	
<i>co.</i>	178
<i>Quinque colorum.</i>	176
<i>Rubore saturo fusca, albo</i>	
<i>distincta.</i>	177

<i>Rubra.</i>	175
<i>Rubra albo virgata.</i>	ibid.
<i>Rubra medijs lacinijs vi-</i>	
<i>rens.</i>	177
<i>Subrubens viridi umbili-</i>	
<i>co.</i>	ibid.
<i>Subrubicunda comam col-</i>	
<i>ligens.</i>	ibid.
<i>Subrubicunda comam ex-</i>	
<i>plicans.</i>	ibid.
<i>Tota viridis.</i>	ibid.
<i>Trium colorum.</i>	176
<i>Violacea.</i>	177
<i>Anemones abortus ut impe-</i>	
<i>diendus.</i>	333
<i>Apricatio.</i>	330
<i>Caries eradenda.</i>	335
<i>Diuisio.</i>	ibid.
<i>Exemptio & custodia.</i>	256
	334
<i>Genus multiplex.</i>	173
<i>Inuolucrum, cum transf-</i>	
<i>mittitur.</i>	300
<i>Latifolia ac tenuifolia di-</i>	
<i>scrimina è radicibus.</i>	174
<i>Luxuries coërcenda.</i>	334
<i>Nomina varia.</i>	173
<i>Rigatio.</i>	331
<i>Satio.</i>	327. & seq.
	Sa-

Index Rerum

Satio menstrua paxia.	332	Sepimentum.	18
Semen quod optimum, & quando colligendum se- rendumque.	337. 507	Situs.	16. & seq.
Sterilitas ut emendanda.	332	Areolarum magnitudo.	22
Tenuifolia discrimina è folijs.	179 & seq.	Semita.	41. 42
Tutamentum.	331	Tutela lateritia.	39
Angues argenti ab horti.	277	Arma hortensis.	57. & seq.
Anserum encomia.	44	Armerius flos.	190
Triumphalis pompa.	ibid.	Artis & Naturæ concertan- tium fabula.	468
Apes è floribus artificiosè con- texte.	426	Icon.	477
Aprilis flores.	157. 165. 183. 185. 195.	Insitum admirandum.	472
Apum Barberinarum enco- mia.	375. 376.	Ascarides terrestres.	284
Aqua florum stillatitia.	438	Asphodeli albi & flavi culti- ra.	342
Aqua irriguæ delectus.	246	Descriptio.	184. 185
Aquaticorum florum cultu- ra.	372. & seq.	Attali horti.	5
Aquauinarum horti.	87. 113	Aues ab hortiis ut arcenda.	277
Arbor vite.	379		
Arboris coralij cultura.	380		
Descriptio.	ibid.		
Icon.	381		
Arcula ad flores procul mis- sendos.	299. & seq.		
Area colendis floribus accom- mode Apricitas.	17		
Aqua irrigua.	18		
Figura.	ibid.		
Forma varia.	24. & seq.		
Linearis pictura.	122		
Planities.	17		

Index Rerum

Bipalium hortense. 57
Blatta ab hortis ut dimouenda. 291
Bruchi fabula. 49. & seq.
Icon. 55
Bruxellenses horti. 85
*Bulborum nostratum, exter-
 norum, adnatorumque
 exemptio*. 252. & seq.
Erutorum cura. 255
*Liliaceorum à blattis de-
 fensio*. 291
Reponendorum cella. 255
*Tenerorum & carnosorum
 custodia*. 257
Burgessiorum horti: 88

C

C *Aduci floris cultura*. 248
*Caëtani Ducis confi-
 tio*. 215
Caëtanorum horti. 90
*Caius siue Caius, planta,
 cum icone*. 385. 387
*Calatbus floriger triplex cum
 icone*. 401. & seq.
*Caloris à floribus defendendi
 modus*. 245
Caltha palustris. 373
Canis hortensis. 44
Quomodo importunus. 257
*Canibarides horti incommo-
 da*. 289
Vt exigenda. ibid.
Caprarola horti. 89

*Capsule multiplicis ad flores
 transmittendos descri-
 ptio*. 299. 427. & seq.
Icon. 431
Caryophyllorum admiranda. 447
464. & seq.
Alligatura & incisio. 350
Cultura. 346. & seq.
Discrimina. 189
Educatio. 347
Florea continuatio. 349
Insolatio. 351
Locus satius. 350
Propagatio. 347
Putatio. 350
Satio duplex. 346
Translatio. 350

Casertani horti. 87. 113
Cassianus à Puteo. 389. 440
*Cerasi flore multiplici cultu-
 ra*. 370
Descriptio. 204
Christus hortulani specie. 8
Iubet flores considerari. 9
Chymia florea. 451
Cisternani horti. 90
Cisternani horti quadrans. 217
*Cistula inaequales tres pro Co-
 lono*. 64
*Cochlea ut arcenda ab hor-
 tis*. 282
Colchici cultura. 312
Descriptio. 148
*Coloni hortensis instrumen-
 ta*. 57. & seq.
 Ll. Par-

Index Rerum

Partes .	45. & seq.	Eruca deprehendenda & arcen-	
Colores arbitrarij floribus ut		de ratio .	48. 279
inducantur .	458	Fabula .	49. & seq.
& seq.		Icon .	55
Quibus e causis existant .	467	Estenses horti .	89
Columna floribus immitten-		Excubitor hortensis .	44
dis perforata descriptio .	413	Exherbandi modus .	243
Icon .	415	Eystadienses horti .	86. 429
Coralij arbuscula descriptio .	380		
Icon .	381		
Cornelij Card. horti .	87		
Corone imperialis cultura .	312		
Descriptio .	142		
Cribrata varia pro Colono .	64		
Croci cultura .	312		
Descriptio .	141		
Cucurbitarius vermis .	284		
Cultellus hortensis .	61		
Cyclamini cultura .	324. & seq.		
Genera .	167		
Nomina .	ibid.		

D

D	Decembris flores .	151
	Deplantandi Belgicum	
	instrumentum .	61
	Dioclitianus ex Imperatore	
	olitor .	8

E

E	Mmanuel Suertius .	73
	Epicurus inter flores	
	philosophus .	5

F

F	Abius Columna	13
	Fabius Sergardius .	50
	Fabritius Sbardonus .	146
		407. & 427.
	Fabula Flora Lunam consu-	
	lantis , cum icone	227
	& seq.	
	Limacis & Eruca , cum ico-	
	ne .	49. & seq.
	Melissa & Florilla , cum	
	icone .	514. & seq.
	Natura atque Artis con-	
	certantium , cum ico-	
	ne .	468. & seq.
	Telluris perorantis , cum	
	icone .	84. & seq.
	Farnesorum horti Parmenses	
	& Romani .	87. 88
	Februarij flores .	151. 152. 161
	Federicus Cassius .	14. 15
	Felis arcenda ab hortis ra-	
	tio .	258
	Felis optima forma .	269
	Ferdinandus Imperatus .	437
	Fi-	

Index Rerum

Fistilium conferendorum ratio. 237
Fimi consideratio. 79. & seq.
Genera. 79
Maturitas. 82
Spargendi tempus. ibid.
Vfus. ibid.
Flora siue Florentia nomen sacrum veteris Romæ. 7
Floreæ pictura. 424. & seq.
Moles. 407
Floreæ rei amatores. 5. & seq.
Scriptores. 12. & seq.
Floreum conuiuium. 90
Opus musuum. 423
Flores bulbacei plerique, aut hyacinthi, aut narcissi. 100
Colono cur præfoscendi. 99
Complures indiscreti. ibid.
Dei imagines. 8
Quare insulsi, venenati, inodori. 93
Quibus mensibus ferendi. 219. & seq.
Qui seorsum, qui permiscere ferendi. 214
Quo semine ferendi. 295
Vt conglutinandi. 434. & seq.
Vt conseruandi. 433
Vt continuandi. 438
Vt crispandi. 509
Vt digerendi in volumina. 436
Vt eligendi in hortis alienis. 296

Vt excoltendi locis siluestribus. 298
Vt solioflores efficiendi. 507
Vt inodorandi. 503
Vt irrigandi. 47. & 245
Vt listeris inscribendi. 511
Vt multiplicandi. 295
Vt pingendi notis. 511. & seq.
Vt præsignandi. 296
Vt procul accersendi. 293
Vt propagandi. 294
Vt properandi. 241. 445
Vt reseruandi ad semen. 294
Vt retardandi. 447
Vt transmittendi. 299
& seq.
Vt variè magni efficiendi. 509
Floribus aræ sacra ornanda. 47
Bestiola infesta ut abigenda. 279. & seq.
Colendis quæ aræ accommoda. 10. & seq.
Folia non detrahenda. 250
Longè mittendis capsula opportuna. 427. & seq.
Serendis quæ sidera obseruanda. 222. & seq.
Seruandis vasa idonea. 407
& seq.
Terra aptissima. 75
Florum admiranda. 444
Aqua stillatitia. 438
Aquaticorum cultura. 372
 Ll 2 Ar-

Index Rerum

<i>Arbitraria tempestiuitas.</i>	445	<i>Qua cura custodienda.</i>	231
<i>Arbitrarij colores.</i>	458. & seq.	<i>Forficula vermes ut capian-</i>	
<i>Arcana cultura.</i>	441	<i>tur.</i>	284
<i>Caducorum fultura.</i>	48	<i>Formicarum abigendarum ab</i>	
& seq.		<i>hortis ratio.</i>	285. & seq.
<i>Componendorum ratio:</i>	47	<i>Fraga Canadana.</i>	379
<i>Conditura.</i>	438	<i>Franciscus Castellus.</i>	428
<i>Contrectatio cauenda.</i>	249	<i>Franciscus Hernandus Medi-</i>	
<i>Cultura à veteribus Phi-</i>		<i>cus.</i>	14
<i>losophis & Regibus v-</i>		<i>Frigoris arcendi à floribus mo-</i>	
<i>surpata.</i>	4. & seq.	<i>dus.</i>	244
<i>Cur Flora.</i>	10	<i>Fritillaria cultura.</i>	317
<i>Homine ingenuo digna.</i>	4	<i>Descriptio.</i>	149
<i>Fasciculi artificiosi cum</i>		<i>Nomina varia.</i>	ibid.
<i>icone.</i>	396. & seq.		
<i>Imitatio multiplex.</i>	438		
& seq.			
<i>Legendorum ratio ac tem-</i>			
<i>pestiuitas.</i>	47		
<i>Numerus recensendus.</i>	212		
<i>Patria pradiſcenda.</i>	ibid.		
<i>Recisio ut vsurpanda.</i>	249		
<i>Seminarium.</i>	43		
<i>Sepimentum.</i>	18		
<i>Seruandorum lex.</i>	243		
& seq.			
<i>Structura multiplex.</i>	395		
& seq.			
<i>Tinctura aptissima.</i>	459		
<i>Vasa.</i>	63		
<i>Vsus in mensis.</i>	438		
<i>Fatidis rebus affitis flores odo-</i>			
<i>rationes.</i>	505		
<i>Folia post flores non detraben-</i>			
<i>da.</i>	250		

G

<i>G</i>	<i>Allicacrates ad florum</i>		
	<i>conſitionem accommo-</i>		
	<i>da.</i>	233	
	<i>Gelsimini cultura.</i>	352	
	<i>Descriptio.</i>	193	
	<i>Etymon.</i>	ibid.	
	<i>Gelsimini Americani cultu-</i>		
	<i>ra.</i>	359	
	<i>Descriptio.</i>	195	
	<i>Arabici cultura.</i>	357	
	<i>Descriptio.</i>	194	
	<i>Hispani candido flore ſim-</i>		
	<i>plicis cultura.</i>	353	
	<i>Descriptio.</i>	193	
	<i>Hispani multiplicis cultu-</i>		
	<i>ra.</i>	357	
	<i>Descriptio.</i>	194	
	<i>In-</i>		

Index Rerum

*Indici flauī odorātissimi cul-
tura.* 390. & seq.
Descriptio. 389. & seq.
Icon. 393
*Indici maximi flore phœni-
ceo cultura.* 361
Descriptio. 196
Icon. 199
Genista flore albo cultura. 370
Descriptio. 205
Gonzagarum Ducum horti. 86
Granadilla cultura. 351
Descriptio. 190. & seq.

H

H *Enricus Coruinus.* 241
*Heraclion, aquaticus
flos.* 372
*Homines in floribus expref-
si.* 156
*Horatius Graffius è Societate
Iesu.* 408
Hortensia arma. 57. & seq.
Horti Babylonici penfiles. 7
Diſti Paradifus. 5
Quibus adamati. ibid. & 8
Horti infigniores Europa. 85
Balnearia. 89
*Bruxellenſes Brabantino-
rum Ducum.* 85
Byzantini Oſbomanorum. 85
Caprarole. 89
*Casertani Principis Aquau-
na.* 87.

Ciſternani Caſtani Ducis. 90
Eyſtadienſes. 86
*Florentini Magnorum
Ducum.* 87
*Mantuanī Gonzagarum Du-
cum.* 86
*Parifienſes Gallorum Re-
gum.* 85
*Parmenſes Farnefiorum Du-
cum.* 87
Romani Aldobrandinorum. 88
Barberinorum. 89
Bentiuolorum. ibid.
Burgheſiorum. 88
Card. Corneliſ. 87
Farnefiorum. 88
Ludouifiorum. ibid.
Matthaïorum. ibid.
Mediceorum. ibid.
Perettorum. ibid.
Card. Pij. ibid.
Pontificum. 89
Salisburgenſes. 86
Tiburtes Eſtenſum. 89
*Toletani Regum Hispano-
rum.* 85
*Tuſculani Principum pluri-
morum.* 89
Viennenſes Ceſarum. 86
*Hortorum cura ſapientibus lau-
data.* 9
Forma varia. 24
Inequalis. 35
Labyrinthæa. 37
Oblonga quadrangula. 27
Oſto-

Index Rerum

<i>Oëlogona.</i>	31	<i>du.</i>	166
<i>Ouata.</i>	33	<i>Orientalis.</i>	160
<i>Quadrata.</i>	25	<i>Peruanus.</i>	164
<i>Rotunda.</i>	29	<i>Poëticus.</i>	154
<i>Hortorum hostes maiusculi.</i>	257	<i>Polyanthes multiformis.</i>	162
<i>Minuti.</i>	278	<i>Racemosus multiplex.</i>	ibid.
<i>Seminarium.</i>	43	<i>Roseus multiplex.</i>	ibid.
<i>Hyacinthi cultura.</i>	319. & seq.	<i>Sanneſius comosus, ſiue cu-</i>	
<i>Deſcriptio.</i>	159. & seq.	<i>preſſinus.</i>	165
<i>Multicolor varietas.</i>	159	<i>Subrubens.</i>	161
<i>Nomen anceps & va-</i>		<i>Subuiriſidis folioſus.</i>	162
<i>rium.</i>	158	<i>Violaceus dilutis maculis di-</i>	
<i>Nota.</i>	158. & seq.	<i>ſtingtus.</i>	161
<i>Hyacinthus albus bruma-</i>		<i>Violaceus polyanthes caule</i>	
<i>lie.</i>	160	<i>foliato.</i>	ibid.
<i>Albus ſerotinus polyan-</i>		<i>Hyena pellis, ſtorum tutela.</i>	293
<i>thes.</i>	161		
<i>Anglicus ſiue Belgicus ſero-</i>			
<i>tinus, caruleus, candidus,</i>			
<i>rubellus.</i>	163		
<i>Botryodes inodorus, candi-</i>			
<i>dus, & rubellus.</i>	165		
<i>Odoratus.</i>	164		
<i>Caruleus dilutior, roſmari-</i>			
<i>no concolor.</i>	162		
<i>Odoratus præcox.</i>	160		
<i>Maior odoratiſſimus By-</i>			
<i>zantius.</i>	161		
<i>Cineraceus.</i>	ibid.		
<i>Cyaneus præcox.</i>	ibid.		
<i>Ecycaneo fuſcus & criſpus.</i>	ibi.		
<i>Hiſpanus obſoletior.</i>	163		
<i>Serotinus.</i>	ibid.		
<i>Ianuarius.</i>	162		
<i>Indicus tuberoſus candi-</i>			

I

<i>Imbricis ferrei extractorij</i>	
<i>forma & uſus.</i>	69
<i>Icon.</i>	71
<i>India Barberiniæ hortis tribu-</i>	
<i>taria cum icon.</i>	375. & seq.
<i>Indica ſtirpes in hortis Barbe-</i>	
<i>rinis.</i>	379
<i>Indicia terra ſtoralis.</i>	76
<i>Indici bulbi ut conſerendi.</i>	236
<i>Indici ſtoris è violaceo fuſci</i>	
<i>cultura.</i>	327
<i>Deſcriptio, & natale ſo-</i>	
<i>lum.</i>	168
<i>Icon.</i>	171
<i>Tempeſtiuitas.</i>	169
<i>Indicum de pulchritudine</i>	
<i>pro-</i>	

Index Rerum.

prouerbum. 488

Insecta, hortorum pestis, ut
effuganda. 291

Institutio colores aduentitios in-
ducens. 463

Flores odoratiores red-
dens. 304

Institutum admirandum. 472

Instrumenta Coloni bortensis. 61

& seq.

Vt curanda. 73

Ioannes Faber. 459

Ioannes Terentius de Societate

Iesu. 14

Io. Baptista Martelletus. 337

407.

Io. Laurentius Berninus. 426

Iris. 150

Bulbosa. ibid.

Foliosa. ibid.

Latifolia prima Clusij. ibid.

Persica. 152

Tuberosa. ibid.

Vt colenda. 317

Irrigandi modus. 245

Irrigatio colores aduentitios

inducens. 459

Italia tota pomarium unum. 17

Luca Indica. 186

Vt colenda. 344

Lunij flores. 375

L

L Artificandi plantas ratio
duplex. 444

Lateres, arcularum tutela. 39

Quales. ibid.

Lauri Indica cultura. 370

Forma. 206

Lentiscus Peruana. 372

Libri de floribus compacti. 434

& seq.

Lilia siluestria ut eximen-

da. 257

Vt serenda. 318

Liliorum consideratio. 153. &

seq.

Tinctura arbitraria. 461

Lilium conuallium. 186

Album & subrubens. ibid.

Vt colendum. 343

Regium. 142. & seq.

Vt colendum. 312

Limacis arcendi & depren-

dendratio. 48. 282

Fabula. 49. & seq.

Icon. 51

Locusta ut fuganda ab bor-

tis. 289

Vt interimenda. ibid.

Ludouisorum horti. 88

Lumbrici ut arcendi ab hortis.

282. & seq.

Luna obseruanda in florum

satu. 222. & seq.

Lych-

Index Rerum

Lychnidis Byzantine miniato
flore multiplici cultu-
ra. 345
Description. 187

M

M *Aij flores.* 157. 163
 184. 206. 207. 375.
Mali Punica pleno flore cultu-
ra. 371
Description. 207
Mantuani horti Gonzagarum
Ducum. 86
Maracoti nota: 190. & seq.
M. Antonius Specchius. 40
Martagon siue lilium silue-
stre. 153
Ferrugineum siue Hyacin-
thus poeticus. 154
Montanum primum. ibid.
Montanum secundum. 155
Pomponianum. ibid.
Puniceum duplex. 153
Purpureum triplex. ibid.
Vt colantur. 318

Martij flores. 161. 163. 183
Matthaieorum horti. 88
Medicorum Magnorum Du-
cum horti Florentini,
& Romani. 87. 88

Mel ad surculos transmitten-
dos. 301
Melissa fabula. 514
In Apes conuerso: 516

Icon. 519
Microscopium opticum. 496
Minusorum seminum satus. 240
Transmissio. 301
Molle, arbor Peruana. 210
Vt colatur. 372
Moringa Malabari ca cum
icone. 385. & seq.
Mulieres in floribus ex-
pressa. 157
Mures agrestes & urbani. 264
Floribus noxij. 263
Qua ratione profligandi. ibid.
 & seq.

Musa, planta. 379
Muscipula descriptio. 267
 & seq.
Muscus ad flores transferen-
dos. 299. 301
Musium opus de floribus. 413
Muti canes. 44
Myrti latifolia flore pleno cul-
tura. 370
Description. 205

N

N *Arcissi cultura.* 302 & seq.
Etymon. 190
Nota. 99. & seq.
Vis medica. 302
Narcissus Anglicus. 114
Byzantius. 101
Corniculatus maior & mi-
nor. 103
 Epi-

Index Rerum

<i>Epidaurius .</i>	<u>102</u>	<i>Maior calice tereti, & fo-</i>	
<i>Flauus .</i>	<u>104</u>	<i>lijs angustioribus .</i>	<u>107</u>
<i>Incomparabilis candidus ca-</i>		<i>Minor odoratus, simplex</i>	
<i>lice flauo .</i>	<u>113</u>	<i>& multiplex .</i>	<i>ibid.</i>
<i>Candidus maior & mi-</i>		<i>Pallidus folijs reflexis .</i>	<u>109</u>
<i>nor .</i>	<u>112</u>	<i>Longus ceruice camelina .</i>	<u>114</u>
<i>Ex flauo in sulphureum</i>		<i>Candidus foliosus .</i>	<i>ibid.</i>
<i>languens .</i>	<i>ibid.</i>	<i>Candidus simplex .</i>	<i>ibid.</i>
<i>Perpetuo flauus .</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pallidus simplex .</i>	<i>ibid.</i>
<i>Sulphureus flore multipli-</i>		<i>Montanus serotinus siue</i>	
<i>ci .</i>	<u>113</u>	<i>Musartus .</i>	<u>113</u>
<i>Sulphureus summo calice</i>		<i>Narbonensis .</i>	<u>114</u>
<i>luteo .</i>	<u>112</u>	<i>Siluestris .</i>	<u>109. & seq.</u>
<i>Indicus è rubro croceus flo-</i>		<i>Roseus maior & minor .</i>	<u>105</u>
<i>re liliaceo .</i>	<u>115</u>	<i>Stellatus .</i>	<u>104</u>
<i>Liliaceus diluto colore</i>		<i>Nardus Antonius Reccbus .</i>	<u>14</u>
<i>purpurascens, cum Ico-</i>		<i>Natura cum Arte concertantis</i>	
<i>ne .</i>	<u>117. & seq.</u>	<i>fabula</i>	<u>468. & seq.</u>
<i>Saturo colore purpura</i>		<i>Ad artem oratio .</i>	<u>472</u>
<i>scens, cum iconc .</i>	<u>116. & seq.</u>	<i>Comitatus .</i>	<u>469</u>
<i>Liliaceus Spharicus, cum</i>		<i>Habitus .</i>	<i>ibid.</i>
<i>icone .</i>	<u>125. & seq.</u>	<i>Victoria .</i>	<u>475</u>
<i>Puniceus gemino latiore</i>		<i>Icon .</i>	<u>477</u>
<i>folio. cum iconc .</i>	<u>135</u>	<i>Nauis florea .</i>	<u>407</u>
<i>& seq.</i>		<i>Nicolaus Faber Peiresius .</i>	<u>389</u>
<i>Virginienfis flore purpu-</i>		<i>Nymphaea , flos aquaticus .</i>	<u>372</u>
<i>rascente .</i>	<u>115</u>		
<i>Iuncifolius albus autumnalis .</i>	<u>108</u>		
<i>Albus maior & minor</i>			
<i>vernus .</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Albus sulphureo calice. ibid.</i>			
<i>Luteus maior amplo cali-</i>			
<i>ce & folijs continuatis .</i>	<u>106</u>		
<i>Maior folijs conuolutis. ibid.</i>			

O

O <i>Ctobris flores .</i>	<u>183</u>
	<u>195.</u>
<i>Odor vs floribus addendus .</i>	
	<u>593. & seq.</u>
<i>Oleaſter exoticus .</i>	<u>206</u>
<i>M m</i>	<i>V1</i>

Index Rerum

<i>Vt colendus .</i>	370	<i>Petrus Paulus Dreus .</i>	423
<i>Olla fistilis ad talpas capien-</i>		<i>Pbasciulus Brasiliensis cum ico-</i>	
<i>das .</i>	262	<i>ne .</i>	381 & seq.
<i>Orbes viminei ad flores</i>		<i>Pictura florea .</i>	423 & seq.
<i>offerendos .</i>	64	<i>Pij Cardinalis horti .</i>	88
<i>Orchis .</i>	156	<i>Planta radicum immorta-</i>	
<i>Mulieres representans .</i>	157	<i>lium vt curanda .</i>	256
<i>Viros exprimens .</i>	156	<i>Polij foliorum mira .</i>	487
<i>Vt colatur .</i>	318	<i>Polydorus Neruccius .</i>	214, 506
<i>Ornithogalum .</i>	157	<i>Pompa florea ferculum turri-</i>	
<i>Peregrinum spicatum .</i>	ibid.	<i>sum .</i>	405
<i>Vt colendum .</i>	319	<i>Pontificum horti .</i>	89
<i>Ottomanorum horti .</i>	85	<i>Promptuarium instrumento-</i>	

P

P <i>Aeonia pleno flore .</i>	185	<i>Pleno flore quadruplex .</i>	110
<i>Rubra .</i>	ibid.	<i>Simplici flore minor .</i>	111
<i>Subrubens .</i>	ibid.	<i>Iuncifolius .</i>	ibid.
<i>Vt colenda .</i>	342	<i>Pulices virides horti noxij .</i>	290
<i>Pala hortenses .</i>	57	<i>Vt enecandi .</i>	ibid.
<i>Papyrus Aegyptia .</i>	380	<i>Punica malus siluestris .</i>	207
<i>Paradis arbor .</i>	206	<i>Vt colenda .</i>	371
<i>Parisienses horti Gallorum</i>		<i>Pyxis ad flores transmitten-</i>	
<i>Regum .</i>	85	<i>dos .</i>	249 & seq.
<i>Parmenses horti Farnesiorum</i>			
<i>Ducum .</i>	87		
<i>Paxillus praeferratus .</i>	61		
<i>Perfica arbor flore multipli-</i>			
<i>ci .</i>	204		
<i>Vt colenda .</i>	369		
<i>Perettorum horti .</i>	88		
<i>Petrelaum siue Petroleum</i>			
<i>aduersus pulices viri-</i>			
<i>des .</i>	290		

R

R <i>Adices florum vt inbu-</i>	
<i>manda .</i>	233
<i>Vt purganda .</i>	ibid.
<i>Detesta vt operienda .</i>	244
<i>Vitiosa vt curanda .</i>	248
<i>Ranunculum cultura & cu-</i>	
<i>ra .</i>	339 & seq.
<i>Nota .</i>	181 & seq.
<i>Rs-</i>	

Index Rerum

Ranunculus ab anemona se-
ponendus. 214
Granosus simplex & folio-
sus. 181
Coccineus foliosus. 182
Flavus simplex. ibid.
Flavus flore pleno. ibid.
Fibratus candidus. 183
Flavus globosus. ibid.
Tuberosus luteus. 184
Rastri Gallici descriptio &
usus. 57
Icon. 59
Rhus peregrina. 207
Vt colenda. 371
Rigatio. 331
Romani horti. 87. & seq.
Rosa alba. 202
Albicans. ibid.
Arborescens. 368
Bataua centifolia. 203
Centifolia inodora. ibid.
Cinnamomina. ibid.
Damascena. 202. 366
Ex rubro nigricans. 203
Italica flore subrubente
perpetua. ibid.
Lutea. 204
Rubra. 203
Subrubens. 202
Variegata. 203
Rose admiranda. 448. & seq.
& 472.
Cultura vetus & recens. 362
& seq.

Laudes. 201
Note. ibid. & seq.
Tinctura arbitraria. 462
Variatio ab infusione. 465
& seq.
Rosa Sinenfis. 473
Quando floreat. 482
Vt in hortos Italicos illata. 479
Rose Sinenfis arbuscula. 485
Colores varij. 473. 482
Cultura. 479. 501
Discoloris varietatis ratio:
ibid.
Encomia. 487
Fabula cum icone. 468.
& seq.
Foliosae Icon. 491
Foliosoris Icon. 489
Folliculus & semen, cum ico-
ne. 495. & seq.
Forma. 473. 480. & seq.
Genus triplex. 488
Magnitudo. 479
Nomina. ibid.
Quinquesoliae icon. 493
Satus. 479
Translatio. ibid.
Rubeta quo pacto pellenda. 277

S

S Al Chymicus arbitrarij
floribus eliciendis. 451
Medetur doloribus capitis. 453
Salisburgenses horti. 86
M m 2 Sam-

Index Rerum.

Armen-

Index Rerum

<i>Arundinea.</i>	<u>46. 239. 296</u>
<i>Plumbea.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tiburtes horti Ducum Esten-</i> <i>sum.</i>	<u>89</u>
<i>Tobias Aldinus.</i>	<u>15. 380</u>
<i>Toletani horti Regum Hispa-</i> <i>norum.</i>	<u>85</u>
<i>Trachelium Americanum.</i>	<u>188</u>
<i>Vt colendum.</i>	<u>374</u>
<i>Tranquillus Romaulus.</i>	<u>125. 169</u> <u>194. 207. 214. 311. 327. 401</u>
<i>Trifolium palustre.</i>	<u>374</u>
<i>Tripolij foliorum mira.</i>	<u>487</u>
<i>Trulla fabrorum.</i>	<u>61</u>
<i>Vt in florum confitione</i> <i>vsur-</i> <i>panda.</i>	<u>233</u>
<i>Tuber Iudicum.</i>	<u>168</u>
<i>Tuber terra.</i>	<u>167</u>
<i>Tubi fœtiles ad plantas cir-</i> <i>cumsepiendas.</i>	<u>63</u>
<i>Tubus ferreus ad plantas trans-</i> <i>ferendas, cum icone.</i>	<u>65</u>
<i>¶ seq.</i>	
<i>Vt adhibendus.</i>	<u>69</u>
<i>Tulipa bombycina.</i>	<u>148</u>
<i>Perfca bicolor.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tulipa corruptio & reparatio</i> <i>annua.</i>	<u>145</u>
<i>Cultura.</i>	<u>313. & seq.</u>
<i>Descriptio.</i>	<u>144. & seq.</u>
<i>Distinctio.</i>	<i>ibid. & 146</i>
<i>Exuvia vt detrahenda.</i>	<u>233</u>
<i>Florentis exemptio.</i>	<u>298</u>

<i>Indicia.</i>	<u>148</u>
<i>Nomina.</i>	<u>143</u>
<i>Propagatio.</i>	<u>147</u>
<i>Tinctura arbitraria.</i>	<u>462</u>
<i>Turris florea.</i>	<u>405</u>
<i>Tusculani horti.</i>	<u>89</u>

V

<i>Accinium.</i>	<u>159</u>
<i>Vas fœtile abstinendis</i> <i>formicis.</i>	<u>288</u>
<i>Capiendis talpis.</i>	<u>262</u>
<i>Vas irriguum.</i>	<u>61</u>
<i>Vasa floribus immittendis per-</i> <i>forata, cum icone.</i>	<u>407</u>
<i>Vasa florum vt custodienda</i> <i>post flores.</i>	<u>252</u>
<i>Vt disponenda.</i>	<u>23. 240</u>
<i>Vt fabricanda:</i>	<u>63</u>
<i>Vt obserenda.</i>	<u>237. & seq.</u>
<i>Vt reclinanda ad euitandos</i> <i>imbres.</i>	<u>248</u>
<i>Vaticani sepulcri florea orna-</i> <i>menta.</i>	<u>423</u>
<i>Vermes ab hortis vt abigendi.</i>	<u>282. & seq.</u>
<i>Vestonica coronaria.</i>	<u>189</u>
<i>Viennenses horti Caesarum.</i>	<u>86</u>
<i>Viri in floribus expressi.</i>	<u>156</u>
<i>Vita arbor.</i>	<u>379</u>
<i>Vitis Canadana.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vlysses Aldrouandus:</i>	<u>437</u>

F I N I S.













22

